

VEDLEGG I
PREPARATOMTALE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte
Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg ivakaftor (ivacaftor).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 83,6 mg laktosemonohydrat.

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg ivakaftor (ivacaftor).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 167,2 mg laktosemonohydrat.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert (tablett)

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte

Lyseblå, kapselformede filmdrasjerte tabletter som har “V 75” i svart trykk på den ene siden og er blanke på den andre siden (12,7 mm x 6,8 mm i modifisert tablettform).

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Lyseblå, kapselformede filmdrasjerte tabletter som har “V 150” i svart trykk på den ene siden og er blanke på den andre siden (16,5 mm x 8,4 mm i modifisert tablettform).

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Kalydeco tabletter er indisert

- som monoterapi til behandling av voksne, ungdom og barn fra 6 års alder, som veier 25 kg eller mer, med cystisk fibrose (CF), som har en *R117H CFTR*-mutasjon eller en av følgende regulerings (klasse III)-mutasjoner i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (*CFTR*)-genet: *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* eller *S549R* (se pkt. 4.4 og 5.1).
- i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor tabletter til behandling av voksne, ungdom og barn fra 6 års alder med cystisk fibrose (CF) som er homozygot for *F508del*-mutasjonen, eller som er heterozygot for *F508del*-mutasjonen og har en av følgende mutasjoner i *CFTR*-genet:

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A → G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G → A, 3272-26A → G og 3849+10kbC → T.

- i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor tabletter for behandling av voksne, ungdom og barn 6 år og eldre med cystisk fibrose (CF) som har minst én *F508del*-mutasjon i *CFTR*-genet (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Kalydeco skal kun forskrives av leger med erfaring innen behandling av cystisk fibrose. Dersom pasientens genotype er ukjent, bør det foretas en nøyaktig og validert genotypingsmetode før behandlingsstart for å bekrefte en indisert mutasjon i *CFTR*-genet (se pkt. 4.1). Fasen av poly-T-varianten identifisert med *R117H*-mutasjonen bør fastsettes i samsvar med lokale kliniske anbefalinger.

Dosering

Voksne, ungdom og barn 6 år og eldre bør følge dosering som angitt i tabell 1.

Tabell 1: Doseringsanbefalinger

Alder/vekt	Morgendose	Kveldsdose
Ivakaftor som monoterapi		
6 år og eldre, ≥ 25 kg	Én ivakaftor 150 mg tablett	Én ivakaftor 150 mg tablett
Ivakaftor i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor		
6 år til < 12 år, < 30 kg	Én tezakaftor 50 mg/ivakaftor 75 mg tablett	Én ivakaftor 75 mg tablett
6 år til < 12 år, ≥ 30 kg	Én tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett	Én ivakaftor 150 mg tablett
12 år og eldre	Én tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett	Én ivakaftor 150 mg tablett
Ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
6 år til < 12 år, < 30 kg	To ivakaftor 37,5 mg/tezakaftor 25 mg/eleksakaftor 50 mg tabletter	Én ivakaftor 75 mg tablett
6 år til < 12 år, ≥ 30 kg	To ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter	Én ivakaftor 150 mg tablett
12 år og eldre	To ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter	Én ivakaftor 150 mg tablett

Morgen- og kveldsdosen skal tas med omtrent 12 timers mellomrom sammen med fettholdig mat (se administrasjonsmåte).

Glemt dose

Dersom det har gått 6 timer eller mindre siden glemt morgen- eller kveldsdose, skal pasienten rådes til å ta den så snart som mulig, og deretter ta neste dose til fastsatt tid. Dersom det er gått mer enn 6 timer fra tidspunktet dosen vanligvis tas, skal pasienten rådes til å vente til neste fastsatte dose.

Pasienter som får Kalydeco i et kombinasjonsregime, skal rådes til å ikke ta mer enn én dose av hvert legemiddel samtidig.

Samtidig bruk av CYP3A-hemmere

Ved samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A-hemmere, bør dosen av ivakaftor justeres som spesifisert i tabell 2. Doseringsintervallene bør endres i henhold til klinisk respons og tolerabilitet (se pkt. 4.4 og 4.5).

Tabell 2: Doseringsanbefalinger for samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A-hemmere

Alder/vekt	Moderate CYP3A-hemmere	Sterke CYP3A-hemmere
Ivakaftor som monoterapi		
6 år og eldre, ≥ 25 kg	En tablett ivakaftor 150 mg om morgenen én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	En tablett ivakaftor 150 mg om morgenen to ganger i uken med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor		
6 år til < 12 år, < 30 kg	Annenhver dag: - én tablett tezakaftor 50 mg/ivakaftor 75 mg om morgenen den første dagen - én tablett ivakaftor 75 mg om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	En tablett tezakaftor 50 mg/ivakaftor 75 mg om morgenen to ganger i uken med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
6 år til < 12 år, ≥ 30 kg	Annenhver dag: - én tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen den første dagen - én tablett ivakaftor 150 mg om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	En tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen to ganger i uken med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
12 år og eldre	Annenhver dag: - én tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen den første dagen - én tablett ivakaftor 150 mg om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	En tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen to ganger i uken med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
6 år til < 12 år, < 30 kg	Annenhver dag: - to tabletter ivakaftor 37,5 mg/tezakaftor 25 mg/eleksakaftor 50 mg om morgenen den første dagen - én tablett ivakaftor 75 mg om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	To tabletter ivakaftor 37,5 mg/tezakaftor 25 mg/eleksakaftor 50 mg om morgenen to ganger i uken, med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
6 år til < 12 år, ≥ 30 kg	Annenhver dag: - to tabletter ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg om morgenen den første dagen - én tablett ivakaftor 150 mg om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	To tabletter ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg om morgenen to ganger i uken, med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.

Alder/vekt	Moderate CYP3A-hemmere	Sterke CYP3A-hemmere
12 år og eldre	Annenhver dag: - to tabletter ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/ eleksakaftor 100 mg om morgenen den første dagen - én tablett ivakaftor 150 mg om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	To tabletter ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/ eleksakaftor 100 mg om morgenen to ganger i uken, med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.

Spesielle populasjoner

Eldre

Svært begrensede data er tilgjengelige for eldre pasienter behandlet med ivakaftor (gitt som monoterapi eller i et kombinasjonsregime). Det er ikke nødvendig med spesifikk dosejustering for denne pasientpopulasjonen (se pkt.5.2).

Nedsatt nyrefunksjon

Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance på 30 ml/minutt eller lavere) eller terminal nyresykdom (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A).

Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C) bør dosen med ivakaftor justeres som spesifisert i tabell 3 (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Tabell 3: Doseringsanbefalinger for pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon

Alder/vekt	Moderat (Child-Pugh klasse B)	Alvorlig (Child-Pugh klasse C)
Ivakaftor som monoterapi		
6 år og eldre, ≥ 25 kg	Én tablett ivakaftor 150 mg én gang daglig Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke , med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én tablett ivakaftor 150 mg om morgenen annenhver dag eller sjeldnere i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
Ivakaftor i kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor		
6 år til < 12 år, < 30 kg	Én tablett tezakaftor 50 mg/ivakaftor 75 mg om morgenen én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke , med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én tablett tezakaftor 50 mg/ivakaftor 75 mg om morgenen én gang daglig eller sjeldnere i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.

Alder/vekt	Moderat (Child-Pugh klasse B)	Alvorlig (Child-Pugh klasse C)
6 år til < 12 år, ≥ 30 kg	Én tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke, med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen én gang daglig eller sjeldnere i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
12 år og eldre	Én tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke, med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én tablett tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg om morgenen én gang daglig eller sjeldnere i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
Ivakaftor i kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
6 år til < 12 år, < 30 kg	Bør ikke brukes, med mindre det forventes at fordelene oppveier risikoene. Hvis det skal brukes, bør dosen justeres som følger: Dag 1: to ivakaftor 37,5 mg/tezakaftor 25 mg/eleksakaftor 50 mg tabletter om morgenen Dag 2: én ivakaftor 37,5 mg/tezakaftor 25 mg/eleksakaftor 50 mg tablett om morgenen. Fortsett deretter med dag 1- og dag 2-dosering annenhver dag. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Skal ikke brukes.
6 år til < 12 år, ≥ 30 kg	Bør ikke brukes, med mindre det forventes at fordelene oppveier risikoene. Hvis det skal brukes, bør dosen justeres som følger: Dag 1: to ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter om morgenen Dag 2: én ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tablett om morgenen. Fortsett deretter med dag 1- og dag 2-dosering annenhver dag. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Skal ikke brukes.

Alder/vekt	Moderat (Child-Pugh klasse B)	Alvorlig (Child-Pugh klasse C)
12 år og eldre	Bør ikke brukes, med mindre det forventes at fordelene oppveier risikoene. Hvis det skal brukes, bør dosen justeres som følger: Dag 1: to ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter om morgenen Dag 2: én ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tablett om morgenen. Fortsett deretter med dag 1- og dag 2-dosering annenhver dag. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Skal ikke brukes.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av ivakaftor som monoterapi har ikke blitt fastslått hos barn under 1 måned eller hos barn under 6 måneder som er født prematurt (før 37. svangerskapsuke), verken i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor hos barn under 6 år eller i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor hos barn under 2 år. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Det foreligger begrensede data hos pasienter under 6 år med en *R117H*-mutasjon i *CFTR*-genet. Tilgjengelige data hos pasienter fra 6 års alder er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2.

Administrasjonsmåte

Til oral bruk.

Pasientene bør instrueres om å svelge tablettene hele. Tablettene skal ikke tygges, knuses eller deles før svelging, siden det foreløpig ikke finnes tilgjengelige kliniske data som støtter andre administrasjonsmetoder.

Ivakaftor tabletter bør tas sammen med fettholdig mat.

Mat eller drikke som inneholder grapefrukt bør unngås under behandling (se pkt. 4.5).

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Kun pasienter med CF som hadde en *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N*, *S549R*-regulerings (klasse III)-, *G970R*- eller *R117H*-mutasjon i minst ett allel av *CFTR*-genet ble inkludert i studiene 770-102, 770-103, 770-111 og 770-110 (se pkt. 5.1).

I studie 770-111 ble fire pasienter med *G970R*-mutasjon inkludert. Hos tre av fire pasienter var endring i kloridtest i svette < 5 mmol/l, og denne gruppen viste ikke en klinisk relevant bedring i FEV₁ etter 8 ukers behandling. Klinisk effekt hos pasienter med *G970R*-mutasjon i *CFTR*-genet kunne ikke fastslås (se pkt. 5.1).

Effektresultater fra en fase II-studie hos pasienter med CF som var homozygote for *F508del*-mutasjonen i *CFTR*-genet, viste ingen statistisk signifikant forskjell i FEV₁ etter 16 ukers

ivakaftorbehandling sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1). Bruk av ivakaftor som monoterapi hos disse pasientene er derfor ikke anbefalt.

Det er vist mindre evidens for en positiv effekt av ivakaftor hos pasienter med en *R117H-7T*-mutasjon forbundet med mindre alvorlig sykdom i studie 770-110 (se pkt. 5.1).

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor skal ikke forskrives til pasienter med CF som er heterozygote for *F508del*-mutasjonen og har en ytterligere *CFTR*-mutasjon som ikke er listet opp i pkt. 4.1.

Økte transaminaser og leverskade

Hos en pasient med cirrhose og portal hypertensjon, har leversvikt som medførte transplantasjon blitt rapportert ved behandling med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Dette legemidlet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med underliggende avansert leversykdom (f.eks. cirrhose, portal hypertensjon) og kun dersom fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes hos disse pasientene, skal de overvåkes nøye etter behandlingsstart (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2).

Moderate økninger i transaminaser (alanintransaminase [ALAT] eller aspartattransaminase [ASAT]) er vanlige hos personer med CF. Transaminaseøkninger er observert hos enkelte pasienter behandlet med ivakaftor som monoterapi og i kombinasjonsregimer med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Hos pasienter som tar ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor har disse økningene noen ganger vært forbundet med samtidige økninger i total bilirubin. Målinger av transaminaser (ALAT og ASAT) og total bilirubin er derfor anbefalt hos alle pasienter før oppstart med ivakaftor, hver 3. måned første behandlingsår og deretter årlig. Hos alle pasienter med en anamnese med leversykdom eller transaminaseøkninger, bør hyppigere overvåking av leverfunksjonsprøver overveies. Ved signifikante transaminaseøkninger (f.eks. pasienter med ALAT eller ASAT > 5 x øvre normalgrense (ULN), eller ALAT eller ASAT > 3 x ULN med bilirubin > 2 x ULN), bør doseringen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører. Etter opphør av transaminaseøkninger bør nytte og risiko ved å gjenoppta behandlingen overveies (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Bruk av ivakaftor, enten som monoterapi eller i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor, er ikke anbefalt hos pasienter fra 6 års alder med alvorlig nedsatt leverfunksjon med mindre nytten forventes å oppveie risikoen. Disse pasientene skal ikke behandles med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor (se tabell 3 i pkt. 4.2, samt pkt. 4.8 og 5.2).

For pasienter fra 6 års alder med moderat nedsatt leverfunksjon anbefales ikke bruk av ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Behandling skal kun vurderes når det foreligger et tydelig medisinsk behov og fordelene forventes å oppveie risikoene. Hvis det brukes, må det skje med forsiktighet med en redusert dose (se tabell 3 i pkt. 4.2, samt pkt. 4.8 og 5.2).

Depresjon

Depresjon (inkludert selvmordstanker og selvmordsforsøk) har blitt rapportert hos pasienter som får ivakaftor, hovedsakelig i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, vanligvis innen tre måneder etter behandlingsstart og hos pasienter med en anamnese med psykiatiske lidelser. I noen tilfeller ble symptombedring rapportert etter dosereduksjon eller seponering av behandlingen. Pasienter (og omsorgspersoner) skal informeres om behovet for å overvåke for nedstemthet, selvmordstanker og uvanlige endringer i atferd, og kontakte helsepersonell umiddelbart dersom slike symptomer oppstår.

Nedsatt nyrefunksjon

Forsiktighet anbefales ved bruk av ivakaftor hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom (se pkt. 4.2 og 5.2).

Pasienter etter organtransplantasjon

Ivakaftor er ikke undersøkt hos pasienter med CF som har fått organtransplantasjon. Bruk hos transplanterte pasienter er derfor ikke anbefalt. Se pkt. 4.5 for interaksjoner med ciklosporin eller takrolimus.

Utslett

Insidens av utslett ved bruk av ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor var høyere hos kvinner enn hos menn, spesielt hos kvinner som tok hormonelle prevensjonsmidler. Det kan ikke utelukkes at hormonelle prevensjonsmidler spiller en rolle for forekomst av utslett. For pasienter som tar hormonelle prevensjonsmidler som utvikler utslett, bør det vurderes å avbryte behandling med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og hormonelle prevensjonsmidler. Etter at utslettet opphører, bør det vurderes om gjenopptakelse av ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor uten hormonelle prevensjonsmidler er egnet. Dersom utslettet ikke kommer tilbake, kan gjenopptakelse av hormonelle prevensjonsmidler vurderes (se pkt. 4.8).

Interaksjoner med legemidler

CYP3A-induktorer

Eksposering for ivakaftor kan reduseres betydelig ved samtidig bruk av CYP3A-induktorer, noe som potensielt kan føre til nedsatt effekt av ivakaftor. Derfor er samtidig bruk av ivakaftor og sterke CYP3A-induktorer ikke anbefalt (se pkt. 4.5).

CYP3A-hemmere

Eksposering for ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor øker ved samtidig administrering med sterke eller moderate CYP3A-hemmere. Dosen med ivakaftor må justeres ved samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere (se tabell 2 i pkt. 4.2 og pkt. 4.5).

Pediatrisk populasjon

Tilfeller av ikke-medfødt uklar linse/katarakter uten synspåvirkning er rapportert hos pediatriske pasienter behandlet med ivakaftor og regimer som inneholder ivakaftor. Selv om det forelå andre risikofaktorer i noen av tilfellene (som bruk av kortikosteroider og eksposering for stråling), kan en mulig risiko knyttet til behandling med ivakaftor ikke utelukkes. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos pediatriske pasienter som begynner med ivakaftorbehandling (se pkt. 5.3).

Hjelpestoffer med kjent effekt

Laktose

Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som "natriumfritt".

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ivakaftor er et CYP3A4- og CYP3A5-substrat. Det er en svak CYP3A- og P-glykoprotein (P-gp)-hemmer og en mulig CYP2C9-hemmer. *In vitro*-studier har vist at ivakaftor ikke er et substrat for P-gp.

Legemidler som påvirker farmakokinetikken til ivakaftor

CYP3A-induktorer

Samtidig bruk av ivakaftor og rifampicin, en sterk CYP3A-induktor, reduserte ivakaftoreksponeringen (AUC) med 89 % og reduserte hydroksymetylivakaftor (M1) i mindre grad enn ivakaftor. Samtidig bruk av ivakaftor og sterke CYP3A-induktorer, som rifampicin, rifabutin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt (*Hypericum perforatum*), er ikke anbefalt (se pkt. 4.4).

Det anbefales ikke dosejustering når ivakaftor brukes sammen med moderate eller svake CYP3A-induktorer.

CYP3A-hemmere

Ivakaftor er et sensitivt CYP3A-substrat. Samtidig bruk av ketokonazol, en sterk CYP3A-hemmer, økte ivakaftoreksponeringen (målt som areal under kurven [AUC]) 8,5 ganger og økte M1 i mindre grad enn ivakaftor. Det anbefales en reduksjon av ivakaftor-dosen ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere, som ketokonazol, itraconazol, posakonazol, vorikonazol, telitromycin og klaritromycin (se tabell 2 i pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

Samtidig bruk av flukonazol, en moderat CYP3A-hemmer, økte ivakaftoreksponeringen 3 ganger og økte M1 i mindre grad enn ivakaftor. Det anbefales en reduksjon av ivakaftor-dosen hos pasienter som samtidig tar moderate CYP3A-hemmere, som flukonazol, erytromycin og verapamil (se tabell 2 i pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

Samtidig bruk av ivakaftor og grapefruktjuice, som har ett eller flere innholdsstoffer som hemmer CYP3A moderat, kan øke ivakaftoreksponeringen. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt bør unngås ved behandling med ivakaftor (se pkt. 4.2).

Potensial for at ivakaftor interagerer med transportører

In vitro-studier har vist at ivakaftor ikke er et substrat for OATP1B1 eller OATP1B3. Ivakaftor og dets metabolitter er substrater for BCRP *in vitro*. På grunn av dets høye egenpermeabilitet og lave sannsynlighet for å bli utskilt intakt, forventes ikke samtidig bruk av BCRP-hemmere å påvirke eksponering for ivakaftor og M1-IVA, mens potensielle endringer i M6-IVA-eksponering ikke forventes å være klinisk relevante.

Ciprofloksacin

Samtidig bruk av ciprofloksacin og ivakaftor påvirket ikke ivakaftoreksponeringen. Dosejustering er ikke nødvendig når ivakaftor gis sammen med ciprofloksacin.

Legemidler som påvirkes av ivakaftor

Bruk av ivakaftor kan øke systemisk eksponering for legemidler som er sensitive CYP2C9- og/eller P-gp- og/eller CYP3A-substrater, noe som kan øke eller forlenge deres terapeutiske effekter og bivirkninger.

CYP2C9-substrater

Ivakaftor kan hemme CYP2C9. Overvåking av internasjonal normalisert ratio (INR) er derfor anbefalt ved samtidig bruk av warfarin og ivakaftor. Andre legemidler hvor eksponeringen kan øke er glimepirid og glipizid. Disse legemidlene bør brukes med forsiktighet.

Digoksin og andre P-gp-substrater

Samtidig bruk av digoksin, et sensitivt P-gp-substrat, økte digoksineksponeringen 1,3 ganger, sammenfallende med ivakaftors svake hemming av P-gp. Bruk av ivakaftor kan øke systemisk eksponering for legemidler som er sensitive P-gp-substrater, noe som kan øke eller forlenge deres terapeutiske effekter og bivirkninger. Ved samtidig bruk av digoksin eller andre P-gp-substrater med smal terapeutisk indeks, slik som ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus, skal det utvises forsiktighet og overvåking.

CYP3A-substrater

Samtidig bruk av (oral) midazolam, et sensitivt CYP3A-substrat, økte midazolameksponeringen 1,5 ganger, sammenfallende med ivakaftors svake hemming av CYP3A. Ingen dosejustering av CYP3A-substrater, som midazolam, alprazolam, diazepam eller triazolam, er nødvendig når disse brukes samtidig med ivakaftor.

Hormonelle prevensjonsmidler

Ivakaftor er undersøkt sammen med et oralt prevensjonsmiddel med østrogen/progesteron og ble funnet å ikke ha noen signifikant effekt på eksponeringen for det orale prevensjonsmidlet. Dosejustering av orale prevensjonsmidler er derfor ikke nødvendig.

Pediatrisk populasjon

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen eller begrenset mengde data (utfallet av mindre enn 300 graviditeter) på bruk av ivakaftor hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn til reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av ivakaftor under graviditet.

Amming

Begrensede data viser at ivakaftor blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan derfor ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med ivakaftor skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Det er ingen tilgjengelige data på effekten av ivakaftor på fertilitet hos mennesker. Ivakaftor påvirket fertilitet hos rotter (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Ivakaftor har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ivakaftor kan medføre svimmelhet (se pkt. 4.8), og pasienter som blir svimle bør derfor frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner til symptomene avtar.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

De vanligste bivirkningene hos pasienter fra 6 års alder som fikk ivakaftor er hodepine (23,9 %), smerter i munn og svelg (22,0 %), øvre luftveisinfeksjon (22,0 %), nesetetthet (20,2 %), abdominalsmerter (15,6 %), nasofaryngitt (14,7 %), diaré (12,8 %), svimmelhet (9,2 %), utslett (12,8 %) og bakterier i sputum (12,8 %). Transaminaseøkninger forekom hos 12,8 % av pasienter behandlet med ivakaftor mot 11,5 % hos pasienter behandlet med placebo.

Hos pasienter i alderen 2 til under 6 år var de vanligste bivirkningene nesetetthet (26,5 %), øvre luftveisinfeksjon (23,5 %), transaminaseøkninger (14,7 %), utslett (11,8 %) og bakterier i sputum (11,8 %).

Alvorlige bivirkninger hos pasienter som mottok ivakaftor omfattet abdominalsmerter (0,9 %) og transaminaseøkninger (1,8 %), mens utslett som alvorlig bivirkning ble rapportert hos 1,5 % av pasienter i alderen 12 år og eldre behandlet i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor (se pkt. 4.4).

Bivirkningstabell

Tabell 4 gjenspeiler bivirkninger observert med ivakaftor monoterapi i kliniske studier (placebokontrollerte og ukontrollerte studier) hvor eksponering for ivakaftor varte fra 16 uker til 144 uker. Andre bivirkninger som observeres med ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor og/eller i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, er også angitt i tabell 4. Ytterligere bivirkninger observert med ivakaftor i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor er også presentert i tabell 3. Frekvensen av bivirkninger defineres på følgende måte: svært vanlige ($\geq 1/10$), vanlige ($\geq 1/100$ til $< 1/10$), mindre vanlige ($\geq 1/1000$ til $< 1/100$), sjeldne ($\geq 1/10\,000$ til $< 1/1000$), svært sjeldne ($< 1/10\,000$), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabell 4: Bivirkninger

Organklasser	Bivirkning	Frekvens
Infeksiøse og parasittære sykdommer	Øvre luftveisinfeksjon	svært vanlige
	Nasofaryngitt	svært vanlige
	Influenza [†]	vanlige
	Rhinitt	vanlige
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer	Hypoglykemi [†]	vanlige
Psykiatriske lidelser	Depresjon	ikke kjent
Nevrologiske sykdommer	Hodepine	svært vanlige
	Svimmelhet	svært vanlige
Sykdommer i øre og labyrint	Øresmerter	vanlige
	Ubehag i øret	vanlige
	Tinnitus	vanlige
	Trommehinnehyperemi	vanlige
	Vestibulær lidelse	vanlige
	Tette ører	mindre vanlige

Organklasser	Bivirkning	Frekvens
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum	Smerter i munn og svelg	svært vanlige
	Nesetetthet	svært vanlige
	Unormal pusting [†]	vanlige
	Rhinoré [†]	vanlige
	Tette bihuler	vanlige
	Erytem i svelget	vanlige
	Hvesing [†]	mindre vanlige
Gastrointestinale sykdommer	Abdominalsmerter	svært vanlige
	Diaré	svært vanlige
	Smerter i øvre abdomen [†]	vanlige
	Flatulens [†]	vanlige
	Kvalme [*]	vanlige
Sykdommer i lever og galleveier	Transaminaseøkninger	svært vanlige
	Økt alaninaminotransferase [†]	svært vanlige
	Økt aspartataminotransferase [†]	vanlige
	Leverskade [^]	ikke kjent
	Økt total bilirubin [^]	ikke kjent
Hud- og underhudssykdommer	Utslett	svært vanlige
	Akne [†]	vanlige
	Pruritus [†]	vanlige
Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer	Kuler i brystet	vanlige
	Brystinflammasjon	mindre vanlige
	Gynekomasti	mindre vanlige
	Brystvortelidelse	mindre vanlige
	Brystvortesmerter	mindre vanlige
Undersøkelser	Bakterier i sputum	svært vanlige
	Økt kreatinkinase i blod [†]	vanlige
	Økt blodtrykk [†]	mindre vanlige

* Bivirkninger og frekvens rapportert i kliniske studier med ivakaftor i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor

[†] Bivirkninger og frekvens rapportert kun i kliniske studier med ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

[^] Leverskade (økning i ALAT, ASAT og total bilirubin) rapportert etter markedsføring med ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Dette omfattet også leversvikt som medførte transplantasjon hos en pasient med underliggende cirrhose og portal hypertensjon. Frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Transaminaseøkninger

I de 48-ukers placebokontrollerte studiene 770-102 og 770-103 med ivakaftor som monoterapi hos pasienter fra 6 års alder var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8, > 5 eller > 3 x ULN henholdsvis 3,7 %, 3,7 % og 8,3 % hos pasienter behandlet med ivakaftor og 1,0 %, 1,9 % og 8,7 % hos pasienter behandlet med placebo. To pasienter, den ene på placebo og den andre på ivakaftor, seponerte behandlingen permanent på grunn av økte transaminaser, i begge tilfeller > 8 x ULN. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor fikk en transaminaseøkning > 3 x ULN forbundet med økt totalbilirubin > 1,5 x ULN. Hos pasienter behandlet med ivakaftor opphørte de fleste transaminaseøkninger opp til 5 x ULN uten behandlingsavbrudd. Ivakaftordoseringen ble avbrutt hos de fleste pasienter med transaminaseøkning > 5 x ULN. I alle tilfeller hvor dosering ble avbrutt på grunn av økte transaminaser og deretter gjenopptatt, kunne ivakaftordosering gjenopptas med godt resultat (se pkt. 4.4).

I løpet av de placebokontrollerte fase 3-studiene (inntil 24 uker) med tezakaftor/ivakaftor var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 eller $> 3 \times \text{ULN}$ 0,2 %, 1,0 % og 3,4 % hos pasienter behandlet med tezakaftor/ivakaftor og 0,4 %, 1,0 % og 3,4 % hos pasienter behandlet med placebo. Én pasient (0,2 %) på behandling og 2 pasienter (0,4 %) på placebo seponerte behandlingen permanent på grunn av økte transaminaser. Ingen pasienter behandlet med tezakaftor/ivakaftor opplevde en transaminaseøkning $> 3 \times \text{ULN}$ forbundet med økt total bilirubin $> 2 \times \text{ULN}$.

I løpet av den 24-ukers, placebokontrollerte fase 3-studien med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 eller $> 3 \times \text{ULN}$ 1,5 %, 2,5 % og 7,9 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, og 1,0 %, 1,5 % og 5,5 % hos pasienter som fikk placebo. Insidensen av bivirkninger med transaminaseøkninger var 10,9 % hos pasienter behandlet med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, og 4,0 % hos pasienter som fikk placebo. Tilfeller av seponering av behandling grunnet forhøyede transaminaser har blitt rapportert etter markedsføring (se pkt. 4.4).

Utslett

I studie 445-102 var insidensen av utslett (f.eks. utslett, kløende utslett) 10,9 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og 6,5 % hos pasienter som fikk placebo. Utslettene var vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad. Insidensen av utslett etter pasientens kjønn var 5,8 % hos menn og 16,3 % hos kvinner blant pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og 4,8 % hos menn og 8,3 % hos kvinner blant pasienter som fikk placebo. Hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor var insidensen av utslett 20,5 % hos kvinner som tok hormonelle prevensjonsmidler og 13,6 % hos kvinner som ikke tok hormonelle prevensjonsmidler (se pkt. 4.4).

Økt kreatinkinase

I studie 445-102 var insidensen av maksimal kreatinkinase $> 5 \times \text{ULN}$ 10,4 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og 5,0 % hos pasienter som fikk placebo. De observerte kreatinkinaseøkningene var vanligvis forbigående og asymptomatiske, og mange oppsto etter fysisk aktivitet. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor seponerte behandlingen grunnet økt kreatinkinase.

Høyt blodtrykk

I studie 445-102 var maksimal økning fra baseline i gjennomsnittlig systolisk og diastolisk blodtrykk henholdsvis 3,5 mmHg og 1,9 mmHg hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor (baseline: 113 mmHg systolisk og 69 mmHg diastolisk) og henholdsvis 0,9 mmHg og 0,5 mmHg hos pasienter som fikk placebo (baseline: 114 mmHg systolisk og 70 mmHg diastolisk).

Andelen av pasienter som hadde systolisk blodtrykk > 140 mmHg eller diastolisk blodtrykk > 90 mmHg ved minst to anledninger, var henholdsvis 5,0 % og 3,0 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor sammenlignet med henholdsvis 3,5 % og 3,5 % hos pasienter som fikk placebo.

Pediatrik populasjon

Ivakaftor som monoterapi

Sikkerheten til ivakaftor som monoterapi i 24 uker ble evaluert hos 43 pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneder (7 av dem under 4 måneder), 34 pasienter i alderen 2 til under 6 år, 61 pasienter i alderen 6 til under 12 år og 94 pasienter i alderen 12 til under 18 år.

Sikkerhetsprofilen til ivakaftor (som monoterapi eller i et kombinasjonsregime) er generelt lik hos pediatriske pasienter og er også i samsvar med voksne pasienter.

Insidensen av økte transaminaser (ALAT eller ASAT) observert i studie 770-103, 770-111 og 770-110 (pasienter 6 år til under 12 år), studie 770-108 (pasienter 2 år til under 6 år) og studie 770-124 (pasienter 1 måned til under 24 måneder) er beskrevet i tabell 5. I de placebokontrollerte studiene var insidensen av transaminaseøkninger tilsvarende for behandling med ivakaftor (15,0 %) og placebo (14,6 %). Maksimale LFT-økninger var generelt høyere hos pediatriske pasienter enn hos eldre pasienter. Hos alle populasjoner gikk maksimale LFT-økninger tilbake til baselinivåer etter avbrutt dosering. I nesten alle tilfeller hvor dosering ble avbrutt på grunn av økte transaminaser og deretter gjenopptatt, kunne ivakaftordosering gjenopptas med godt resultat (se pkt. 4.4). Tilfeller som indikerte "positiv rechallenge" (gjentatt reaksjon ved gjentatt behandling) ble observert.

I studie 770-108 ble ivakaftor varig seponert hos én pasient. I studie 770-124, i kohorten med pasienter i alderen 1 måned til under 4 måneder, hadde en 1 måned gammel (14,3 %) pasient transaminaseverdier på ALAT > 8 ULN og ASAT > 3 til ≤ 5 x ULN, som medførte seponering av behandling med ivakaftor (se pkt. 4.4 for håndtering av økte transaminaser).

Tabell 5: Økte transaminaser hos pasienter i alderen 1 måned til < 12 år som behandles med ivakaftor som monoterapi

Aldersgruppe	n	%-andel pasienter > 3 x ULN	%-andel pasienter > 5 x ULN	%-andel pasienter > 8 x ULN
6 til < 12 år	40	15,0 % (6)	2,5 % (1)	2,5 % (1)
2 til < 6 år	34	14,7 % (5)	14,7 % (5)	14,7 % (5)
12 til < 24 måneder	18	27,8 % (5)	11,1 % (2)	11,1 % (2)
1 til < 12 måneder	24	8,3 % (2)	4,2 % (1)	4,2 % (1)

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor

Sikkerheten til tezakaftor/ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor ble evaluert hos 124 pasienter i alderen 6 år til under 12 år. Dosen tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg og ivakaftor 150 mg har ikke blitt undersøkt i kliniske studier hos barn i alderen 6 år til under 12 år som veier 30 til < 40 kg.

Sikkerhetsprofilen er generelt lik hos barn og ungdom, og samsvarer også med den hos voksne pasienter.

I den 24-ukers, åpne fase 3-studien hos pasienter i alderen 6 år til under 12 år (studie 661-113 del B, n = 70), var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8, > 5 og > 3 x ULN henholdsvis 1,4 %, 4,3 % og 10,0 %. Ingen pasienter behandlet med tezakaftor/ivakaftor fikk en transaminaseøkning > 3 x ULN forbundet med økt totalbilirubin > 2 x ULN eller seponerte behandling med tezakaftor/ivakaftor på grunn av økte transaminaser. Én pasient avbrøt behandling på grunn av økte transaminaser, og gjenopptok behandling med tezakaftor/ivakaftor med godt resultat (se pkt. 4.4 for håndtering av økte transaminaser).

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

Sikkerhetsdata for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor i kombinasjon med ivakaftor i studie 445-102, 445-103, 445-104, 445-106 og 445-111 ble evaluert hos 228 pasienter i alderen 2 år til under 18 år. Sikkerhetsprofilen er generelt lik hos pediatriske og voksne pasienter.

I studie 445-106 hos pasienter i alderen 6 år til under 12 år, var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8, > 5 og > 3 x ULN henholdsvis 0,0 %, 1,5 % og 10,6 %. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor fikk en transaminaseøkning > 3 x ULN forbundet med økt totalbilirubin > 2 x ULN eller seponerte behandling på grunn av økte transaminaser (se pkt. 4.4).

I studie 445-111 hos pasienter i alderen 2 år til under 6 år, var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8, > 5 og > 3 x ULN henholdsvis 1,3 %, 2,7 % og 8,0 %. Ingen pasienter

behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor fikk en transaminaseøkning > 3 x ULN forbundet med økt totalbilirubin > 2 x ULN eller seponerte behandling på grunn av økte transaminaser (se pkt. 4.4).

Utslett

I studie 445-111 hos pasienter i alderen 2 år til under 6 år, fikk 15 (20,0 %) forsøkspersoner minst 1 tilfelle med utslett, 4 (9,8 %) jenter og 11 (32,4%) gutter.

Uklar linse

Én pasient fikk en uønsket hendelse med uklar linse.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via [det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V](#).

4.9 Overdosering

Det finnes intet spesifikt antidot mot overdosering med ivakaftor. Behandling av overdosering består av generelle støttetiltak, inkludert overvåking av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av pasientens kliniske status.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet, ATC-kode: R07AX02

Virkningsmekanisme

Ivakaftor er en forsterker av CFTR-proteinet, dvs. *in vitro* øker ivakaftor CFTR-kanalreguleringen slik at transporten av klorid øker ved spesifikke mutasjoner (som angitt i pkt. 4.1) med redusert sannsynlighet for åpen kanal sammenlignet med normal CFTR. Ivakaftor øker også sannsynlighet for åpen kanal ved *R117H-CFTR*, som har både lav sannsynlighet for åpen kanal (regulering) og redusert kanalgjennomstrømningsamplitude (konduktans). *G970R*-mutasjonen forårsaker en spleisefeil som gir lite eller ingen CFTR-protein på celleoverflaten, hvilket kan forklare resultatene observert hos forsøkspersoner med denne mutasjonen i studie 770-111 (se Farmakodynamiske effekter og Klinisk effekt og sikkerhet).

In vitro-respons sett i patch clamp-eksperimenter med enkeltkanaler ved bruk av membranlapper fra gnagerceller som uttrykker mutante CFTR-former, korresponderer ikke nødvendigvis med farmakodynamisk respons *in vivo* (f.eks. klorid i svette) eller klinisk effekt. Den eksakte mekanismen som gjør at ivakaftor forsterker reguleringsaktiviteten hos normale og visse mutante CFTR-former i dette systemet har ikke blitt fullstendig belyst.

Farmakodynamiske effekter

Ivakaftor som monoterapi

I studie 770-102 og 770-103 med pasienter med *G551D*-mutasjon i ett allel av *CFTR*-genet, ga ivakaftor rask (15 dager), betydelig (gjennomsnittlig endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 24 var henholdsvis -48 mmol/l [95 % KI -51, -45] og -54 mmol/l [95 % KI -62, -47]) og vedvarende (i 48 uker) reduksjon i kloridkonsentrasjonen i svette.

I studie 770-111, del 1 med pasienter som hadde en ikke-*G551D*-mutasjon i *CFTR*-genet, medførte behandling med ivakaftor en rask (15 dager) og betydelig gjennomsnittlig endring i klorid i svette på -49 mmol/l (95 % KI -57, -41) fra baseline til og med behandlingsuke 8. Hos pasienter med *G970R-CFTR*-mutasjon var imidlertid gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i klorid i svette til uke 8 -6,25 (6,55) mmol/l. Det ble sett tilsvarende resultater i del 2 av studien som i del 1. Ved oppfølgingskontroll i uke 4 (4 uker etter avsluttet dosering med ivakaftor), gikk gjennomsnittsverdien for klorid i svette i hver gruppe mot nivået før behandling.

I studie 770-110 med CF-pasienter som var 6 år eller eldre som hadde en *R117H*-mutasjon i *CFTR*-genet, var behandlingsforskjellen i gjennomsnittlig endring fra baseline i klorid i svette etter 24 ukers behandling -24 mmol/l (95 % KI -28, -20). I en undergruppeanalyse basert på alder var behandlingsforskjellen -21,87 mmol/l (95 % KI -26,46, -17,28) hos pasienter fra 18 års alder, og -27,63 mmol/l (95 % KI -37,16, -18,10) hos pasienter i alderen 6 til 11 år. To pasienter i alderen 12 til 17 år ble inkludert i denne studien.

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor

I studie 661-106 (pasienter som var homozygote for *F508del*-mutasjonen), var behandlingsforskjellen mellom ivakaftor i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor og placebo i gjennomsnittlig absolutt endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 24, -10,1 mmol/l (95 % KI: -11,4, -8,8).

I studie 661-108 (pasienter som var heterozygote for *F508del*-mutasjonen med en ytterligere mutasjon forbundet med CFTR restaktivitet), var behandlingsforskjellen i gjennomsnittlig absolutt endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 8, -9,5 mmol/l (95 % KI: -11,7, -7,3) mellom tezakaftor/ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor og placebo, og -4,5 mmol/l (95 % KI: -6,7, -2,3) mellom ivakaftor og placebo.

I studie 661-115 (pasienter i alderen 6 år til under 12 år som var homozygote eller heterozygote for *F508del*-mutasjonen med en ytterligere mutasjon forbundet med CFTR restaktivitet), var gjennomsnittlig absolutt endring innen behandlingen i klorid i svette fra baseline til uke 8, -12,3 mmol/l (95 % KI: -15,3, -9,3) i tezakaftor/ivakaftorgruppen.

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

I studie 445-102 (pasienter med en *F508del*-mutasjon på det ene allelet og en mutasjon på det andre allelet som indikerer enten ingen produksjon av et CFTR-protein eller produksjon av et CFTR-protein som ikke transporterer klorid og ikke responderer på ivakaftor og tezakaftor/ivakaftor (mutasjon med minimal funksjon) *in vitro*), var behandlingsforskjellen for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor sammenlignet med placebo for gjennomsnittlig absolutt endring i svetteklorid fra baseline til og med uke 24 – 41,8 mmol/l (95 % KI: -44,4, -39,3).

I studie 445-103 (pasienter som er homozygote for *F508del*-mutasjonen), er behandlingsforskjellen for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor sammenlignet med tezakaftor/ivakaftor for absolutt gjennomsnittlig endring i svetteklorid fra baseline ved uke 4 -45,1 mmol/l (95 % KI: -50,1, -40,1).

I studie 445-104 (pasienter som er heterozygote for *F508del*-mutasjonen og har en mutasjon på det andre allelet med en reguleringsfeil eller CFTR restaktivitet), er behandlingsforskjellen for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor sammenlignet med kontrollgruppen (ivakaftor monoterapigruppe eller tezakaftor/ivakaftor i kombinasjon med ivakaftorgruppe) for absolutt gjennomsnittlig endring i svetteklorid fra baseline til og med uke 8 -23,1 mmol/l (95 % KI: -26,1, -20,1).

I studie 445-106 (pasienter i alderen 6 til 12 år som er homozygote for *F508del*-mutasjonen eller heterozygote for *F508del*-mutasjonen og har en mutasjon med minimal funksjon), var gjennomsnittlig absolutt endring i klorid i svette fra baseline (n = 62) til og med uke 24 (n = 60), -60,9 mmol/l (95 % KI: -63,7; -58,2)*. Gjennomsnittlig absolutt endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 12 (n = 59) var -58,6 mmol/l (95 % KI: -61,1, -56,1).

* Ikke alle deltakere inkludert i analysene hadde tilgjengelige data for alle oppfølgingsbesøk, spesielt fra og med uke 16. Muligheten til å innhente data i uke 24 ble forhindret av covid-19-pandemien. Data fra uke 12 ble i mindre grad påvirket av pandemien.

I studie 445-116 (pasienter i alderen 6 til 12 år som er heterozygote for *F508del*-mutasjonen og har en mutasjon med minimal funksjon), var gjennomsnittlig behandlingsforskjell mellom ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor i kombinasjon med ivakaftorgruppe og placebo for absolutt endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 24, -51,2 mmol/l (95 % KI: -55,3, -47,1).

Klinisk effekt og sikkerhet

Ivakaftor som monoterapi

Studie 770-102 og 770-103: Studier av pasienter med CF med *G551D*-mutasjoner

Effekten til ivakaftor har blitt utredet i to randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte, multisenter, fase III-studier av klinisk stabile pasienter med CF som hadde *G551D*-mutasjon i *CFTR*-genet i minst ett allel og forventet FEV₁ ≥ 40 %.

Pasienter i begge studier ble randomisert 1:1 til å få 150 mg ivakaftor eller placebo hver 12. time sammen med fettholdig mat i 48 uker i tillegg til sin forskrevne CF-behandling (f.eks. tobramycin, dornase-alfa). Bruk av inhalert hypertont natriumkloridoppløsning var ikke tillatt.

Studie 770-102 evaluerte 161 pasienter som var 12 år eller eldre. 122 (75,8 %) pasienter hadde *F508del*-mutasjonen i det andre allelet. Ved studiestart brukte pasientene i placebogruppen visse legemidler hyppigere enn i ivakaftorgruppen. Disse legemidlene omfattet dornasealfa (73,1 % mot 65,1 %), salbutamol (53,8 % mot 42,2 %), tobramycin (44,9 % mot 33,7 %) og salmeterol/flutikason (41,0 % mot 27,7 %). Ved baseline var gjennomsnittlig forventet FEV₁ 63,6 % (variasjonsbredde: 31,6 % til 98,2 %), og gjennomsnittlig alder var 26 år (variasjonsbredde: 12 til 53 år).

Studie 770-103 evaluerte 52 pasienter som var 6 til 11 år ved screening. Gjennomsnittlig (SD) kroppsvekt var 30,9 (8,63) kg; 42 (80,8 %) pasienter hadde *F508del*-mutasjonen i det andre allelet. Ved baseline var gjennomsnittlig forventet FEV₁ 84,2 % (variasjonsbredde: 44,0 % til 133,8 %), og gjennomsnittlig alder var 9 år (variasjonsbredde: 6 til 12 år); 8 (30,8 %) pasienter i placebogruppen og 4 (15,4 %) pasienter i ivakaftorgruppen hadde en forventet FEV₁ under 70 % ved baseline.

Primært effektendepunkt i begge studier var gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i prosent forventet FEV₁ etter 24 ukers behandling.

Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig absolutt endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 var 10,6 prosentpoeng (8,6, 12,6) i studie 770-102 og 12,5 prosentpoeng (6,6, 18,3) i studie 770-103. Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig relativ endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 var 17,1 % (13,9, 20,2) i studie 770-102 og 15,8 % (8,4, 23,2) i studie 770-103. Gjennomsnittlig endring fra baseline til og med uke 24 i FEV₁ (liter) var 0,37 liter i ivakaftorgruppen og 0,01 liter i placebogruppen i studie 770-102 og 0,30 liter i ivakaftorgruppen og 0,07 liter i placebogruppen i studie 770-103. I begge studier startet bedring i FEV₁ raskt (dag 15) og vedvarte i 48 uker.

Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig absolutt endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 hos pasienter i alderen 12 til 17 år i studie 770-102 var 11,9 prosentpoeng (5,9, 17,9). Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig absolutt endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 hos pasienter med baseline forventet FEV₁ over 90 % i studie 770-103 var 6,9 prosentpoeng (-3,8, 17,6).

Resultatene for klinisk relevante sekundære endepunkter er vist i tabell 6.

Tabell 6: Effekt av ivakaftor på andre effektendepunkter i studie 770-102 og 770-103

	Studie 770-102		Studie 770-103	
Endepunkt	Behandlings-forskjell ^a (95 % KI)	P-verdi	Behandlings-forskjell ^a (95 % KI)	P-verdi
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i CFQ-R^b respirasjonsdomene-score (poeng)^c				
Til og med uke 24	8,1 (4,7, 11,4)	< 0,0001	6,1 (-1,4, 13,5)	0,1092
Til og med uke 48	8,6 (5,3, 11,9)	< 0,0001	5,1 (-1,6, 11,8)	0,1354
Relativ risiko for lungeforverring				
Til og med uke 24	0,40 ^d	0,0016	NA	NA
Til og med uke 48	0,46 ^d	0,0012	NA	NA
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i kroppsvekt (kg)				
I uke 24	2,8 (1,8, 3,7)	< 0,0001	1,9 (0,9, 2,9)	0,0004
I uke 48	2,7 (1,3, 4,1)	0,0001	2,8 (1,3, 4,2)	0,0002
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i BMI (kg/m²)				
I uke 24	0,94 (0,62, 1,26)	< 0,0001	0,81 (0,34, 1,28)	0,0008
I uke 48	0,93 (0,48, 1,38)	< 0,0001	1,09 (0,51, 1,67)	0,0003
Gjennomsnittlig endring fra baseline i z-score				
Vekt-for-alder z-score i uke 48 ^e	0,33 (0,04, 0,62)	0,0260	0,39 (0,24, 0,53)	< 0,0001
BMI-for-alder z-score i uke 48 ^e	0,33 (0,002, 0,65)	0,0490	0,45 (0,26, 0,65)	< 0,0001

KI: konfidensintervall, NA: ikke analysert på grunn av lav insidens av hendelser

^a Behandlingsforskjell = effekt av ivakaftor – effekt av placebo

^b CFQ-R: Det reviderte spørreskjemaet for cystisk fibrose er et sykdomsspesifikt, helse relatert livskvalitetsmål for CF.

^c Studie 770-102-data ble sammenslått for CFQ-R for voksne/ungdom og CFQ-R for barn i alderen 12 til 13 år, studie 770-103-data ble hentet fra CFQ-R for barn i alderen 6 til 11 år.

^d Risikoforhold for tid til første lungeforverring

^e Hos forsøkspersoner under 20 år (CDC-vekstskjema)

Studie 770-111: studie med pasienter med CF med ikke-G551D-mutasjoner

Studie 770-111 var en fase III, todelt, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, krysset studie (del 1) etterfulgt av en 16 ukers åpen forlengelsesperiode (del 2) for å evaluere effekt og sikkerhet av ivakaftor hos pasienter med CF i alderen 6 år og eldre som hadde en G970R- eller ikke-G551D-mutasjon i CFTR-genet (G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N, S1255P eller G1349D).

I del 1 ble pasientene randomisert 1:1 til å få 150 mg ivakaftor eller placebo hver 12. time sammen med fettholdig mat i 8 uker i tillegg til sin foreskrevne CF-behandling, og bytte over til den andre behandlingen i de neste 8 ukene etter en 4 til 8 ukers utvaskingsperiode. Bruk av inhalert hypertont saltvannssoppløsning var ikke tillatt. I del 2 fikk alle pasienter ivakaftor som indisert i del 1 i ytterligere 16 uker. Varigheten av kontinuerlig ivakaftorbehandling var 24 uker for pasienter randomisert til del 1 placebo/ivakaftorbehandlingssekvens og 16 uker for pasienter randomisert til del 1 ivakaftor/placebobehandlingssekvens.

Trettini pasienter (gjennomsnittlig alder 23 år) med baseline forventet FEV₁ ≥ 40 % (gjennomsnittlig forventet FEV₁ 78 % [variasjonsbredde: 43 % til 119 %]) ble inkludert. Sekstito prosent (24/39) av

dem var bærere av *F508del-CFTR*-mutasjonen i det andre allelet. Totalt 36 pasienter fortsatte i del 2 (18 per behandlingssekvens).

I del 1 av studie 770-111 var gjennomsnittlig prosent forventet FEV₁ ved baseline 79,3 % hos placebobehandlede pasienter og 76,4 % hos pasienter behandlet med ivakaftor. Gjennomsnittlig samlet verdi etter baseline var henholdsvis 76,0 % og 83,7 %. Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 8 i prosent forventet FEV₁ (primært effektendepunkt) var 7,5 % i ivakaftorperioden og -3,2 % i placeboperioden. Observert behandlingsforskjell (95 % KI) mellom ivakaftor og placebo var 10,7 % (7,3, 14,1) ($P < 0,0001$).

Ivakaftors effekt i totalpopulasjonen i studie 770-111 (inkludert de sekundære endepunktene absolutt endring i BMI til behandlingsuke 8 og absolutt endring i CFQ-R respirasjonsdomene-score til og med behandlingsuke 8) og basert på individuell mutasjon (absolutt endring i klorid i svette og i prosent forventet FEV₁ til uke 8) er vist i tabell 7. Effekt hos pasienter med *G970R*-mutasjon kunne ikke fastslås på bakgrunn av klinisk (prosent forventet FEV₁) og farmakodynamisk (klorid i svette) respons på ivakaftor.

Tabell 7: Effekt av ivakaftor på effektvariabler hos totalpopulasjonen og ved spesifikke *CFTR*-mutasjoner

Absolutt endring i prosent forventet FEV ₁	BMI (kg/m ²)	CFQ-R respirasjonsdomene-score (poeng)
Til og med uke 8	I uke 8	Til og med uke 8
Alle pasienter (N = 39) Resultater vist som gjennomsnittlig (95 % KI) endring fra baseline for pasienter behandlet med ivakaftor sammenlignet med placebo:		
10,7 (7,3, 14,1)	0,66 (0,34, 0,99)	9,6 (4,5, 14,7)
Pasienter gruppert under mutasjonstyper (n) Resultater vist som gjennomsnittlig (minste, største) endring fra baseline for pasienter behandlet med ivakaftor i uke 8 [*] :		
Mutasjon (n)	Absolutt endring i klorid i svette (mmol/l)	Absolutt endring i prosent forventet FEV ₁ (prosentpoeng)
	I uke 8	I uke 8
<i>G1244E</i> (5)	-55 (-75, -34)	8 (-1, 18)
<i>G1349D</i> (2)	-80 (-82, -79)	20 (3, 36)
<i>G178R</i> (5)	-53 (-65, -35)	8 (-1, 18)
<i>G551S</i> (2)	-68 [†]	3 [†]
<i>G970R</i> [#] (4)	-6 (-16, -2)	3 (-1, 5)
<i>S1251N</i> (8)	-54 (-84, -7)	9 (-20, 21)
<i>S1255P</i> (2)	-78 (-82, -74)	3 (-1, 8)
<i>S549N</i> (6)	-74 (-93, -53)	11 (-2, 20)
<i>S549R</i> (4)	-61 ^{††} (-71, -54)	5 (-3, 13)

* Statistisk testing ikke gjennomført på grunn av lavt antall individuelle mutasjoner.

[†] Gjenspeiler resultater fra den ene pasienten med *G551S*-mutasjon med data for tidspunktet 8 uker.

^{††} n = 3 for analyse av absolutt endring i klorid i svette.

[#] Forårsaker en spleisefeil som gir lite eller ingen CFTR-protein på celleoverflaten.

I del 2 av studie 770-111 var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ etter 16 uker (pasienter randomisert til ivakaftor/placebobehandlingssekvensen i del 1) med kontinuerlig ivakaftorbehandling 10,4 % (13,2 %). Ved oppfølgingskontroll 4 uker etter avsluttet dosering med ivakaftor var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ fra del 2 uke 16 -5,9 % (9,4 %). For pasienter randomisert til placebo/ivakaftorbehandlingsekvensen i del 1 var det en ytterligere gjennomsnittlig (SD) endring på 3,3 % (9,3 %) i prosent forventet FEV₁ etter ytterligere 16 behandlingsuker med ivakaftor. Ved oppfølgingskontroll 4 uker etter avsluttet dosering med

ivakaftor var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ fra del 2 uke 16 -7,4 % (5,5 %).

Studie 770-104: studie med pasienter med CF og F508del-mutasjon i CFTR-genet

Studie 770-104 (del A) var en 16 ukers, 4:1 randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, parallellgruppe, fase II-studie av ivakaftor (150 mg hver 12. time) hos 140 pasienter med CF i alderen 12 år eller eldre og homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet og hadde forventet FEV₁ ≥ 40 %.

Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 16 i prosent forventet FEV₁ (primært effektendepunkt) var 1,5 prosentpoeng i ivakaftorgruppen og -0,2 prosentpoeng i placebogruppen. Anslått behandlingsforskjell mellom ivakaftor og placebo var 1,7 prosentpoeng (95 % KI: -0,6, 4,1). Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant ($P = 0,15$).

Studie 770-105: åpen forlengelsesstudie

I studie 770-105 fikk pasienter som fullførte behandling i studie 770-102 og 770-103 med placebo bytte til ivakaftor, mens pasienter som hadde fått ivakaftor fortsatte å få det i minst 96 uker, dvs. behandlingens lengden med ivakaftor var minst 96 uker for pasienter i placebo/ivakaftorgruppen og minst 144 uker for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen.

Etthundreogførtifire (144) pasienter fra studie 770-102 ble overført til studie 770-105, 67 i placebo/ivakaftorgruppen og 77 i ivakaftor/ivakaftorgruppen. Førtiåtte (48) pasienter fra studie 770-103 ble overført til studie 770-105, 22 i placebo/ivakaftorgruppen og 26 i ivakaftor/ivakaftorgruppen.

Tabell 8 viser resultater for gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ for begge pasientgrupper. For pasienter i placebo/ivakaftorgruppen er baseline prosent forventet FEV₁ fra studie 770-105, og for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen er baselineverdien fra studie 770-102 og 770-103.

Tabell 8: Effekt av ivakaftor på prosent forventet FEV₁ i studie 770-105

Opprinnelig studie og behandlingsgruppe	Varighet av ivakaftorbehandling (uker)	Absolutt endring fra baseline i prosent forventet FEV ₁ (prosentpoeng)	
		N	Gjennomsnitt (SD)
Studie 770-102			
Ivakaftor	48*	77	9,4 (8,3)
	144	72	9,4 (10,8)
Placebo	0*	67	-1,2 (7,8) [†]
	96	55	9,5 (11,2)
Studie 770-103			
Ivakaftor	48*	26	10,2 (15,7)
	144	25	10,3 (12,4)
Placebo	0*	22	-0,6 (10,1) [†]
	96	21	10,5 (11,5)

* Behandling i blindet, kontrollert, 48 ukers fase III-studie.

[†] Endring fra baseline i forrige studie etter 48 ukers placebobehandling.

Når gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ fra baseline i studie 770-105 ble sammenlignet var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ 0,0 % (9,05) for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen (n = 72) overført fra studie 770-102, og 0,6 % (9,1) for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen (n = 25) overført fra studie 770-103. Dette viser at pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen beholdt bedringen i prosent forventet FEV₁ sett i uke 48 i den første studien (dag 0 til og med uke 48) til og med uke 144. Det var ingen ytterligere bedring i studie 770-105 (uke 48 til og med uke 144).

For pasienter i placebo/ivakaftorgruppen fra studie 770-102 var årlig grad av lungeforverring høyere i den første studien hvor pasientene fikk placebo (1,34 hendelser/år) enn i den påfølgende studie 770-105 hvor pasientene byttet til ivakaftor (0,48 hendelser/år fra dag 1 til uke 48, og 0,67 hendelser/år fra uke 48 til 96). For pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen fra studie 1 var årlig grad av lungeforverring 0,57 hendelser/år fra dag 770-102 til uke 48 når pasientene fikk ivakaftor. Når de ble overført til studie 770-105 var årlig grad av lungeforverring 0,91 hendelser/år fra dag 1 til uke 48 og 0,77 hendelser/år fra uke 48 til 96.

For pasienter overført fra studie 770-103 var antall hendelser generelt lav.

Studie 770-110: studie med pasienter med CF med en R117H-mutasjon i CFTR-genet

Studie 770-110 evaluerte 69 pasienter som var 6 år eller eldre; 53 (76,8 %) av pasientene hadde *F508del*-mutasjonen i det andre allelet. Bekreftet *R117H* poly-T-variant var *5T* hos 38 pasienter og *7T* hos 16 pasienter. Ved baseline var gjennomsnittlig forventet FEV₁ 73 % (variasjonsbredde: 32,5 % til 105,5 %), og gjennomsnittlig alder var 31 år (variasjonsbredde: 6 til 68 år). Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 24 i prosent forventet FEV₁ (primært effektendepunkt) var 2,57 prosentpoeng i ivakaftorgruppen og 0,46 prosentpoeng i placebogruppen. Anslått behandlingsforskjell mellom ivakaftor og placebo var 2,1 prosentpoeng (95 % KI: -1,1, 5,4).

En planlagt undergruppeanalyse ble gjennomført hos pasienter i alderen 18 år eller eldre (26 pasienter på placebo og 24 pasienter på ivakaftor). Behandling med ivakaftor medførte en gjennomsnittlig absolutt endring i prosent forventet FEV₁ til og med uke 24 på 4,5 prosentpoeng i ivakaftorgruppen og -0,46 prosentpoeng i placebogruppen. Anslått behandlingsforskjell mellom ivakaftor og placebo var 5,0 prosentpoeng (95 % KI: 1,1, 8,8).

I en undergruppeanalyse hos pasienter med bekreftet *R117H-5T* genetisk variant, var forskjellen i gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 24 i prosent forventet FEV₁ mellom ivakaftor og placebo 5,3 % (95 % KI 1,3, 9,3). Hos pasienter med bekreftet *R117H-7T* genetisk variant, var behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo 0,2 % (95 % KI: -8,1, 8,5).

For sekundære effektvariabler ble det ikke observert behandlingsforskjeller mellom ivakaftor og placebo i absolutt endring fra baseline i BMI i uke 24 eller tid til første lungeforverring. Det ble observert behandlingsforskjeller i absolutt endring i CFQ-R respirasjonsdomene-score til og med uke 24 (behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo var 8,4 [95 % KI: 2,2, 14,6] poeng) og for gjennomsnittlig endring fra baseline i klorid i svette (se Farmakodynamiske effekter).

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

Effekten og sikkerheten til ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor hos pasienter med CF 12 år og eldre, ble undersøkt i to kliniske studier; en 24 ukers, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie med 504 pasienter som var homozygote for *F508del*-mutasjonen (studie 661-106); og en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert og ivakaftorkontrollert, 8 ukers overkrysningsstudie med 2 perioder og 3 behandlinger, med 244 pasienter som heterozygote for *F508del*-mutasjonen med en ytterligere mutasjon forbundet med CFTR restaktivitet (studie 661-108). Langtidssikkerhet og -effekt av kombinasjonsregimet ble også undersøkt i begge pasientpopulasjoner i en 96 ukers åpen, rollover, langtidsforlengelsesstudie (studie 661-110). Se preparatomtale for tezakaftor/ivakaftor for ytterligere data.

Effekten og sikkerheten til ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor hos pasienter 12 år og eldre ble demonstrert i tre fase 3-studier som var randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte (pasientene var heterozygote for *F508del*-mutasjonen og hadde en mutasjon med minimal funksjon på det andre allelet, n = 403) og hadde aktiv kontroll (pasientene var homozygote for *F508del*-mutasjonen, n = 107, eller heterozygote for *F508del*-mutasjonen og hadde en mutasjon med reguleringsfeil eller CFTR restaktivitet på det andre allelet, n = 258) og var av henholdsvis 24 (studie 445-102), 4 (studie 445-103) og 8 ukers (studie 445-104) varighet. Pasienter fra alle studiene

var kvalifisert til å delta i åpne, rollover, langtidsforlengelsesstudier (studie 445-105 eller studie 445-110). Se preparatomtalen for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor for ytterligere data.

Pediatrisk populasjon

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor

Effekt og sikkerhet hos pasienter i alderen 6 år til under 12 år (gjennomsnittsalder 8,6 år) ble undersøkt i en 8 ukers, dobbeltblindet fase 3-studie (studie 661-115) med 67 pasienter som ble randomisert 4:1 til ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor eller en blindet gruppe. Førtilo pasienter var homozygote for *F508del*-mutasjonen (F/F) og 12 var heterozygote for *F508del*-mutasjonen med en ytterligere mutasjon forbundet med CFTR restaktivitet (F/RF). Pasienter var kvalifisert til å delta i en åpen, rollover, 96-ukers studie (studie 661-116 del A). Se preparatomtale for tezakaftor/ivakaftor for ytterligere data.

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

Farmakokinetikk og sikkerhet hos pasienter i alderen 6 til under 12 år (n = 66) og hos pasienter fra 2 til under 6 år (n = 75) som hadde minst én *F508del*-mutasjon, ble undersøkt i to 24-ukers, åpne studier (studie 445-106 og studie 445-116). Se preparatomtale for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor for ytterligere data.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Farmakokinetikken til ivakaftor er lik hos friske, voksne forsøkspersoner og pasienter med CF.

Etter en oral 150 mg enkeltdose gitt til friske forsøkspersoner etter et måltid var gjennomsnittlig ($\pm$ SD) AUC og $C_{\max}$ henholdsvis 10,60 (5,26) mikrog.time/ml og 0,768 (0,233) mikrog/ml. Etter dosering hver 12. time ble steady-state plasmakonsentrasjon av ivakaftor nådd på dag 3 til 5, med et akkumuleringsforhold på 2,2 til 2,9.

Absorpsjon

Etter gjentatt oral dosering med ivakaftor økte ivakaftoreksponeringen vanligvis med dosen fra 25 mg hver 12. time til 450 mg hver 12. time. Da det ble gitt sammen med fettholdig mat, økte ivakaftoreksponeringen ca. 2,5 til 4 ganger. Ved samtidig administrering med tezakaftor og eleksakaftor, var økningen i AUC lignende (henholdsvis omtrent 3 ganger så høy og 2,5 til 4 ganger så høy). Ivakaftor gitt som monoterapi eller i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, bør derfor gis sammen med fettholdig mat. Median (variasjonsbredde) $t_{\max}$ er ca. 4,0 (3,0, 6,0) timer etter et måltid.

Ivakaftor granulat (2 x 75 mg doseposser) hadde samme biotilgjengelighet som 150 mg tabletter gitt sammen med fettholdig mat til friske voksne forsøkspersoner. Geometrisk minste kvadrats gjennomsnittsforshold (90 % KI) for granulat i forhold til tabletter var 0,951 (0,839, 1,08) for $AUC_{0-\infty}$ og 0,918 (0,750, 1,12) for $C_{\max}$. Effekten av mat på ivakaftors absorpsjon er lik for begge formuleringer, dvs. tabletter og granulat.

Distribusjon

Ivakaftor er ca. 99 % plasmaproteinbundet, hovedsakelig til surt alfa 1-glykoprotein og albumin. Ivakaftor bindes ikke til erytrocytter hos mennesker. Etter oral administrering av ivakaftor 150 mg hver 12. time etter et måltid i 7 dager hos friske forsøkspersoner, var gjennomsnittlig ($\pm$ SD) tilsynelatende distribusjonsvolum 353 (122) liter.

Biotransformasjon

Ivakaftor blir omfattende metabolisert hos mennesker. *In vitro*- og *in vivo*-data indikerer at ivakaftor hovedsakelig metaboliseres av CYP3A. M1 og M6 er ivakaftors to hovedmetabolitter hos mennesker. M1 har ca. en sjettedel av ivakaftors potens og anses å være farmakologisk aktivt. M6 har mindre enn en femtiendedel av ivakaftors potens og anses ikke å være farmakologisk aktivt.

Effekten av CYP3A4*22 heterozygot genotype på eksponering for ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor samsvarer med effekten av samtidig administrering av en svak CYP3A4-hemmer, som ikke er klinisk relevant. Ingen dosejustering av ivakaftor, tezakaftor eller eleksakaftor vurderes som nødvendig. Effekten hos pasienter med CYP3A4*22 homozygot genotype forventes å være sterkere. Det er imidlertid ingen tilgjengelige data for disse pasientene.

Eliminasjon

Etter oral administrering hos friske forsøkspersoner ble mesteparten av ivakaftor (87,8 %) eliminert i fæces etter metabolisering. Hovedmetabolittene M1 og M6 tilsvarer ca. 65 % av eliminert totaldose, med 22 % som M1 og 43 % som M6. Det var ubetydelig urinutskillelse av ivakaftor som uendret modersubstans. Tilsynelatende terminal halveringstid var ca. 12 timer etter en enkeltdose gitt etter et måltid. Tilsynelatende clearance (CL/F) av ivakaftor var tilsvarende hos friske forsøkspersoner og pasienter med CF. Gjennomsnittlig ($\pm$ SD) CL/F for en 150 mg enkeltdose var 17,3 (8,4) liter/time hos friske forsøkspersoner.

Linearitet/ikke-linearitet

Farmakokinetikken til ivakaftor er vanligvis lineær med hensyn til tid i doseområdet fra 25 mg til 250 mg.

Spesielle populasjoner

Nedsatt leverfunksjon

Etter en enkeltdose på 150 mg ivakaftor hadde voksne forsøkspersoner med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B, score 7 til 9) tilsvarende ivakaftor $C_{\max}$ (gjennomsnitt [$\pm$ SD] på 0,735 [0,331] mikrog/ml), men ca. dobbel ivakaftor AUC_{0-∞} (gjennomsnitt [$\pm$ SD] på 16,80 [6,14] mikrog time/ml) sammenlignet med friske forsøkspersoner med tilsvarende demografi. Simuleringer for å forutsi steady-state ivakaftoreksponering viste at ved å redusere dosen fra 150 mg hver 12. time til 150 mg én gang daglig, vil voksne med moderat nedsatt leverfunksjon få omtrent de samme steady-state $C_{\min}$ -verdier som de som oppnås med en dose på 150 mg hver 12. time hos voksne uten nedsatt leverfunksjon.

Hos forsøkspersoner med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B, skår 7 til 9) økte ivakaftor AUC omtrent 50 % etter gjentatte doser i 10 dager med enten tezakaftor og ivakaftor eller ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor.

Effekten av alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C, score 10 til 15) på farmakokinetikken til ivakaftor er ikke undersøkt. Størrelsen på økningen i eksponering hos disse pasientene er ukjent, men forventes å være høyere enn observert hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon.

For veiledning om egnet bruk og doseendring se tabell 3 i pkt. 4.2.

Nedsatt nyrefunksjon

Farmakokinetikkstudier er ikke utført med ivakaftor hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. I en farmakokinetikkstudie med ivakaftor monoterapi hos mennesker var det minimal eliminering av ivakaftor og metabolitter i urin (kun 6,6 % av total radioaktivitet ble gjenfunnet i urin). Det var

ubetydelig urinutskillelse av ivakaftor som uendret modersubstans (mindre enn 0,01 % etter en oral enkeltdose på 500 mg).

Dosejustering er ikke anbefalt ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales ved bruk av ivakaftor hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance på 30 ml/minutt eller lavere) eller terminal nyresykdom (se pkt. 4.2 og 4.4).

Etnisitet

Etnisitet hadde ingen klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til ivakaftor hos hvite (n = 379) og ikke-hvite (n = 29) pasienter basert på en populasjonsfarmakokinetisk analyse.

Kjønn

De farmakokinetiske parametrene til ivakaftor er like hos menn og kvinner.

Eldre

Kliniske studier av ivakaftor inkluderte ikke tilstrekkelig mange pasienter som var 65 år eller eldre til å fastslå om de farmakokinetiske parametrene er tilsvarende de hos yngre voksne eller ikke.

De farmakokinetiske parametrene til ivakaftor i kombinasjon med tezakaftor hos eldre pasienter (65-72 år) er sammenlignbare med de hos yngre voksne.

Pediatrisk populasjon

Forventet ivakaftoreksponering basert på observert ivakaftorkonsentrasjon i fase II- og III-studier og fastslått ved hjelp av kompartmentanalyse er presentert etter aldersgruppe i tabell 9.

Tabell 9: Gjennomsnittlig (SD) ivakaftoreksponering etter aldersgruppe

Aldersgruppe	Dose	C _{min, ss} (mikrog/ml)	AUC _{0-12h, ss} (mikrog·time/ml)
1 måned til under 2 måneder (≥ 3 kg)*	13,4 mg hver 24. time	0,300 (0,221) [†]	5,84 (2,98) [†]
2 måneder til under 4 måneder (≥ 3 kg)*	13,4 mg hver 12. time	0,406 (0,266) [†]	6,45 (3,43) [†]
4 måneder til under 6 måneder (≥ 5 kg)*	25 mg hver 12. time	0,371 (0,183)	6,48 (2,52)
6 måneder til under 12 måneder (≥ 5 kg til < 7 kg) [‡]	25 mg hver 12. time	0,336	5,41
6 måneder til under 12 måneder (7 kg til < 14 kg)	50 mg hver 12. time	0,508 (0,252)	9,14 (4,20)
12 måneder til under 24 måneder (7 kg til < 14 kg)	50 mg hver 12. time	0,440 (0,212)	9,05 (3,05)
12 måneder til under 24 måneder (≥ 14 kg til < 25 kg)	75 mg hver 12. time	0,451 (0,125)	9,60 (1,80)
2 til 5 år (< 14 kg)	50 mg hver 12. time	0,577 (0,317)	10,50 (4,26)
2 til 5 år (≥ 14 kg til < 25 kg)	75 mg hver 12. time	0,629 (0,296)	11,30 (3,82)
6 til 11 år [§] (≥ 14 kg til < 25 kg)	75 mg hver 12. time	0,641 (0,329)	10,76 (4,47)
6 til 11 år [§] (≥ 25 kg)	150 mg hver 12. time	0,958 (0,546)	15,30 (7,34)
12 til 17 år	150 mg hver 12. time	0,564 (0,242)	9,24 (3,42)

Aldersgruppe	Dose	C _{min, ss} (mikrog/ml)	AUC _{0-12h, ss} (mikrog·time/ml)
Voksne (≥ 18 år)	150 mg hver 12. time	0,701 (0,317)	10,70 (4,10)

* Pasienter i alderen 1 måned til under 6 måneder var født ≥ 37. svangerskapsuke.

† Eksposering ved 1 måneds til 4 måneders alder er anslått ved simulering fra den fysiologisk baserte farmakokinetiske modellen ved hjelp av data fra den aktuelle aldersgruppen.

‡ Verdier basert på data fra én pasient; standardavvik ikke rapportert.

§ Eksposering hos 6–11 åringer er anslått ved simulering fra den populasjonsfarmakokinetiske modellen ved hjelp av data innhentet for denne aldersgruppen.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet og karsinogenitet.

Drektighet og fertilitet

Ivakaftor var forbundet med en liten reduksjon i sædblærevekt, en reduksjon i den totale fertilitetsindeksen og antall drektigheter hos hunner paret med behandlede hanner og signifikante reduksjoner i antall gule legemer og implantasjonssteder med påfølgende reduksjoner i gjennomsnittlig kullstørrelse og gjennomsnittlig antall levedyktige embryo pr. kull hos behandlede hunner. Høyeste nivå uten observerte bivirkninger (NOAEL, *No-Observed-Adverse-Effect-Level*) for fertilitetsfunn gir et eksponeringsnivå på ca. 4 ganger den systemiske eksponeringen av ivakaftor og dets metabolitter når det administreres som ivakaftor monoterapi hos voksne mennesker ved den maksimalt anbefalte dosen til mennesker (MRHD). Placentapassasje av ivakaftor ble observert hos drektige rotter og kaniner.

Peri- og postnatal utvikling

Ivakaftor ga redusert overlevelses- og laktasjonsindeks samt redusert kroppsvekt hos avkom. NOAEL for levedyktighet og vekst hos avkom gir et eksponeringsnivå på ca. 3 ganger den systemiske eksponeringen av ivakaftor og dets metabolitter når det administreres som ivakaftor monoterapi hos voksne mennesker ved MRHD.

Studier av juvenile dyr

Funn av katarakter ble observert hos juvenile rotter dosert fra postnatal dag 7 til 35 ved ivakaftor-eksponeringsnivåer 0,22 ganger MRHD basert på systemisk eksponering for ivakaftor og dets metabolitter når det administreres som ivakaftor monoterapi. Dette funnet er ikke observert i fostre fra rotter behandlet med ivakaftor på drektighetsdag 7 til 17, hos rottevalper eksponert for ivakaftor via melkeinntak frem til postnatal dag 20, hos 7 uker gamle rotter eller hos 3,5 til 5 måneder gamle hunder behandlet med ivakaftor. Mulig relevans av disse funnene for mennesker er ukjent.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

Tablettkjerne

Cellulose, mikrokrySTALLinsk
Laktosemonohydrat
Hypermelloseacetatsuksinat
Krysskarmellosenatrium
Natriumlaurylsulfat (E 487)
Silika, kolloidal vannfri

Magnesiumstearat

Tablettfilmdrasjering

Polyvinylalkohol

Titandioksid (E 171)

Makrogol (PEG 3350)

Talkum

Indigokarmin aluminiumslakk (E 132)

Karnaubavoks

Trykkfarge

Skjellakk

Svart jernoksid (E 172)

Propylenglykol (E 1520)

Ammoniakkoppløsning, konsentrert

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

4 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Termoform (polyklortrifluoretylen [PCTFE]/folie) blisterpakning eller en flaske av polyetylen av høy tetthet (HDPE), med et barnesikret polypropylenlokk med foliebelagt induksjonsforsegling og molekylsiktørremiddel.

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige:

- Blisterkortpakning inneholdende 28 tabletter, filmdrasjerte

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige:

- Blisterkortpakning inneholdende 28 tabletter, filmdrasjerte
- Blisterpakning inneholdende 56 tabletter, filmdrasjerte
- Flaske inneholdende 56 tabletter, filmdrasjerte

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/001
EU/1/12/782/002
EU/1/12/782/005
EU/1/12/782/007

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 23. juli 2012
Dato for siste fornyelse: 29. april 2022

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) <https://www.ema.europa.eu>.

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose
Kalydeco 25 mg granulat i dosepose
Kalydeco 50 mg granulat i dosepose
Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose
Kalydeco 75 mg granulat i dosepose

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose

Hver dosepose inneholder 13,4 mg ivakaftor (ivacaftorum).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver dosepose inneholder 19,7 mg laktosemonohydrat.

Kalydeco 25 mg granulat i dosepose

Hver dosepose inneholder 25 mg ivakaftor (ivacaftorum).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver dosepose inneholder 36,6 mg laktosemonohydrat.

Kalydeco 50 mg granulat i dosepose

Hver dosepose inneholder 50 mg ivakaftor (ivacaftorum).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver dosepose inneholder 73,2 mg laktosemonohydrat.

Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose

Hver dosepose inneholder 59,5 mg ivakaftor (ivacaftorum).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver dosepose inneholder 87,3 mg laktosemonohydrat

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose

Hver dosepose inneholder 75 mg ivakaftor (ivacaftorum).

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver dosepose inneholder 109,8 mg laktosemonohydrat.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Granulat i dosepose (granulat)

Hvitt til offwhite granulat med diameter på ca. 2 mm.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjon

Kalydeco granulat er indisert:

- som monoterapi til behandling av spedbarn fra minst 1 måneds alder, småbarn og barn, som veier fra 3 kg til mindre enn 25 kg med cystisk fibrose (CF), som har en *R117H*-mutasjon eller en av følgende regulerings (klasse III)-mutasjoner i *CFTR*-genet: *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* eller *S549R* (se pkt. 4.4 og 5.1).
- i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor til behandling av pediatriske pasienter i alderen 2 til under 6 år med cystisk fibrose (CF) som har minst én F508del-mutasjon i *CFTR*-genet (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Kalydeco skal kun forskrives av leger med erfaring innen behandling av cystisk fibrose. Dersom pasientens genotype er ukjent, bør det før behandlingsstart foretas en nøyaktig og validert genotypingsmetode for å bekrefte en indisert mutasjon i minst ett allel av *CFTR*-genet (se pkt. 4.1). Fasen av poly-T-varianten identifisert med *R117H*-mutasjonen bør fastsettes i samsvar med lokale kliniske anbefalinger.

Dosering

Doseringsanbefalinger er vist i tabell 1.

Tabell 1: Doseringsanbefalinger

Alder	Vekt	Morgendose	Kveldsdose
Ivakaftor som monoterapi			
1 måned til under 2 måneder	≥ 3 kg	En dosepose med ivakaftor 13,4 mg granulat	Ingen kveldsdose
2 måneder til under 4 måneder	≥ 3 kg	En dosepose med ivakaftor 13,4 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 13,4 mg granulat
4 måneder til under 6 måneder	≥ 5 kg	En dosepose med ivakaftor 25 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 25 mg granulat
fra 6 måneders alder	≥ 5 kg til < 7 kg	En dosepose med ivakaftor 25 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 25 mg granulat
	≥ 7 kg til < 14 kg	En dosepose med ivakaftor 50 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 50 mg granulat
	≥ 14 kg til < 25 kg	En dosepose med ivakaftor 75 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 75 mg granulat
	≥ 25 kg	Se preparatomtale for Kalydeco tabletter for mer informasjon.	
Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor			
2 år til under 6 år	10 kg til < 14 kg	En dosepose med ivakaftor 60 mg/tezakaftor 40 mg/eleksakaftor 80 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 59,5 mg granulat
	≥ 14 kg	En dosepose med ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg granulat	En dosepose med ivakaftor 75 mg granulat

Morgen- og kveldsdosen skal tas med omtrent 12 timers mellomrom sammen med fettholdig mat (se administrasjonsmåte).

Glemt dose

Dersom det har gått 6 timer eller mindre siden glemt morgen- eller kveldsdose, skal pasienten rådes til å ta den så snart som mulig, og deretter ta neste dose til fastsatt tid. Dersom det er gått mer enn 6 timer fra tidspunktet dosen vanligvis tas, skal pasienten rådes til å vente til neste fastsatte dose.

Pasienter som får Kalydeco i et kombinasjonsregime, skal rådes til å ikke ta mer enn én dose av hvert legemiddel samtidig.

Samtidig bruk av CYP3A-hemmere

Ved samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A-hemmere, bør dosen av ivakaftor justeres som spesifisert i tabell 2 (se pkt. 4.4 og 4.5).

Tabell 2: Doseringsanbefalinger for samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A-hemmere

Alder/vekt	Moderate CYP3A-hemmere	Sterke CYP3A-hemmere
Ivakaftor som monoterapi		
1 måned til under 6 måneder	Bruk anbefales ikke	Bruk anbefales ikke
fra 6 måneders alder, ≥ 5 kg til < 7 kg	Én dosepose med ivakaftor 25 mg granulat én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Én dosepose med ivakaftor 25 mg granulat to ganger i uken. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
fra 6 måneders alder, ≥ 7 kg til < 14 kg	Én dosepose med ivakaftor 50 mg granulat én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Én dosepose med ivakaftor 50 mg granulat to ganger i uken. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
fra 6 måneders alder, ≥ 14 kg til < 25 kg	Én dosepose med ivakaftor 75 mg granulat én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Én dosepose med ivakaftor 75 mg granulat to ganger i uken. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
2 år til under 6 år, < 14 kg	Annenhver dag: - én dosepose med ivakaftor 60 mg/tezakaftor 40 mg/eleksakaftor 80 mg granulat om morgenen den første dagen - én dosepose med ivakaftor 59,5 mg granulat om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Én dosepose med ivakaftor 60 mg/tezakaftor 40 mg/ eleksakaftor 80 mg granulat to ganger i uken, med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
2 år til under 6 år, ≥ 14 kg	Annenhver dag: - én dosepose med ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg granulat om morgenen den første dagen - én dosepose med ivakaftor 75 mg granulat om morgenen påfølgende dag Ingen kveldsdose av ivakaftor .	Én dosepose med ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg granulat to ganger i uken, med omtrent 3 til 4 dagers mellomrom. Ingen kveldsdose av ivakaftor.

Spesielle populasjoner

Nedsatt nyrefunksjon

Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance på 30 ml/minutt eller lavere) eller terminal nyresykdom (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter fra 6 måneders alder med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A). Behandling anbefales ikke hos pasienter i alderen 1 måned til under 6 måneder som har enhver grad av nedsatt leverfunksjon.

Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C); bør dosen med ivakaftor justeres som spesifisert i tabell 3 (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Tabell 3: Doseringsanbefalinger for pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon

Alder/vekt	Moderat (Child-Pugh klasse B)	Alvorlig (Child-Pugh klasse C)
Ivakaftor som monoterapi		
1 måned til under 6 måneder	Bruk anbefales ikke	Bruk anbefales ikke
fra 6 måneders alder, ≥ 5 kg til < 7 kg	En dosepose med ivakaftor 25 mg granulat én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke , med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én dosepose ivakaftor 25 mg granulat annenhver dag i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
fra 6 måneders alder, ≥ 7 kg til < 14 kg	En dosepose med ivakaftor 50 mg granulat én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke , med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én dosepose ivakaftor 50 mg granulat annenhver dag i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.
fra 6 måneders alder, ≥ 14 kg til < 25 kg	En dosepose med ivakaftor 75 mg granulat én gang daglig. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Bruk anbefales ikke , med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes: én dosepose ivakaftor 75 mg granulat annenhver dag i henhold til klinisk respons og tolerabilitet. Ingen kveldsdose av ivakaftor.

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
2 år til under 6 år, 10 kg til < 14 kg	Bruk anbefales ikke, med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes, bør dosen justeres på følgende måte: • dag 1–3: én dosepose med ivakaftor 60 mg/tezakaftor 40 mg/eleksakaftor 80 mg granulat hver dag • dag 4: ingen dose • dag 5–6: én dosepose med ivakaftor 60 mg/tezakaftor 40 mg/eleksakaftor 80 mg granulat hver dag • dag 7: ingen dose Gjenta doseringsregimet ovenfor hver uke. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Skal ikke brukes.
2 år til under 6 år, ≥ 14 kg	Bruk anbefales ikke, med mindre fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes, bør dosen justeres på følgende måte: • dag 1–3: én dosepose med ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/ eleksakaftor 100 mg granulat hver dag • dag 4: ingen dose • dag 5–6: én dosepose med ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/ eleksakaftor 100 mg granulat hver dag • dag 7: ingen dose Gjenta doseringsregimet ovenfor hver uke. Ingen kveldsdose av ivakaftor.	Skal ikke brukes.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av ivakaftor som monoterapi har ikke blitt fastslått hos barn under 1 måned eller hos barn under 6 måneder som er født prematurt (før 37. svangerskapsuke), heller ikke i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor hos barn under 2 år. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Det foreligger begrensede data hos pasienter under 6 år med en *R117H*-mutasjon i *CFTR*-genet. Tilgjengelige data hos pasienter fra 6 års alder er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2.

Administrasjonsmåte

Til oral bruk.

Hver dosepose er kun til engangsbruk.

Hver dosepose med granulat skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske, og inntas i sin helhet og umiddelbart. Maten eller væsken bør holde romtemperatur eller lavere. Dersom blandingen ikke inntas umiddelbart, er den vist å være stabil i én time og bør derfor inntas i løpet av denne perioden. Et fettholdig måltid eller mellommåltid bør inntas like før eller like etter dosering.

Mat eller drikke som inneholder grapefrukt bør unngås under behandling (se pkt. 4.5).

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Kun pasienter med CF som hadde en *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* eller *S549R*-regulerings (klasse III)- eller *G970R*-mutasjon i minst ett allel av *CFTR*-genet ble inkludert i studiene 770-102, 770-103, 770-111 og 770-108 (se pkt. 5.1).

Det er vist mindre evidens for en positiv effekt av ivakaftor hos pasienter med en *R117H-7T*-mutasjon forbundet med mindre alvorlig sykdom i studie 770-110 (se pkt. 5.1).

I studie 770-111 ble fire pasienter med *G970R*-mutasjon inkludert. Hos tre av fire pasienter var endring i kloridtest i svette < 5 mmol/l, og denne gruppen viste ikke en klinisk relevant bedring i FEV₁ etter 8 ukers behandling. Klinisk effekt hos pasienter med *G970R*-mutasjon i *CFTR*-genet kunne ikke fastslås (se pkt. 5.1).

Effektresultater fra en fase II-studie hos pasienter med CF som var homozygote for *F508del*-mutasjonen i *CFTR*-genet, viste ingen statistisk signifikant forskjell i FEV₁ etter 16 ukers ivakaftorbehandling sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1). Bruk av ivakaftor monoterapi hos disse pasientene er derfor ikke anbefalt.

Økte transaminaser og leverskade

Hos en pasient med cirrhose og portal hypertensjon, har leversvikt som medførte transplantasjon blitt rapportert ved behandling med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Dette legemidlet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med underliggende avansert leversykdom (f.eks. cirrhose, portal hypertensjon) og kun dersom fordelene forventes å oppveie risikoene. Dersom det brukes hos disse pasientene, skal de overvåkes nøye etter behandlingsstart (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2).

Moderate økninger i transaminaser (alanintransaminase [ALAT] eller aspartattransaminase [ASAT]) er vanlige hos personer med CF. Transaminaseøkninger er observert hos enkelte pasienter behandlet med ivakaftor som monoterapi og i kombinasjonsregimer med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Hos pasienter som tar ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor har disse økningene noen ganger vært forbundet med samtidige økninger i total bilirubin. Målinger av transaminaser (ALAT og ASAT) og total bilirubin er derfor anbefalt hos alle pasienter før oppstart med ivakaftor, hver 3. måned første behandlingsår og deretter årlig. Hos alle pasienter med en anamnese med leversykdom eller transaminaseøkninger, bør hyppigere overvåking av leverfunksjonsprøver overveies. Ved signifikante transaminaseøkninger (f.eks. pasienter med ALAT eller ASAT > 5 x øvre normalgrense (ULN), eller ALAT eller ASAT > 3 x ULN med bilirubin > 2 x ULN), bør doseringen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører. Etter opphør av transaminaseøkninger bør nytte og risiko ved å gjenoppta behandlingen overveies (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Bruk av ivakaftor som monoterapi er ikke anbefalt hos pasienter i alderen 1 måned til under 6 måneder som har enhver grad av nedsatt leverfunksjon. Bruk av ivakaftor som monoterapi hos pasienter fra 6 måneders alder som veier mindre enn 25 kg og har alvorlig nedsatt leverfunksjon, anbefales ikke med mindre nytten forventes å oppveie risikoen. Pasienter med alvorlig leversvikt skal ikke behandles med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor (se tabell 3 i pkt. 4.2, samt pkt. 4.8 og 5.2).

For pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon anbefales ikke bruk av ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Behandling skal kun vurderes når det foreligger et tydelig medisinsk behov og fordelene forventes å oppveie risikoene. Hvis det brukes, må det skje med forsiktighet med en redusert dose (se tabell 3 i pkt. 4.2, samt pkt. 4.8 og 5.2).

Depresjon

Depresjon (inkludert selvmordstanker og selvmordsforsøk) har blitt rapportert hos pasienter som får ivakaftor, hovedsakelig i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, vanligvis innen tre måneder etter behandlingsstart og hos pasienter med en anamnese med psykiatiske lidelser. I noen tilfeller ble symptombedring rapportert etter dosereduksjon eller seponering av behandlingen. Pasienter (og omsorgspersoner) skal informeres om behovet for å overvåke for nedstemthet, selvmordstanker og uvanlige endringer i atferd, og kontakte helsepersonell umiddelbart dersom slike symptomer oppstår.

Nedsatt nyrefunksjon

Forsiktighet anbefales ved bruk av ivakaftor hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom (se pkt. 4.2 og 5.2).

Pasienter etter organtransplantasjon

Ivakaftor er ikke undersøkt hos pasienter med CF som har fått organtransplantasjon. Bruk hos transplanterte pasienter er derfor ikke anbefalt. Se pkt. 4.5 for interaksjoner med ciklosporin eller takrolimus.

Utslett

Insidens av utslett ved bruk av ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor var høyere hos kvinner enn hos menn, spesielt hos kvinner som tok hormonelle prevensjonsmidler. Det kan ikke utelukkes at hormonelle prevensjonsmidler spiller en rolle for forekomst av utslett. For pasienter som tar hormonelle prevensjonsmidler som utvikler utslett, bør det vurderes å avbryte behandling med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og hormonelle prevensjonsmidler. Etter at utslettet opphører, bør det vurderes om gjenopptakelse av ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor uten hormonelle prevensjonsmidler er egnet. Dersom utslettet ikke kommer tilbake, kan gjenopptakelse av hormonelle prevensjonsmidler vurderes (se pkt. 4.8).

Interaksjoner med legemidler

CYP3A-induktorer

Eksposering for ivakaftor kan reduseres betydelig ved samtidig bruk av CYP3A-induktorer, noe som kan føre til nedsatt effekt av ivakaftor. Derfor er samtidig bruk av ivakaftor og sterke CYP3A-induktorer ikke anbefalt (se pkt. 4.5).

CYP3A-hemmere

Eksposering for ivakaftor øker ved samtidig administrering med sterke eller moderate CYP3A-hemmere. Dosen med ivakaftor må justeres ved samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere (se tabell 2 i pkt. 4.2 og pkt. 4.5). Behandling med ivakaftor monoterapi anbefales ikke hos pasienter i alderen 1 måned til under 6 måneder som får sterke eller moderate CYP3A-hemmere.

Pediatrik populasjon

Tilfeller av ikke-medfødt uklar linse/katarakter uten synspåvirkning er rapportert hos pediatriske pasienter behandlet med ivakaftor og regimer som inneholder ivakaftor. Selv om det forelå andre

risikofaktorer i noen av tilfellene (som bruk av kortikosteroider og eksponering for stråling), kan en mulig risiko knyttet til behandling med ivakaftor ikke utelukkes. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos pediatriske pasienter som begynner med ivakaftorbehandling (se pkt. 5.3).

Hjelpestoffer med kjent effekt

Laktose

Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dosepose, og er så godt som "natriumfritt".

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ivakaftor er et CYP3A4- og CYP3A5-substrat. Det er en svak CYP3A- og P-glykoprotein (P-gp)-hemmer og en mulig CYP2C9-hemmer. *In vitro*-studier har vist at ivakaftor ikke er et substrat for P-gp.

Legemidler som påvirker farmakokinetikken til ivakaftor

CYP3A-induktorer

Samtidig bruk av ivakaftor og rifampicin, en sterk CYP3A-induktor, reduserte ivakaftoreksponeringen (AUC) med 89 % og reduserte hydroksymetylivakaftor (M1) i mindre grad enn ivakaftor. Samtidig bruk av ivakaftor og sterke CYP3A-induktorer, som rifampicin, rifabutin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt (*Hypericum perforatum*), er ikke anbefalt (se pkt. 4.4).

Det anbefales ikke dosejustering når ivakaftor brukes sammen med moderate eller svake CYP3A-induktorer.

CYP3A-hemmere

Ivakaftor er et sensitivt CYP3A-substrat. Samtidig bruk av ketokonazol, en sterk CYP3A-hemmer, økte ivakaftoreksponeringen (målt som areal under kurven [AUC]) 8,5 ganger og økte M1 i mindre grad enn ivakaftor. Samtidig bruk av flukonazol, en moderat CYP3A-hemmer, økte ivakaftoreksponeringen 3 ganger og økte M1 i mindre grad enn ivakaftor. Det anbefales en reduksjon av ivakaftor-dosen ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere, som ketokonazol, itraconazol, posakonazol, vorikonazol, telitromycin og klaritromycin, og ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere, som flukonazol, erytromycin og verapamil. Behandling med ivakaftor monoterapi anbefales ikke ved samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere hos pasienter i alderen 1 måned til under 6 måneder (se tabell 2 i pkt. 4.2 og pkt. 4.4).

Samtidig bruk av ivakaftor og grapefruktjuice, som har ett eller flere innholdsstoffer som hemmer CYP3A moderat, kan øke ivakaftoreksponeringen. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt bør unngås ved behandling med ivakaftor (se pkt. 4.2).

Potensial for at ivakaftor interagerer med transportører

In vitro-studier har vist at ivakaftor ikke er et substrat for OATP1B1 eller OATP1B3. Ivakaftor og dets metabolitter er substrater for BCRP *in vitro*. På grunn av dets høye egenpermeabilitet og lave sannsynlighet for å bli utskilt intakt, forventes ikke samtidig bruk av BCRP-hemmere å påvirke

eksponering for ivakaftor og M1-IVA, mens potensielle endringer i M6-IVA-eksponering ikke forventes å være klinisk relevante.

Ciprofloksacin

Samtidig bruk av ciprofloksacin og ivakaftor påvirket ikke ivakaftoreksponeringen. Dosejustering er ikke nødvendig når ivakaftor gis sammen med ciprofloksacin.

Legemidler som påvirkes av ivakaftor

Bruk av ivakaftor kan øke systemisk eksponering for legemidler som er sensitive CYP2C9- og/eller P-gp- og/eller CYP3A-substrater, noe som kan øke eller forlenge deres terapeutiske effekter og bivirkninger.

CYP2C9-substrater

Ivakaftor kan hemme CYP2C9. Overvåking av internasjonal normalisert ratio (INR) er derfor anbefalt ved samtidig bruk av warfarin og ivakaftor. Andre legemidler hvor eksponeringen kan øke er glimepirid og glipizid. Disse legemidlene bør brukes med forsiktighet.

Digoksin og andre P-gp-substrater

Samtidig bruk av digoksin, et sensitivt P-gp-substrat, økte digoksineksponeringen 1,3 ganger, sammenfallende med ivakaftors svake hemming av P-gp. Bruk av ivakaftor kan øke systemisk eksponering for legemidler som er sensitive P-gp-substrater, noe som kan øke eller forlenge deres terapeutiske effekter og bivirkninger. Ved samtidig bruk av digoksin eller andre P-gp-substrater med smal terapeutisk indeks, slik som ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus, skal det utvises forsiktighet og overvåking.

CYP3A-substrater

Samtidig bruk av (oral) midazolam, et sensitivt CYP3A-substrat, økte midazolameksponeringen 1,5 ganger, sammenfallende med ivakaftors svake hemming av CYP3A. Ingen dosejustering av CYP3A-substrater, som midazolam, alprazolam, diazepam eller triazolam, er nødvendig når disse brukes samtidig med ivakaftor.

Hormonelle prevensjonsmidler

Ivakaftor undersøkt sammen med et oralt prevensjonsmiddel med østrogen/progesteron, ble funnet å ikke ha noen signifikant effekt på eksponeringen for det orale prevensjonsmidlet. Dosejustering av orale prevensjonsmidler er derfor ikke nødvendig.

Pediatrik populasjon

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det er ingen eller begrenset mengde data (utfallet av mindre enn 300 graviditeter) på bruk av ivakaftor hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn til reproduksjonstoksisitet (se pkt. 5.3). Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av ivakaftor under graviditet.

Amming

Begrensede data viser at ivakaftor blir skilt ut i morsmelk hos mennesker. En risiko for nyfødte/spedbarne som ammes kan derfor ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller behandlingen med ivakaftor skal avsluttes/avstås fra.

Fertilitet

Det er ingen tilgjengelige data på effekten av ivakaftor på fertilitet hos mennesker. Ivakaftor påvirket fertilitet hos rotter (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Ivakaftor har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ivakaftor kan medføre svimmelhet (se pkt. 4.8), og pasienter som blir svimle bør derfor frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner til symptomene avtar.

4.8 Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofil

De vanligste bivirkningene hos pasienter fra 6 års alder er hodepine (23,9 %), smerter i munn og svelg (22,0 %), øvre luftveisinfeksjon (22,0 %), nesetetthet (20,2 %), abdominalsmerter (15,6 %), nasofaryngitt (14,7 %), diaré (12,8 %), svimmelhet (9,2 %), utslett (12,8 %) og bakterier i sputum (12,8 %). Transaminaseøkninger forekom hos 12,8 % av pasienter behandlet med ivakaftor mot 11,5 % hos pasienter behandlet med placebo.

Hos pasienter i alderen 2 til under 6 år var de vanligste bivirkningene nesetetthet (26,5 %), øvre luftveisinfeksjon (23,5 %), transaminaseøkninger (14,7 %), utslett (11,8 %) og bakterier i sputum (11,8 %).

Alvorlige bivirkninger hos pasienter som mottok ivakaftor omfattet abdominalsmerter (0,9 %) og transaminaseøkninger (1,8 %), mens utslett som alvorlig bivirkning ble rapportert hos 1,5 % av pasienter i alderen 12 år og eldre med et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor (se pkt. 4.4).

Bivirkningstabell

Tabell 4 gjenspeiler bivirkninger observert med ivakaftor i kliniske studier (placebokontrollerte og ukontrollerte studier) hvor eksponering for ivakaftor varte fra 16 uker til 144 uker. Frekvensen av bivirkninger defineres på følgende måte: svært vanlige ($\geq 1/10$), vanlige ($\geq 1/100$ til $< 1/10$), mindre vanlige ($\geq 1/1000$ til $< 1/100$), sjeldne ($\geq 1/10\ 000$ til $< 1/1000$), svært sjeldne ($< 1/10\ 000$), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabell 4: Bivirkninger

Organklassesystem	Bivirkning	Frekvens
Infeksiøse og parasittære sykdommer	Øvre luftveisinfeksjon	svært vanlige
	Nasofaryngitt	svært vanlige
	Influenza*	vanlige
	Rhinitt	vanlige
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer	Hypoglykemi*	vanlige
Psykiatriske lidelser	Depresjon	ikke kjent
Nevrologiske sykdommer	Hodepine	svært vanlige
	Svimmelhet	svært vanlige
Sykdommer i øre og labyrint	Øresmerter	vanlige
	Ubehag i øret	vanlige
	Tinnitus	vanlige
	Trommehinnehyperemi	vanlige
	Vestibulær lidelse	vanlige
	Tette ører	mindre vanlige
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum	Smerter i munn og svelg	svært vanlige
	Nesetetthet	svært vanlige
	Unormal pusting*	vanlige
	Rhinoré*	vanlige
	Tette bihuler	vanlige
	Erytem i svelget	vanlige
	Hvesing*	mindre vanlige
Gastrointestinale sykdommer	Abdominal smerter	svært vanlige
	Diaré	svært vanlige
	Smerter i øvre abdomen*	vanlige
	Flatulens*	vanlige
Sykdommer i lever og galleveier	Transaminaseøkninger	svært vanlige
	Økt alaninaminotransferase*	svært vanlige
	Økt aspartataminotransferase*	vanlige
	Leverskade†	ikke kjent
	Økt total bilirubin†	ikke kjent
Hud- og underhudssykdommer	Utslett	svært vanlige
	Akne*	vanlige
	Pruritus*	vanlige
Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer	Kuler i brystet	vanlige
	Brystinflammasjon	mindre vanlige
	Gynekomasti	mindre vanlige
	Brystvortelidelse	mindre vanlige
	Brystvortesmerter	mindre vanlige
Undersøkelser	Bakterier i sputum	svært vanlige
	Økt kreatinkinase i blod*	vanlige
	Økt blodtrykk*	mindre vanlige

* Bivirkninger og frekvens rapportert i kliniske studier med ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

† Leverskade (økning i ALAT,ASAT og total bilirubin) rapportert etter markedsføring med ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Dette omfattet også leversvikt som medførte transplantasjon hos en pasient med underliggende cirrhose og portal hypertensjon. Frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Transaminaseøkninger

I de 48-ukers placebokontrollerte studiene 770-102 og 770-103 hos pasienter fra 6 års alder var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 eller > 3 x ULN henholdsvis 3,7 %, 3,7 % og 8,3 % hos pasienter behandlet med ivakaftor og 1,0 %, 1,9 % og 8,7 % hos pasienter behandlet med placebo. To pasienter, den ene på placebo og den andre på ivakaftor, seponerte behandlingen permanent på grunn av økte transaminaser, i begge tilfeller > 8 x ULN. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor fikk en transaminaseøkning > 3 x ULN forbundet med økt totalbilirubin $> 1,5$ x ULN. Hos pasienter behandlet med ivakaftor opphørte de fleste transaminaseøkninger opp til 5 x ULN uten behandlingsavbrudd. Ivakaftordoseringen ble avbrutt hos de fleste pasienter med transaminaseøkning > 5 x ULN. I alle tilfeller hvor dosering ble avbrutt på grunn av økte transaminaser og deretter gjenopptatt, kunne ivakaftordosering gjenopptas med godt resultat (se pkt. 4.4).

I løpet av de placebokontrollerte fase 3-studiene (inntil 24 uker) med tezakaftor/ivakaftor var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 eller > 3 x ULN 0,2 %, 1,0 % og 3,4 % hos pasienter behandlet med tezakaftor/ivakaftor og 0,4 %, 1,0 % og 3,4 % hos pasienter behandlet med placebo. Én pasient (0,2 %) på behandling og 2 pasienter (0,4 %) på placebo seponerte behandlingen permanent på grunn av økte transaminaser. Ingen pasienter behandlet med tezakaftor/ivakaftor opplevde en transaminaseøkning > 3 x ULN forbundet med økt total bilirubin > 2 x ULN.

I løpet av den 24-ukers, placebokontrollerte fase 3-studien med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 eller > 3 x ULN 1,5 %, 2,5 % og 7,9 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, og 1,0 %, 1,5 % og 5,5 % hos pasienter som fikk placebo. Insidensen av bivirkninger med transaminaseøkninger var 10,9 % hos pasienter behandlet med ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, og 4,0 % hos pasienter som fikk placebo.

Tilfeller av seponering av behandling grunnet forhøyede transaminaser med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor har blitt rapportert etter markedsføring (se pkt. 4.4).

Utslett

I studie 445-102 var insidensen av utslett (f.eks. utslett, kløende utslett) 10,9 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og 6,5 % hos pasienter som fikk placebo. Utslettene var vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad. Insidensen av utslett etter pasientens kjønn var 5,8 % hos menn og 16,3 % hos kvinner blant pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og 4,8 % hos menn og 8,3 % hos kvinner blant pasienter som fikk placebo. Hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor var insidensen av utslett 20,5 % hos kvinner som tok hormonelle prevensjonsmidler og 13,6 % hos kvinner som ikke tok hormonelle prevensjonsmidler (se pkt. 4.4).

Økt kreatinkinase

I studie 445-102 var insidensen av maksimal kreatinkinase > 5 x ULN 10,4 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor og 5,0 % hos pasienter som fikk placebo. De observerte kreatinkinaseøkningene var vanligvis forbigående og asymptomatiske, og mange oppsto etter fysisk aktivitet. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor seponerte behandlingen grunnet økt kreatinkinase.

Høyt blodtrykk

I studie 445-102 var maksimal økning fra baseline i gjennomsnittlig systolisk og diastolisk blodtrykk henholdsvis 3,5 mmHg og 1,9 mmHg hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

(baseline: 113 mmHg systolisk og 69 mmHg diastolisk) og henholdsvis 0,9 mmHg og 0,5 mmHg hos pasienter som fikk placebo (baseline: 114 mmHg systolisk og 70 mmHg diastolisk).

Andelen av pasienter som hadde systolisk blodtrykk > 140 mmHg eller diastolisk blodtrykk > 90 mmHg ved minst to anledninger, var henholdsvis 5,0 % og 3,0 % hos pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor sammenlignet med henholdsvis 3,5 % og 3,5 % hos pasienter som fikk placebo.

Pediatrisk populasjon

Ivakaftor som monoterapi

Sikkerheten til ivakaftor som monoterapi i 24 uker ble evaluert hos 43 pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneder (7 av dem under 4 måneder), 34 pasienter i alderen 2 til under 6 år, 61 pasienter i alderen 6 til under 12 år og 94 pasienter i alderen 12 til under 18 år.

Sikkerhetsprofilen er generelt lik hos pediatriske pasienter fra 1 måneds alder og er også i samsvar med voksne pasienter.

Insidensen av økte transaminaser (ALAT eller ASAT) observert i studie 770-103, 770-111 og 770-110 (pasienter 6 år til under 12 år), studie 770-108 (pasienter 2 år til under 6 år) og studie 770-124 (pasienter 1 måned til under 24 måneder) er beskrevet i tabell 5. I de placebokontrollerte studiene var insidensen av transaminaseøkninger tilsvarende for behandling med ivakaftor (15,0 %) og placebo (14,6 %). Maksimale LFT-økninger var generelt høyere hos pediatriske pasienter enn hos eldre pasienter. Hos alle populasjoner gikk maksimale LFT-økninger tilbake til baselinenivåer etter avbrutt dosering. I nesten alle tilfeller hvor dosering ble avbrutt på grunn av økte transaminaser og deretter gjenopptatt, kunne ivakaftordosering gjenopptas med godt resultat (se pkt. 4.4). Tilfeller som indikerte "positiv rechallenge" (gjentatt reaksjon ved gjentatt behandling) ble observert.

I studie 770-108 ble ivakaftor varig seponert hos én pasient. I studie 770-124, i kohorten med pasienter i alderen 1 måned til under 4 måneder, hadde en 1 måned gammel (14,3 %) pasient transaminaseverdier på ALAT > 8 ULN og ASAT > 3 til ≤ 5 x ULN, som medførte seponering av behandling med ivakaftor (se pkt. 4.4 for håndtering av økte transaminaser).

Tabell 5: Økte transaminaser hos pasienter i alderen 1 måned til < 12 år som behandles med ivakaftor som monoterapi

	n	%-andel pasienter >3 x ULN	%-andel pasienter >5 x ULN	%-andel pasienter > 8 x ULN
6 til < 12 år	40	15,0 % (6)	2,5 % (1)	2,5 % (1)
2 til 6 år	34	14,7 % (5)	14,7 % (5)	14,7 % (5)
12 til < 24 måneder	18	27,8 % (5)	11,1 % (2)	11,1 % (2)
1 til < 12 måneder	24	8,3 % (2)	4,2 % (1)	4,2 % (1)

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med tezakaftor/ivakaftor

Sikkerheten til tezakaftor/ivakaftor i kombinasjon med ivakaftor ble evaluert hos 124 pasienter i alderen 6 år til under 12 år. Dosen tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg og ivakaftor 150 mg har ikke blitt undersøkt i kliniske studier hos barn i alderen 6 år til under 12 år som veier 30 til < 40 kg.

Sikkerhetsprofilen er generelt lik hos barn og ungdom, og samsvarer også med den hos voksne pasienter.

I den 24-ukers, åpne fase 3-studien hos pasienter i alderen 6 år til under 12 år (studie 661-113 del B, n = 70), var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8, > 5 og > 3 x ULN henholdsvis 1,4 %, 4,3 % og 10,0 %. Ingen pasienter behandlet med tezakaftor/ivakaftor fikk en

transaminaseøkning $> 3 \times \text{ULN}$ forbundet med økt totalbilirubin $> 2 \times \text{ULN}$ eller seponerte behandling med tezakaftor/ivakaftor på grunn av økte transaminaser. En pasient avbrøt behandling på grunn av økte transaminaser, og gjenopptok behandling med tezakaftor/ivakaftor med godt resultat (se pkt. 4.4 for håndtering av økte transaminaser).

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

Sikkerhetsdata for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor i kombinasjon med ivakaftor i studie 445-102, 445-103, 445-104, 445-106 og 445-111 ble evaluert hos 228 pasienter i alderen 2 år til under 18 år. Sikkerhetsprofilen er generelt lik hos pediatriske og voksne pasienter.

I studie 445-106 hos pasienter i alderen 6 år til under 12 år, var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 og $> 3 \times \text{ULN}$ henholdsvis 0,0%, 1,5 % og 10,6 %. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor fikk en transaminaseøkning $> 3 \times \text{ULN}$ forbundet med økt totalbilirubin $> 2 \times \text{ULN}$ eller seponerte behandling på grunn av økte transaminaser (se pkt. 4.4).

I studie 445-111 hos pasienter i alderen 2 år til under 6 år, var insidensen av maksimal transaminase (ALAT eller ASAT) > 8 , > 5 og $> 3 \times \text{ULN}$ henholdsvis 1,3 %, 2,7 % og 8,0 %. Ingen pasienter behandlet med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor fikk en transaminaseøkning $> 3 \times \text{ULN}$ forbundet med økt totalbilirubin $> 2 \times \text{ULN}$ eller seponerte behandling på grunn av økte transaminaser (se pkt. 4.4).

Utslett

I studie 445-111 hos pasienter i alderen 2 år til under 6 år, fikk 15 (20,0 %) forsøkspersoner minst 1 tilfelle med utslett, 4 (9,8 %) jenter og 11 (32,4%) gutter.

Uklar linse

En pasient fikk en uønsket hendelse med uklar linse.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via [det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V](#).

4.9 Overdosering

Det finnes intet spesifikt antidot mot overdosering med ivakaftor. Behandling av overdosering består av generelle støttetiltak, inkludert overvåking av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av pasientens kliniske status.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet, ATC-kode: R07AX02

Virkningsmekanisme

Ivakaftor er en forsterker av CFTR-proteinet, dvs. *in vitro* øker ivakaftor CFTR-kanalreguleringen slik at transporten av klorid øker ved spesifikke mutasjoner (som angitt i pkt. 4.1) med redusert sannsynlighet for åpen kanal sammenlignet med normal CFTR. Ivakaftor øker også sannsynlighet for åpen kanal ved R117H-CFTR, som har både lav sannsynlighet for åpen kanal (regulering) og redusert kanalgjennomstrømningsamplitude (konduktans). G970R-mutasjonen forårsaker en spleisefeil som gir lite eller ingen CFTR-protein på celleoverflaten, hvilket kan forklare resultatene observert hos

forsøkspersoner med denne mutasjonen i studie 770-111 (se Farmakodynamiske effekter og Klinisk effekt og sikkerhet).

In vitro-respons sett i patch clamp-eksperimenter med enkeltkanaler ved bruk av membranlapper fra gnaverceller som uttrykker mutante CFTR-former, korresponderer ikke nødvendigvis med farmakodynamisk respons *in vivo* (f.eks. klorid i svette) eller klinisk effekt. Den eksakte mekanismen som gjør at ivakaftor forsterker reguleringsaktiviteten hos normale og visse mutante CFTR-former i dette systemet har ikke blitt fullstendig belyst.

Farmakodynamiske effekter

Ivakaftor som monoterapi

I studie 770-102 og 770-103 med pasienter med *G551D*-mutasjon i ett allel av *CFTR*-genet, ga ivakaftor rask (15 dager), betydelig (gjennomsnittlig endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 24 var henholdsvis -48 mmol/l [95 % KI -51, -45] og -54 mmol/l [95 % KI -62, -47]) og vedvarende (i 48 uker) reduksjon i kloridkonsentrasjonen i svette.

I studie 770-111, del 1 med pasienter som hadde en ikke-*G551D*-mutasjon i *CFTR*-genet, medførte behandling med ivakaftor en rask (15 dager) og betydelig gjennomsnittlig endring i klorid i svette på -49 mmol/l (95 % KI -57, -41) fra baseline til og med behandlingsuke 8. Hos pasienter med *G970R-CFTR*-mutasjon var imidlertid gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i klorid i svette til uke 8 -6,25 (6,55) mmol/l. Det ble sett tilsvarende resultater i del 2 av studien som i del 1. Ved oppfølgingskontroll i uke 4 (4 uker etter avsluttet dosering med ivakaftor), gikk gjennomsnittsverdien for klorid i svette i hver gruppe mot nivået før behandling.

I studie 770-110 med CF-pasienter som var 6 år eller eldre som hadde en *R117H*-mutasjon i *CFTR*-genet, var behandlingsforskjellen i gjennomsnittlig endring fra baseline i klorid i svette etter 24 ukers behandling -24 mmol/l (95 % KI -28, -20). I en undergruppeanalyse basert på alder var behandlingsforskjellen -21,87 mmol/l (95 % KI -26,46, -17,28) hos pasienter fra 18 års alder, og -27,63 mmol/l (95 % KI -37,16, -18,10) hos pasienter i alderen 6 til 11 år. To pasienter i alderen 12 til 17 år ble inkludert i denne studien.

I studie 770-108 med pasienter i alderen 2 til under 6 år med en reguleringsmutasjon i minst i ett allel av *CFTR*-genet som fikk 50 mg eller 75 mg ivakaftor to ganger daglig, var gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til uke 24 i klorid i svette -47 mmol/l (95 % KI -58, -36).

I studie 770-124 med CF-pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneders alder, var gjennomsnittlig absolutt endring i klorid i svette, fra baseline til uke 24, -62,0 mmol/l (95 % KI -71,6, -52,4). Resultatene var like i alderskohortene 12 måneder til under 24 måneder, 6 måneder til under 12 måneder og 4 måneder til under 6 måneder.

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

I studie 445-111 hos pasienter i alderen 2 til under 6 år som er homozygote for *F508del*-mutasjonen eller heterozygote for *F508del*-mutasjonen og har en mutasjon med minimal funksjon, var gjennomsnittlig absolutt endring i klorid i svette fra baseline til og med uke 24 var -57,9 mmol/l (95 % KI: -61,3, -54,6).

Klinisk effekt og sikkerhet

Ivakaftor som monoterapi

Studie 770-102 og 770-103: Studier av pasienter med CF med G551D-mutasjoner

Effekten til ivakaftor har blitt utredet i to randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte, multisenter, fase III-studier av klinisk stabile pasienter med CF som hadde G551D-mutasjon i CFTR-genet i minst ett allel og forventet FEV₁ ≥ 40 %.

Pasienter i begge studier ble randomisert 1:1 til å få 150 mg ivakaftor eller placebo hver 12. time sammen med fettholdig mat i 48 uker i tillegg til sin forskrevne CF-behandling (f.eks. tobramycin, dornase-alfa). Bruk av inhalert hypertont natriumkloridoppløsning var ikke tillatt.

Studie 770-102 evaluerte 161 pasienter som var 12 år eller eldre. 122 (75,8 %) pasienter hadde F508del-mutasjonen i det andre allelet. Ved studiestart brukte pasientene i placebogruppen visse legemidler hyppigere enn i ivakaftorgruppen. Disse legemidlene omfattet dornasealfa (73,1 % mot 65,1 %), salbutamol (53,8 % mot 42,2 %), tobramycin (44,9 % mot 33,7 %) og salmeterol/flutikason (41,0 % mot 27,7 %). Ved baseline var gjennomsnittlig forventet FEV₁ 63,6 % (variasjonsbredde: 31,6 % til 98,2 %), og gjennomsnittlig alder var 26 år (variasjonsbredde: 12 til 53 år).

Studie 770-103 evaluerte 52 pasienter som var 6 til 11 år ved screening. Gjennomsnittlig (SD) kroppsvekt var 30,9 (8,63) kg; 42 (80,8 %) pasienter hadde F508del-mutasjonen i det andre allelet. Ved baseline var gjennomsnittlig forventet FEV₁ 84,2 % (variasjonsbredde: 44,0 % til 133,8 %), og gjennomsnittlig alder var 9 år (variasjonsbredde: 6 til 12 år); 8 (30,8 %) pasienter i placebogruppen og 4 (15,4 %) pasienter i ivakaftorgruppen hadde en forventet FEV₁ under 70 % ved baseline.

Primært effektendepunkt i begge studier var gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i prosent forventet FEV₁ etter 24 ukers behandling.

Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig absolutt endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 var 10,6 prosentpoeng (8,6, 12,6) i studie 770-102 og 12,5 prosentpoeng (6,6, 18,3) i studie 770-103. Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig relativ endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 var 17,1 % (13,9, 20,2) i studie 770-102 og 15,8 % (8,4, 23,2) i studie 770-103. Gjennomsnittlig endring fra baseline til og med uke 24 i FEV₁ (liter) var 0,37 liter i ivakaftorgruppen og 0,01 liter i placebogruppen i studie 770-102 og 0,30 liter i ivakaftorgruppen og 0,07 liter i placebogruppen i studie 770-103. I begge studier startet bedring i FEV₁ raskt (dag 15) og vedvarte i 48 uker.

Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig absolutt endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 hos pasienter i alderen 12 til 17 år i studie 770-102 var 11,9 prosentpoeng (5,9, 17,9). Behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo for gjennomsnittlig absolutt endring (95 % KI) i prosent forventet FEV₁ fra baseline til og med uke 24 hos pasienter med baseline forventet FEV₁ over 90 % i studie 770-103 var 6,9 prosentpoeng (-3,8, 17,6).

Resultatene for klinisk relevante sekundære endepunkter er vist i tabell 6.

Tabell 6: Effekt av ivakaftor på andre effektendepunkter i studie 770-102 og 770-103

	Studie 770-102		Studie 770-103	
Endepunkt	Behandlings-forskjell ^a (95 % KI)	P-verdi	Behandlings-forskjell ^a (95 % KI)	P-verdi
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i CFQ-R^b respirasjonsdomene-score (poeng)^c				
Til og med uke 24	8,1 (4,7, 11,4)	< 0,0001	6,1 (-1,4, 13,5)	0,1092
Til og med uke 48	8,6 (5,3, 11,9)	< 0,0001	5,1 (-1,6, 11,8)	0,1354
Relativ risiko for lungeforverring				
Til og med uke 24	0,40 ^d	0,0016	NA	NA
Til og med uke 48	0,46 ^d	0,0012	NA	NA
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i kroppsvekt (kg)				
I uke 24	2,8 (1,8, 3,7)	< 0,0001	1,9 (0,9, 2,9)	0,0004
I uke 48	2,7 (1,3, 4,1)	0,0001	2,8 (1,3, 4,2)	0,0002
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i BMI (kg/m²)				
I uke 24	0,94 (0,62, 1,26)	< 0,0001	0,81 (0,34, 1,28)	0,0008
I uke 48	0,93 (0,48, 1,38)	< 0,0001	1,09 (0,51, 1,67)	0,0003
Gjennomsnittlig endring fra baseline i z-score				
Vekt-for-alder z-score i uke 48 ^e	0,33 (0,04, 0,62)	0,0260	0,39 (0,24, 0,53)	< 0,0001
BMI-for-alder z-score i uke 48 ^e	0,33 (0,002, 0,65)	0,0490	0,45 (0,26, 0,65)	< 0,0001

KI: konfidensintervall, NA: ikke analysert på grunn av lav insidens av hendelser

^a Behandlingsforskjell = effekt av ivakaftor – effekt av placebo

^b CFQ-R: Det reviderte spørreskjemaet for cystisk fibrose er et sykdomsspesifikt, helserelatert livskvalitetsmål for CF.

^c Studie 770-102-data ble sammenslått for CFQ-R for voksne/ungdom og CFQ-R for barn i alderen 12 til 13 år, studie 770-103-data ble hentet fra CFQ-R for barn i alderen 6 til 11 år.

^d Risikoforhold for tid til første lungeforverring

^e Hos forsøkspersoner under 20 år (CDC-vekstskjema)

Studie 770-111: studie med pasienter med CF med ikke-G551D-mutasjoner

Studie 770-111 var en fase III, todelt, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, krysset studie (del 1) etterfulgt av en 16 ukers åpen forlengelsesperiode (del 2) for å evaluere effekt og sikkerhet av ivakaftor hos pasienter med CF i alderen 6 år og eldre som hadde en *G970R*- eller ikke-*G551D*-mutasjon i *CFTR*-genet (*G178R*, *S549N*, *S549R*, *G551S*, *G1244E*, *S1251N*, *S1255P* eller *G1349D*).

I del 1 ble pasientene randomisert 1:1 til å få 150 mg ivakaftor eller placebo hver 12. time sammen med fettholdig mat i 8 uker i tillegg til sin foreskrevne CF-behandling, og bytte over til den andre behandlingen i de neste 8 ukene etter en 4 til 8 ukers utvaskingsperiode. Bruk av inhalert hypertont saltvannssoppløsning var ikke tillatt. I del 2 fikk alle pasienter ivakaftor som indisert i del 1 i ytterligere 16 uker. Varigheten av kontinuerlig ivakaftorbehandling var 24 uker for pasienter randomisert til del 1 placebo/ivakaftorbehandlingssekvens og 16 uker for pasienter randomisert til del 1 ivakaftor/placebobehandlingssekvens.

Trettini pasienter (gjennomsnittlig alder 23 år) med baseline forventet FEV₁ ≥ 40 % (gjennomsnittlig forventet FEV₁ 78 % [variasjonsbredde: 43 % til 119 %]) ble inkludert. Sekstito prosent (24/39) av

dem var bærere av *F508del-CFTR*-mutasjonen i det andre allelet. Totalt 36 pasienter fortsatte i del 2 (18 per behandlingssekvens).

I del 1 av studie 770-111 var gjennomsnittlig prosent forventet FEV₁ ved baseline 79,3 % hos placebobehandlede pasienter og 76,4 % hos pasienter behandlet med ivakaftor. Gjennomsnittlig samlet verdi etter baseline var henholdsvis 76,0 % og 83,7 %. Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 8 i prosent forventet FEV₁ (primært effektendepunkt) var 7,5 % i ivakaftorperioden og -3,2 % i placeboperioden. Observert behandlingsforskjell (95 % KI) mellom ivakaftor og placebo var 10,7 % (7,3, 14,1) ($P < 0,0001$).

Ivakaftors effekt i totalpopulasjonen i studie 770-111 (inkludert de sekundære endepunktene absolutt endring i BMI til behandlingsuke 8 og absolutt endring i CFQ-R respirasjonsdomene-score til og med behandlingsuke 8) og basert på individuell mutasjon (absolutt endring i klorid i svette og i prosent forventet FEV₁ til uke 8) er vist i tabell 7. Effekt hos pasienter med *G970R*-mutasjon kunne ikke fastslås på bakgrunn av klinisk (prosent forventet FEV₁) og farmakodynamisk (klorid i svette) respons på ivakaftor.

Tabell 7: Effekt av ivakaftor på effektvariabler hos totalpopulasjonen og ved spesifikke *CFTR*-mutasjoner

Absolutt endring i prosent forventet FEV ₁	BMI (kg/m ²)	CFQ- R respirasjonsdomene-score (poeng)
Til og med uke 8	I uke 8	Til og med uke 8
Alle pasienter (N = 39) Resultater vist som gjennomsnittlig (95 % KI) endring fra baseline for pasienter behandlet med ivakaftor sammenlignet med placebo:		
10,7 (7,3, 14,1)	0,66 (0,34, 0,99)	9,6 (4,5, 14,7)
Pasienter gruppert under mutasjonstyper (n) Resultater vist som gjennomsnittlig (minste, største) endring fra baseline for pasienter behandlet med ivakaftor i uke 8*:		
Mutasjon (n)	Absolutt endring i klorid i svette (mmol/l)	Absolutt endring i prosent forventet FEV ₁ (prosentpoeng)
	I uke 8	I uke 8
<i>G1244E</i> (5)	-55 (-75, -34)	8 (-1, 18)
<i>G1349D</i> (2)	-80 (-82, -79)	20 (3, 36)
<i>G178R</i> (5)	-53 (-65, -35)	8 (-1, 18)
<i>G551S</i> (2)	-68 [†]	3 [†]
<i>G970R</i> [#] (4)	-6 (-16, -2)	3 (-1, 5)
<i>S1251N</i> (8)	-54 (-84, -7)	9 (-20, 21)
<i>S1255P</i> (2)	-78 (-82, -74)	3 (-1, 8)
<i>S549N</i> (6)	-74 (-93, -53)	11 (-2, 20)
<i>S549R</i> (4)	-61 ^{††} (-71, -54)	5 (-3, 13)

* Statistisk testing ikke gjennomført på grunn av lavt antall individuelle mutasjoner.

[†] Gjenspeiler resultater fra den ene pasienten med *G551S*-mutasjon med data for tidspunktet 8 uker.

^{††} n = 3 for analyse av absolutt endring i klorid i svette.

[#] Forårsaker en spleisefeil som gir lite eller ingen CFTR-protein på celleoverflaten.

I del 2 av studie 770-111 var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ etter 16 uker (pasienter randomisert til ivakaftor/placebobehandlingssekvensen i del 1) med kontinuerlig ivakaftorbehandling 10,4 % (13,2 %). Ved oppfølgingskontroll 4 uker etter avsluttet dosering med ivakaftor var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ fra del 2 uke 16 -5,9 % (9,4 %). For pasienter randomisert til placebo/ivakaftorbehandlingsekvensen i del 1 var det en ytterligere gjennomsnittlig (SD) endring på 3,3 % (9,3 %) i prosent forventet FEV₁ etter ytterligere 16 behandlingsuker med ivakaftor. Ved oppfølgingskontroll 4 uker etter avsluttet dosering med ivakaftor var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV₁ fra del 2 uke 16 -7,4 % (5,5 %).

Studie 770-104: studie med pasienter med CF og F508del-mutasjon i CFTR-genet

Studie 770-104 (del A) var en 16 ukers, 4:1 randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, parallellgruppe, fase II-studie av ivakaftor (150 mg hver 12. time) hos 140 pasienter med CF, som var 12 år eller eldre og homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet og hadde forventet $FEV_1 \geq 40$ %.

Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 16 i prosent forventet FEV_1 (primært effektendepunkt) var 1,5 prosentpoeng i ivakaftorgruppen og -0,2 prosentpoeng i placebogruppen. Anslått behandlingsforskjell mellom ivakaftor og placebo var 1,7 prosentpoeng (95 % KI: -0,6, 4,1). Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant ($P = 0,15$).

Studie 770-105: åpen forlengelsesstudie

I studie 770-105 fikk pasienter som fullførte behandling i studie 770-102 og 770-103 med placebo bytte til ivakaftor, mens pasienter som hadde fått ivakaftor fortsatte å få det i minst 96 uker, dvs. behandlingens lengde med ivakaftor var minst 96 uker for pasienter i placebo/ivakaftorgruppen og minst 144 uker for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen.

Etthundreogfortifire (144) pasienter fra studie 770-102 ble overført til studie 770-105, 67 i placebo/ivakaftorgruppen og 77 i ivakaftor/ivakaftorgruppen. Førtiåtte (48) pasienter fra studie 770-103 ble overført til studie 770-105, 22 i placebo/ivakaftorgruppen og 26 i ivakaftor/ivakaftorgruppen.

Tabell 8 viser resultater for gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV_1 for begge pasientgrupper. For pasienter i placebo/ivakaftorgruppen er baseline prosent forventet FEV_1 fra studie 770-105, og for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen er baselineverdien fra studie 770-102 og 770-103.

Tabell 8: Effekt av ivakaftor på prosent forventet FEV_1 i studie 770-105

Opprinnelig studie og behandlingsgruppe	Varighet av ivakaftorbehandling (uker)	Absolutt endring fra baseline i prosent forventet FEV ₁ (prosentpoeng)	
		N	Gjennomsnitt (SD)
Studie 770-102			
Ivakaftor	48*	77	9,4 (8,3)
	144	72	9,4 (10,8)
Placebo	0*	67	-1,2 (7,8) [†]
	96	55	9,5 (11,2)
Studie 770-103			
Ivakaftor	48*	26	10,2 (15,7)
	144	25	10,3 (12,4)
Placebo	0*	22	-0,6 (10,1) [†]
	96	21	10,5 (11,5)

* Behandling i blindet, kontrollert, 48 ukers fase III-studie.

[†] Endring fra baseline i forrige studie etter 48 ukers placebobehandling.

Når gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV_1 fra baseline i studie 770-105 ble sammenlignet var gjennomsnittlig (SD) absolutt endring i prosent forventet FEV_1 0,0 % (9,05) for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen ($n = 72$) overført fra studie 770-102, og 0,6 % (9,1) for pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen ($n = 25$) overført fra studie 770-103. Dette viser at pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen beholdt bedringen i prosent forventet FEV_1 sett i uke 48 i den første studien (dag 0 til og med uke 48) til og med uke 144. Det var ingen ytterligere bedring i studie 770-105 (uke 48 til og med uke 144).

For pasienter i placebo/ivakaftorgruppen fra studie 770-102 var årlig grad av lungeforverring høyere i den første studien hvor pasientene fikk placebo (1,34 hendelser/år) enn i den påfølgende studie 770-105 hvor pasientene byttet til ivakaftor (0,48 hendelser/år fra dag 1 til uke 48, og 0,67 hendelser/år fra uke 48 til 96). For pasienter i ivakaftor/ivakaftorgruppen fra studie 770-102 var årlig grad av lungeforverring 0,57 hendelser/år fra dag 1 til uke 48 når pasientene fikk ivakaftor. Når de ble overført til studie 770-105 var årlig grad av lungeforverring 0,91 hendelser/år fra dag 1 til uke 48 og 0,77 hendelser/år fra uke 48 til 96.

For pasienter overført fra studie 770-103 var antall hendelser generelt lav.

Studie 770-110: studie med pasienter med CF med en R117H-mutasjon i CFTR-genet

Studie 770-110 evaluerte 69 pasienter som var 6 år eller eldre; 53 (76,8 %) pasienter hadde F508del-mutasjonen i det andre allelet. Bekreftet R117H poly-T-variant var 5T hos 38 pasienter og 7T hos 16 pasienter. Ved baseline var gjennomsnittlig forventet FEV₁ 73 % (variasjonsbredde: 32,5 % til 105,5 %), og gjennomsnittlig alder var 31 år (variasjonsbredde: 6 til 68 år). Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 24 i prosent forventet FEV₁ (primært effektendepunkt) var 2,57 prosentpoeng i ivakaftorgruppen og 0,46 prosentpoeng i placebogruppen. Anslått behandlingsforskjell mellom ivakaftor og placebo var 2,1 prosentpoeng (95 % KI: -1,1, 5,4).

En planlagt undergruppeanalyse ble gjennomført hos pasienter i alderen 18 år eller eldre (26 pasienter på placebo og 24 pasienter på ivakaftor). Behandling med ivakaftor medførte en gjennomsnittlig absolutt endring i prosent forventet FEV₁ til og med uke 24 på 4,5 prosentpoeng i ivakaftorgruppen og -0,46 prosentpoeng i placebogruppen. Anslått behandlingsforskjell mellom ivakaftor og placebo var 5,0 prosentpoeng (95 % KI: 1,1, 8,8).

I en undergruppeanalyse hos pasienter med bekræftet R117H-5T genetisk variant, var forskjellen i gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline til og med uke 24 i prosent forventet FEV₁ mellom ivakaftor og placebo 5,3 % (95 % KI 1,3, 9,3). Hos pasienter med bekræftet R117H-7T genetisk variant, var behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo 0,2 % (95 % KI: -8,1, 8,5).

For sekundære effektvariabler ble det ikke observert behandlingsforskjeller mellom ivakaftor og placebo i absolutt endring fra baseline i BMI i uke 24 eller tid til første lungeforverring. Det ble observert behandlingsforskjeller i absolutt endring i CFQ-R respirasjonsdomene-score til og med uke 24 (behandlingsforskjellen mellom ivakaftor og placebo var 8,4 [95 % KI: 2,2, 14,6] poeng) og for gjennomsnittlig endring fra baseline i klorid i svette (se Farmakodynamiske effekter).

Studie 770-108: studie med pediatriske pasienter med CF i alderen 2 til under 6 år med G551D- eller en annen reguleringsmutasjon

Ivakaftors farmakokinetikkprofil, sikkerhet og effekt hos 34 pasienter i alderen 2 til under 6 år med CF og som hadde en G551D-, G1244E-, G1349D-, G178R-, G551S-, S1251N-, S1255P-, S549N- eller S549R-mutasjon i CFTR-genet ble undersøkt i en 24-ukers, ikke-kontrollert studie med ivakaftor (pasienter som veide mindre enn 14 kg fikk 50 mg ivakaftor og pasienter som veide 14 kg eller mer fikk 75 mg ivakaftor). Ivakaftor ble gitt oralt hver 12. time sammen med fettholdig mat i tillegg til deres forskrevne CF-behandling.

Pasientene i studie 770-108 var i alderen 2 til under 6 år (gjennomsnittsalder 3 år). Tjueseks pasienter av de 34 inkluderte (76,5 %) hadde CFTR-genotype G551D/F508del og kun 2 pasienter hadde en ikke-G551D-mutasjon (S549N). Gjennomsnittlig (SD) klorid i svette ved baseline (n = 25) var 97,88 mmol/l (14,00). Gjennomsnittlig (SD) fekal elastase-1-verdi ved baseline (n = 27) var 28 µg/g (95).

Det primære sikkerhetsendepunktet ble evaluert frem til og med uke 24 (se pkt. 4.8). Sekundære og eksplorative effektendepunkter som ble evaluert var absolutt endring fra baseline til og med behandlingsuke 24 i klorid i svette, absolutt endring fra baseline til og med behandlingsuke 24 i vekt, kroppsmasseindeks (BMI) og størrelse (støttet av z-score for vekt, BMI og størrelse) og mål for

pankreasfunksjon slik som fekal elastase-1. Data vedrørende prosent forventet FEV₁ (eksplorativt endepunkt) var tilgjengelig for 3 pasienter i gruppen med 50 mg ivakaftor og 17 pasienter i doseringsgruppen med 75 mg.

Gjennomsnittlig (SD) samlet (begge ivakaftordoseringsgrupper samlet) absolutt endring fra baseline til uke 24 i BMI var 0,32 kg/m² (0,54), og gjennomsnittlig (SD) samlet endring i BMI-for-alder z-score var 0,37 (0,42). Gjennomsnittlig (SD) samlet endring i størrelse-for-alder z-score var -0,01 (0,33). Gjennomsnittlig (SD) samlet endring fra baseline i fekal elastase-1 (n = 27) var 99,8 µg/g (138,4). Seks pasienter med initiale nivåer under 200 mikrog/g oppnådde i uke 24 et nivå på ≥ 200 mikrog/g. Gjennomsnittlig (SD) samlet endring i prosent forventet FEV₁ fra baseline til uke 24 (eksplorativt endepunkt) var 1,8 (17,81).

Studie 770-124: Studie med pediatriske CF-pasienter i alder under 24 måneder

Ivakaftors farmakokinetikk og sikkerhet hos CF-pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneder ble undersøkt i en 24-ukers (kun del B) åpen studie med én behandlingsgruppe hvor 19 pasienter i alderen 12 måneder til under 24 måneder (gjennomsnittsalder 15,2 måneder ved baseline), 11 pasienter i alderen 6 måneder til under 12 måneder, 6 pasienter i alderen 4 måneder til under 6 måneder og 7 pasienter (del A/B) i alderen 1 måned til under 4 måneder, ble inkludert og behandlet med ivakaftor basert på alder og kroppsvekt. Gjennomsnittsalder ved baseline i hver kohort var henholdsvis 15,2 måneder, 9,0 måneder, 4,5 måneder og 1,9 måneder.

Primært endepunkt i del B og del A/B var sikkerhet frem til og med uke 24. Farmakokinetikk og absolutt endring i klorid i svette fra baseline til uke 24 (se Farmakodynamiske effekter) var sekundære endepunkter. Tertiære endepunkter omfattet effektmål som fekal elastase-1 og vekstparametre.

For pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneder, med tilgjengelige verdier for både baseline og uke 24, er gjennomsnittlig (SD) z-score for vekt-for-alder, lengde-for-alder og vekt-for-lengde presentert i tabell 9.

Tabell 9: Effekt av ivakaftor på vekstparametre hos pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneder med verdier for baseline og uke 24

Parameter	Antall pasienter	Baseline		Absolutt endring i uke 24	
		Gjennomsnitt (SD)	Median (min, maks)	Gjennomsnitt (SD)	Median (min, maks)
Vekt-for-alder z-score	41	0,00 (0,94)	0,07 [-1,93, 1,79]	0,45 (0,64)	0,30 [-0,54, 2,66]
Lengde-for-alder z-score	40	-0,03 (1,11)	-0,03 [-1,99, 2,79]	0,44 (0,92)	0,52 [-1,81, 3,38]
Vekt-for-lengde z-score	40	0,07 (1,02)	0,14 [-1,72, 2,16]	0,32 (0,99)	0,32 [-2,04, 2,22]

Hos pasienter i alderen 1 måned til under 24 måneder, blant 24 forsøkspersoner som hadde nedsatt pankreasfunksjon ved baseline (definert som fekal elastase-1 < 200 µg/g), hadde 14 forsøkspersoner fekal elastase-1-verdier over 200 mikrog/g i uke 24. I samlet populasjon i del B og del A/B var median (min, maks) verdi for fekal elastase-1 (mikrog/g) 55,5 (7,5, 500,0) ved baseline. Median (min, maks) absolutt endring i fekal elastase-1 fra baseline (n = 40) til uke 24 (n = 33) var 126,0 (-23,0, 423,5).

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

Effekten og sikkerheten til ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor hos pasienter 12 år og eldre ble demonstrert i tre fase 3-studier som var randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte (pasientene var heterozygote for *F508del*-mutasjonen og hadde en mutasjon med minimal funksjon på det andre allelet, n = 403) og hadde aktiv kontroll (pasientene var homozygote for *F508del*-mutasjonen, n = 107, eller heterozygote for *F508del*-mutasjonen og hadde en mutasjon med reguleringsfeil eller CFTR restaktivitet på det andre allelet, n = 258) og var av henholdsvis 24, 4 og 8 ukers varighet. Pasienter fra alle studiene var kvalifisert til å delta i åpne, rollover,

langtidsforlengelsesstudier (studie 445-105 eller studie 445-110). Se preparatomtale for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor for ytterligere data.

Pediatrisk populasjon

Ivakaftor i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor

Farmakokinetikk og sikkerhet hos pasienter i alderen 6 til under 12 år ($n = 66$) og hos pasienter fra 2 til under 6 år ($n = 75$) som hadde minst én *F508del*-mutasjon ble undersøkt i henholdsvis to 24-ukers åpne studier (studie 445-105 og studie 445-110). Se preparatomtale for ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor for ytterligere data.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Farmakokinetikken til ivakaftor er lik hos friske, voksne forsøkspersoner og pasienter med CF.

Etter en oral 150 mg enkeltdose gitt til friske forsøkspersoner etter et måltid var gjennomsnittlig ($\pm$ SD) AUC og $C_{\max}$ henholdsvis 10,60 (5,26) mikrog.time/ml og 0,768 (0,233) mikrog/ml. Etter dosering hver 12. time ble steady-state plasmakonsentrasjon av ivakaftor nådd på dag 3 til 5, med et akkumuleringsforhold på 2,2 til 2,9.

Absorpsjon

Etter gjentatt oral dosering med ivakaftor økte ivakaftoreksponeringen vanligvis med dosen fra 25 mg hver 12. time til 450 mg hver 12. time. Da det ble gitt sammen med fettholdig mat, økte ivakaftoreksponeringen ca. 2,5 til 4 ganger. Ved samtidig administrering med tezakaftor og eleksakaftor, var økningen i AUC lignende (henholdsvis omtrent 3 ganger så høy og 2,5 til 4 ganger så høy). Ivakaftor gitt som monoterapi eller i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, bør derfor gis sammen med fettholdig mat. Median (variasjonsbredde) $t_{\max}$ er ca. 4,0 (3,0, 6,0) timer etter et måltid.

Ivakaftor granulat (2 x 75 mg doseposser) hadde samme biotilgjengelighet som 150 mg tabletter gitt sammen med fettholdig mat til friske voksne forsøkspersoner. Geometrisk minste kvadrats gjennomsnittsforhold (90 % KI) for granulat i forhold til tabletter var 0,951 (0,839, 1,08) for $AUC_{0-\infty}$ og 0,918 (0,750, 1,12) for $C_{\max}$. Effekten av mat på ivakaftors absorpsjon er lik for begge formuleringer, dvs. tabletter og granulat.

Distribusjon

Ivakaftor er ca. 99 % plasmaproteinbundet, hovedsakelig til surt alfa 1-glykoprotein og albumin. Ivakaftor bindes ikke til erytrocytter hos mennesker.

Etter oral administrering av ivakaftor 150 mg hver 12. time etter et måltid i 7 dager hos friske forsøkspersoner, var gjennomsnittlig ($\pm$ SD) tilsynelatende distribusjonsvolum 353 (122) liter.

Biotransformasjon

Ivakaftor blir omfattende metabolisert hos mennesker. *In vitro*- og *in vivo*-data indikerer at ivakaftor hovedsakelig metaboliseres av CYP3A. M1 og M6 er ivakaftors to hovedmetabolitter hos mennesker. M1 har ca. en sjettedel av ivakaftors potens og anses å være farmakologisk aktivt. M6 har mindre enn en femtiendedel av ivakaftors potens og anses ikke å være farmakologisk aktivt.

Effekten av CYP3A4*22 heterozygot genotype på eksponering for ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor samsvarer med effekten av samtidig administrering av en svak CYP3A4-hemmer, som ikke er klinisk relevant. Ingen dosejustering av ivakaftor, tezakaftor eller eleksakaftor vurderes som

nødvendig. Effekten hos pasienter med CYP3A4*22 homozygot genotype forventes å være sterkere. Det er imidlertid ingen tilgjengelige data for disse pasientene.

Eliminasjon

Etter oral administrering hos friske forsøkspersoner ble mesteparten av ivakaftor (87,8 %) eliminert i fæces etter metabolisering. Hovedmetabolittene M1 og M6 tilsvarer ca. 65 % av eliminert totaldose, med 22 % som M1 og 43 % som M6. Det var ubetydelig urinutskillelse av ivakaftor som uendret modersubstans. Tilsynelatende terminal halveringstid var ca. 12 timer etter en enkeltdose gitt etter et måltid. Tilsynelatende clearance (CL/F) av ivakaftor var tilsvarende hos friske forsøkspersoner og pasienter med CF. Gjennomsnittlig ($\pm$ SD) CL/F for en 150 mg enkeltdose var 17,3 (8,4) liter/time hos friske forsøkspersoner.

Linearitet/ikke-linearitet

Farmakokinetikken til ivakaftor er vanligvis lineær med hensyn til tid i doseområdet fra 25 mg til 250 mg.

Spesielle populasjoner

Nedsatt leverfunksjon

Etter en enkeltdose på 150 mg ivakaftor hadde voksne forsøkspersoner med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B, score 7 til 9) tilsvarende ivakaftor $C_{\max}$ (gjennomsnitt [$\pm$ SD] på 0,735 [0,331] $\mu\text{g/ml}$), men ca. dobbel ivakaftor AUC_{0- ∞} (gjennomsnitt [$\pm$ SD] på 16,80 [6,14] $\mu\text{g}\cdot\text{time/ml}$) sammenlignet med friske forsøkspersoner med tilsvarende demografi. Simuleringer for å forutsi steady-state ivakaftoreksponering viste at ved å redusere dosen fra 150 mg hver 12. time til 150 mg én gang daglig, vil voksne med moderat nedsatt leverfunksjon få omtrent de samme steady-state $C_{\min}$ -verdier som de som oppnås med en dose på 150 mg hver 12. time hos voksne uten nedsatt leverfunksjon.

Hos forsøkspersoner med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B, skår 7 til 9) økte ivakaftor-AUC med omtrent 50 % etter gjentatte doser i 10 dager med enten ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor.

Effekten av alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C, score 10 til 15) på farmakokinetikken til ivakaftor eller i et kombinasjonsregime med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor er ikke undersøkt. Størrelsen på økningen i eksponering hos disse pasientene er ukjent, men forventes å være høyere enn observert hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon.

For veiledning om egnet bruk og doseendring se tabell 3 i pkt. 4.2.

Nedsatt nyrefunksjon

Farmakokinetikkstudier er ikke utført med ivakaftor hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. I en farmakokinetikkstudie hos mennesker var det minimal eliminasjon av ivakaftor og metabolitter i urin (kun 6,6 % av total radioaktivitet ble gjenfunnet i urin). Det var ubetydelig urinutskillelse av ivakaftor som uendret modersubstans (mindre enn 0,01 % etter en oral enkeltdose på 500 mg).

Dosejustering er ikke anbefalt ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet anbefales imidlertid ved bruk av ivakaftor hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance på 30 ml/minutt eller lavere) eller terminal nyresykdom (se pkt. 4.2 og 4.4).

Etnisitet

Etnisitet hadde ingen klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til ivakaftor hos hvite (n = 379) og ikke-hvite (n = 29) pasienter basert på en populasjonsfarmakokinetisk analyse.

Kjønn

De farmakokinetiske parametrene til ivakaftor, enten som monoterapi eller i kombinasjon med tezakaftor, er like hos menn og kvinner.

Eldre

Kliniske studier av ivakaftor som monoterapi inkluderte ikke tilstrekkelig mange pasienter som var 65 år eller eldre til å fastslå om de farmakokinetiske parametrene er tilsvarende de hos yngre voksne eller ikke.

Pediatrik populasjon

Forventet ivakaftoreksposering basert på observert ivakaftorkonsentrasjon i fase II- og III-studier og fastslått ved hjelp av kompartmentanalyse er presentert etter aldersgruppe i tabell 10.

Tabell 10: Gjennomsnittlig (SD) ivakaftoreksposering etter aldersgruppe

Aldersgruppe	Dose	C _{min, ss} (mikrog/ml)	AUC _{0-12h, ss} (mikrog time/ml)
1 måned til under 2 måneder (≥ 3 kg)*	13,4 mg hver 24. time	0,300 (0,221) [†]	5,84 (2,98) [†]
2 måneder til under 4 måneder (≥ 3 kg)*	13,4 mg hver 12. time	0,406 (0,266) [†]	6,45 (3,43) [†]
4 måneder til under 6 måneder (≥ 5 kg)*	25 mg hver 12. time	0,371 (0,183)	6,48 (2,52)
6 måneder til under 12 måneder (≥ 5 kg til < 7 kg)‡	25 mg hver 12. time	0,336	5,41
6 måneder til under 12 måneder (7 kg til < 14 kg)	50 mg hver 12. time	0,508 (0,252)	9,14 (4,20)
12 måneder til under 24 måneder (7 kg til < 14 kg)	50 mg hver 12. time	0,440 (0,212)	9,05 (3,05)
12 måneder til under 24 måneder (≥ 14 kg til < 25 kg)	75 mg hver 12. time	0,451 (0,125)	9,60 (1,80)
2 til 5 år (< 14 kg)	50 mg hver 12. time	0,577 (0,317)	10,50 (4,26)
2 til 5 år (≥ 14 kg til < 25 kg)	75 mg hver 12. time	0,629 (0,296)	11,30 (3,82)
6 til 11 år § (≥ 14 kg til < 25 kg)	75 mg hver 12. time	0,641 (0,329)	10,76 (4,47)
6 til 11 år § (≥ 25 kg)	150 mg hver 12. time	0,958 (0,546)	15,30 (7,34)
12 til 17 år	150 mg hver 12. time	0,564 (0,242)	9,24 (3,42)
Voksne (≥ 18 år)	150 mg hver 12. time	0,701 (0,317)	10,70 (4,10)

* Pasienter i alderen 1 måned til under 6 måneder var født ≥ 37. svangerskapsuke.

† Eksposering ved 1 måneds til 4 måneders alder er anslått ved simulering fra den fysiologisk baserte farmakokinetiske modellen ved hjelp av data fra den aktuelle aldersgruppen.

‡ Verdier basert på data fra én pasient; standardavvik ikke rapportert.

§ Eksposering hos 6- til 11-åringer er anslått ved simulering fra den populasjonsfarmakokinetiske modellen ved hjelp av data innhentet for denne aldersgruppen.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet og karsinogenitet.

Drektighet og fertilitet

Ivakaftor var forbundet med en liten reduksjon i sædblærevekt, en reduksjon i den totale fertilitetsindeksen og antall drektigheter hos hunner paret med behandlede hanner og signifikante reduksjoner i antall gule legemer og implantasjonssteder med påfølgende reduksjoner i gjennomsnittlig kullstørrelse og gjennomsnittlig antall levedyktige embryo pr. kull hos behandlede hunner. Høyeste nivå uten observerte bivirkninger (NOAEL, *No-Observed-Adverse-Effect-Level*) for fertilitetsfunn gir et eksponeringsnivå på ca. 4 ganger den systemiske eksponeringen av ivakaftor og dets metabolitter når det administreres som ivakaftor monoterapi hos voksne mennesker ved den maksimalt anbefalte dosen til mennesker (MRHD). Placentapassasje av ivakaftor ble observert hos drektige rotter og kaniner.

Peri- og postnatal utvikling

Ivakaftor ga redusert overlevelses- og laktasjonsindeks samt redusert kroppsvekt hos avkom. NOAEL for levedyktighet og vekst hos avkom gir et eksponeringsnivå på ca. 3 ganger den systemiske eksponeringen av ivakaftor og dets metabolitter når det administreres som ivakaftor monoterapi hos voksne mennesker ved MRHD.

Studier av juvenile dyr

Funn av katarakter ble observert hos juvenile rotter dosert fra postnatal dag 7 til 35 ved ivakaftor-eksponeringsnivåer 0,22 ganger MRHD basert på systemisk eksponering for ivakaftor og dets metabolitter når det administreres som ivakaftor monoterapi. Dette funnet er ikke observert i fostre fra rotter behandlet med ivakaftor på drektighetsdag 7 til 17, hos rottevalper eksponert for ivakaftor via melkeinntak frem til postnatal dag 20, hos 7 uker gamle rotter eller hos 3,5 til 5 måneder gamle hunder behandlet med ivakaftor. Mulig relevans av disse funnene for mennesker er ukjent.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpetoffer

Silika, kolloidal vannfri
Krysskarmellosenatrium
Hypromelloseacetatsuksinat
Laktosemonohydrat
Magnesiumstearat
Mannitol
Sukralose
Natriumlaurylsulfat (E 487)

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

4 år.

Det er vist at blandingen er stabil i én time.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Biaksialt orientert polyetylentereftalat/polyetylen/folie/polyetylen (BOPET/PE/folie/PE).

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose, Kalydeco 25 mg granulat i dosepose, Kalydeco 50 mg granulat i dosepose og Kalydeco 75 mg granulat i dosepose

Pakningsstørrelse på 56 doseposer (inneholder 4 enkeltlommer med 14 doseposer per lomme).

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose, Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose og Kalydeco 75 mg granulat i dosepose

Pakningsstørrelse på 28 doseposer (inneholder 4 enkeltlommer med 7 doseposer per lomme)

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/003
EU/1/12/782/004
EU/1/12/782/006
EU/1/12/782/008
EU/1/12/782/009
EU/1/12/782/010
EU/1/12/782/011

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 23. juli 2012

Dato for siste fornyelse: 29. april 2022

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) <https://www.ema.europa.eu>.

VEDLEGG II

- A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE**
- B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE
LEVERANSE OG BRUK**
- C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL
MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**
- D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE
SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET**

A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

Almac Pharma Services (Ireland) Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co. Louth
A91 P9KD
Irland

Almac Pharma Services Limited
Seagoe Industrial Estate
Craigavon
Northern Ireland
BT63 5UA
Storbritannia

Millmount Healthcare Limited
Block-7, City North Business Campus
Stamullen
Co. Meath
K32 YD60
Irland

I pakningsvedlegget skal det stå navn og adresse til tilvirkeren som er ansvarlig for batch release for gjeldende batch.

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2).

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

• Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR-er)

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR-er) for dette legemidlet er angitt i EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency).

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

• Risikohåndteringsplan (RMP)

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner vedrørende legemiddelovervåkning spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP.

En oppdatert RMP skal sendes inn:

- på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency);

- når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd.
- **Forpliktelse til å utføre tiltak etter autorisasjon**

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal fullføre følgende tiltak innen de angitte tidsrammer:

Beskrivelse	Forfallsdato
Langtids effektstudie for å sammenligne sykdomsprogresjon hos barn med CF som har en spesifisert <i>CFTR</i> -reguleringsmutasjon og er i alderen 2 til og med 5 år når behandling med Kalydecos startes, med sykdomsprogresjon i en tilsvarende matchet kohort av barn med CF som aldri har fått behandling med Kalydeco.	Interimanalyse 1: Desember 2017 Interimanalyse 2: Desember 2019 Interimanalyse 3: Desember 2021 Endelig rapport: Desember 2023

VEDLEGG III
MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

A. MERKING

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR BLISTERPAKNING – 56 TABLETTERS PAKNING****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 150 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Tas sammen med fettholdig mat.

Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPEIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UMLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 150 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERPAKNINGER – 56 TABLETTERS PAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 150 mg tabletter
ivacaftor

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR BLISTERKORTPAKNING – 28 TABLETTERS PAKNING****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 150 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg.

Tas sammen med fettholdig mat.

Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses.

Stikk inn fliken nedenfor for å lukke

Åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 150 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ INDRE EMBALLASJE**BLISTERKORTPAKNING – 28 TABLETTERS PAKNING****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 150 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg.

Tas sammen med fettholdig mat.

Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses.

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/005

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT****17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE****18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERPAKNINGER – 28 TABLETTERS PAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 150 mg tabletter
ivacaftor

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR BLISTERKORTPAKNING – 28 TABLETTERS PAKNING****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 75 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg.

Tas sammen med fettholdig mat.

Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses.

Stikk inn fliken nedenfor for å lukke

Åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/007

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 75 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ INDRE EMBALLASJE**BLISTERKORTPAKNING – 28 TABLETTERS PAKNING****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 75 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg.

Tas sammen med fettholdig mat.

Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses.

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/007

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT****17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE****18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERPAKNINGER – 28 TABLETTERS PAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 75 mg tabletter
ivacaftor

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR FLASKE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 150 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Tas sammen med fettholdig mat.

Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UMLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 150 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ INDRE EMBALLASJE**FLASKEETIKETT****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 tabl.: 150 mg ivacaftor

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

56 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN
--

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)
--

EU/1/12/782/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT
--

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose
ivacaftor
For pasienter i alderen 1 til under 2 måneder

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 13,4 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

28 doseposer

4 enkeltlommer med 7 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/010

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 13,4 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 13,4 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

7 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/010

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Kalydeco 13,4 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose
ivacaftor
For pasienter i alderen 2 til under 4 måneder

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 13,4 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

56 doseposer

4 enkeltlommer med 14 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/011

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 13,4 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 13,4 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

14 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Morgen

Kveld

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/011

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Kalydeco 13,4 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 25 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 25 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

56 doseposer

4 enkeltlommer med 14 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Kalydeco 25 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 25 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 25 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

14 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Morgen

Kveld

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/006

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

**MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE
EMBALLASJER**

DOSEPOSER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Kalydeco 25 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 50 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 50 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

56 doseposer

4 enkeltlommer med 14 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/003

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 50 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 50 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 50 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

14 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Morgen

Kveld

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/003

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kalydeco 50 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 59,5 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

28 doseposer

4 enkeltlommer med 7 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/008

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 59,5 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 59,5 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

7 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/008

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Kalydeco 59,5 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 75 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

56 doseposer

4 enkeltlommer med 14 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTOLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 75 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 75 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

14 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Morgen

Kveld

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/004

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UTOLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Kalydeco 75 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE**YTTEREMBALLASJE FOR DOSEPOSE – 28 STK.****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 75 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

28 doseposer

4 enkeltlommer med 7 doseposer per lomme

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Løft her for å åpne

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**8. UTLØPSDATO**

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL****11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/009

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**15. BRUKSANVISNING****16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

Kalydeco 75 mg granulat

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ MIDTRE EMBALLASJE**LOMME FOR DOSEPOSE – 7 STK.****1. LEGEMIDLETS NAVN**

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose
ivacaftor

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF

Hver dosepose med granulat inneholder 75 mg ivacaftor.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Granulat i dosepose

7 doseposer

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

Bruksanvisning

Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske som er ved eller under romtemperatur. Alt innhold skal inntas.

Brukes innen én time etter blanding, rett før eller etter et fettholdig måltid eller mellommåltid.

Bruk alle 7 dagers doser før du begynner med en ny lomme.

Ma. Ti. On. To. Fr. Lø. Sø.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/782/009

13. PRODUKSJONSNUMMER

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UMLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

DOSEPOSER – 28 STK.

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Kalydeco 75 mg granulat
ivacaftor
Oral bruk

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

Vertex Pharmaceuticals

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte ivakaftor (ivacaftor)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Kalydeco er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Kalydeco
3. Hvordan du bruker Kalydeco
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Kalydeco
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kalydeco er og hva det brukes mot

Kalydeco inneholder virkestoffet ivakaftor. Ivakaftor virker på nivået til cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR), et protein som danner en kanal i celleoverflaten hvor partikler som klorid kan forflytte seg inn og ut av cellen. På grunn av mutasjoner i *CFTR*-genet (se nedenfor), er kloridforflytningen redusert hos de med cystisk fibrose (CF). Ivakaftor bidrar til at visse unormale CFTR-proteiner åpnes oftere slik at kloridforflytning inn og ut av cellen bedres.

Kalydeco tabletter er til:

- Bruk alene (monoterapi) hos pasienter fra 6 års alder, som veier 25 kg eller mer, med cystisk fibrose (CF) som har en *R117H* CFTR-mutasjon eller en av følgende mutasjoner i *CFTR*-genet: *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* eller *S549R*.
- I kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor tabletter hos pasienter fra 6 års alder med CF som har to *F508del*-mutasjoner i *CFTR*-genet (homozygot for *F508del*-mutasjonen) eller som har en *F508del*-mutasjon og visse andre ytterligere mutasjoner som fører til redusert mengde og/eller funksjon av CFTR-proteinet (heterozygot for *F508del*-mutasjonen med en restfunksjon (RF)-mutasjon). Dersom du har fått forskrevet Kalydeco til bruk sammen med tezakaftor/ivakaftor, les pakningsvedlegget for sistnevnte. Det inneholder viktig informasjon om hvordan disse to legemidlene skal tas.
- I kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor tabletter hos pasienter over 6 år som har CF, med minst én *F508del*-mutasjon i *CFTR*-genet. Ved forskrivning av Kalydeco sammen med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, les pakningsvedlegget for sistnevnte. Det inneholder viktig informasjon om hvordan disse to legemidlene skal tas.

2. Hva du må vite før du bruker Kalydeco

Bruk ikke Kalydeco

- dersom du er allergisk overfor ivakaftor eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Kalydeco.

- Snakk med lege dersom du har leverproblemer eller har hatt det før. Legen din vil kanskje måtte justere dosen din.
- Økte leverenzymmer i blodet er sett hos noen personer som har fått Kalydeco (alene eller i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor). Informer lege omgående dersom du får noen av disse symptomene, som kan være tegn på leverproblemer:
 - smerter eller ubehag i øvre og høyre del av magen (abdomen)
 - gulning av huden eller det hvite i øynene
 - tap av appetitt
 - kvalme eller oppkast
 - mørk urin
- Legen kommer til å ta noen blodprøver for å sjekke leveren din før og under behandlingen, spesielt det første året og særlig dersom blodprøvene dine viste høye leverenzymmer tidligere.
- Depresjon (inkludert selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd) har blitt rapportert hos pasienter som brukte Kalydeco. Symptomene oppsto vanligvis i løpet av de tre første behandlingsmånedene, hovedsakelig ved bruk i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Snakk med lege omgående dersom du (eller noen som tar dette legemidlet) får noen av følgende symptomer: tristhet eller humørforandringer, angst, følelsesmessig ubehag eller tanker om selvskading eller selvmord, som kan være tegn på depresjon.
- Si fra til legen din hvis du har nyreproblemer eller har hatt det før.
- Kalydeco anbefales ikke dersom du har gjennomgått en organtransplantasjon.
- Snakk med legen hvis du bruker hormonelle prevensjonsmidler – for eksempel kvinner som bruker p-piller. Dette kan bety at det er mer sannsynlig at du får utslett mens du tar Kalydeco i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor.
- Forstyrrelser i øyets linse (grå stær) er sett hos enkelte barn og ungdommer behandlet med Kalydeco (alene eller i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor). Legen kan foreta noen øyeundersøkelser før og under behandling.
- Kalydeco bør kun brukes dersom du har én av mutasjonene i *CFTR*-genet nevnt i avsnitt 1 (Hva Kalydeco er og hva det brukes mot).

Barn og ungdom

Gi ikke dette legemidlet til barn under 1 måned da det er ukjent om ivakaftor er sikkert og effektivt hos disse barna.

Gi ikke dette legemidlet i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor til barn under 6 år eller i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor til barn under 2 år da det er ukjent om dette er sikkert og effektivt for dem.

Andre legemidler og Kalydeco

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler kan påvirke hvordan ivakaftor virker, eller gjøre bivirkninger mer sannsynlige. Snakk særlig med legen dersom du bruker noen av legemidlene på listen nedenfor. Legen kan bestemme å justere dosen eller at du trenger ekstra oppfølging.

- **Legemidler mot sopp** (brukes til behandling av soppinfeksjoner). Disse inkluderer flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol og vorikonazol.
- **Antibiotika** (brukes til behandling av bakterielle infeksjoner). Disse inkluderer klaritromycin, erytromycin, rifabutin, rifampicin og telitromycin.
- **Antiepileptika** (brukes til behandling av epileptiske anfall eller kramper). Disse inkluderer karbamazepin, fenobarbital, og fenytoin.
- **Naturlegemidler**. Disse inkluderer johannesurt (*Hypericum perforatum*).
- **Immunosuppressiva** (brukes etter organtransplantasjon). Disse inkluderer ciklosporin, everolimus, sirolimus, og takrolimus.
- **Hjerteglykosider** (brukes til behandling av visse hjertesykdommer). Disse inkluderer digoksin.
- **Antikoagulantia** (brukes til å forebygge at blodpropp dannes). Disse inkluderer warfarin.
- **Legemidler mot diabetes**. Disse inkluderer glimepirid og glipizid.
- **Blodtrykkslegemidler**. Disse inkluderer verapamil.

Inntak av Kalydeco sammen med mat og drikke

Unngå mat eller drikke som inneholder grapefrukt ved behandling da dette kan øke bivirkningene av Kalydeco ved å øke mengden av ivakaftor i kroppen din.

Graviditet og amming

Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis det er mulig, kan det beste være å unngå bruk av Kalydeco under svangerskapet. Legen vil hjelpe deg å avgjøre hva som er best for deg og barnet ditt.

Ivakaftor blir skilt ut i morsmelk. Snakk med lege før du tar Kalydeco dersom du planlegger å amme. Legen din vil anbefale at du enten bør avslutte ammingen eller avslutte behandlingen med ivakaftor. Legen din vil ta hensyn til fordelene ved amming for barnet og fordelene ved behandling for deg.

Kjøring og bruk av maskiner

Kalydeco kan gjøre deg svimmel. Ikke kjør, sykle eller bruk maskiner dersom du er svimmel.

Kalydeco inneholder laktose og natrium

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Kalydeco inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som "natriumfritt".

3. Hvordan du bruker Kalydeco

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.

Legen vil bestemme hvilket legemiddel og hvilken dose som er riktig for deg.

Doseringsanbefalingene for Kalydeco er gitt i tabell 1.

Tabell 1: Doseringsanbefalinger

Alder/vekt	Morgendose	Kveldsdose
Kalydeco som behandling alene (monoterapi)		
6 år og eldre, ≥ 25 kg	Én Kalydeco 150 mg tablett	Én Kalydeco 150 mg tablett
Kalydeco i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor		
6 år til under 12 år, < 30 kg	Én tezakaftor 50 mg/ivakaftor 75 mg tablett	Én Kalydeco 75 mg tablett
6 år til under 12 år, ≥ 30 kg	Én tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett	Én Kalydeco 150 mg tablett
12 år og eldre	Én tezakaftor 100 mg/ivakaftor 150 mg tablett	Én Kalydeco 150 mg tablett
Kalydeco i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
6 år til under 12 år, < 30 kg	To ivakaftor 37,5 mg/tezakaftor 25 mg/eleksakaftor 50 mg tabletter	Én Kalydeco 75 mg tablett
6 år til under 12 år, ≥ 30 kg	To ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter	Én Kalydeco 150 mg tablett
12 år og eldre	To ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg tabletter	Én Kalydeco 150 mg tablett

Morgen- og kveldsdosen skal tas med omtrent 12 timers mellomrom sammen med mat som inneholder fett.

Du må fortsette å bruke alle andre legemidler du bruker med mindre legen sier at du skal slutte å bruke noen av dem.

Dersom du har leverproblemer, enten moderate eller alvorlige, er det mulig at legen må redusere dosen av tablettene, fordi leveren ikke fjerner legemidlet så raskt som hos personer som har normal leverfunksjon.

Dette legemidlet skal inntas via munnen.

Tablettene skal svelges hele. Tablettene må ikke knuses, tygges eller oppløses. Ta Kalydeco tabletter sammen med mat som inneholder fett.

Måltider og mellommåltider som inneholder fett, omfatter de som tilberedes med smør eller oljer eller som inneholder egg. Annen fettholdig mat er:

- ost, helmelk, meieriprodukter basert på helmelk, yoghurt, sjokolade
- kjøtt, fet fisk
- avocado, hummus, soyabaserte produkter (tofu)
- nøtter, fettholdige energibarer eller -drikker

Dersom du tar for mye av Kalydeco

Du kan få bivirkninger, inkludert de som er nevnt i avsnitt 4 nedenfor. Snakk i så fall med lege eller apotek. Ta med deg legemidlet ditt og dette pakningsvedlegget hvis mulig.

Dersom du har glemt å ta Kalydeco

Ta den glemte dosen dersom det har gått mindre enn 6 timer fra tidspunktet du glemte å ta dosen. Vent ellers til neste planlagte dose slik du vanligvis ville gjort. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemte dose.

Dersom du avbryter behandling med Kalydeco

Ta Kalydeco så lenge som legen din anbefaler. Ikke avbryt behandlingen med mindre legen din anbefaler at du gjør det. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

Magesmerter (abdominalsmarter) og økte leverenzymer i blodet.

Mulige tegn på leverproblemer

Økte leverenzymer i blodet er vanlig hos pasienter med CF og har også blitt rapportert hos pasienter som tar Kalydeco alene eller i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor.

Hos pasienter som tar Kalydeco i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, har leverskade og forverring av leverfunksjonen blitt rapportert hos personer med alvorlig leversykdom. Forverring av leverfunksjonen kan være alvorlig og kreve transplantasjon.

Det kan være tegn på leverproblemer:

- smerter eller ubehag i øvre høyre del av magen (abdomen)
- gulning av huden eller det hvite i øynene
- redusert appetitt
- kvalme eller oppkast
- mørk urin

Depresjon

Symptomer på dette omfatter tristhet eller humørforandringer, angst, følelsesmessig ubehag.

Informér lege omgående dersom du får noen av disse symptomene.

Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

- øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse), inkludert sår hals og tett nese
- hodepine
- svimmelhet
- diaré
- mage- eller buksmerter
- endringer i bakterietyper i slim
- økte leverenzymer (tegn på stress i lever)
- utslett

Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

- rennende nese
- øresmerter, ubehag i øret
- øresus
- rødhet i øret
- sykdom i det indre øret (svimmelhet eller følelse av å svive rundt)
- bihuleplager (tette bihuler)
- rødhet i svelget
- kuler i brystet
- kvalme
- influensa
- lavt blodsukker (hypoglykemi)

- unormal pusting (kortpustethet eller pustevansker)
- luft i magen (flatulens)
- kviser (akne)
- kløende hud
- økt kreatinkinase (tegn på muskelnedbrytning) sett i blodprøver

Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

- tette ører
- brystbetennelse
- brystforstørrelse hos menn
- forandringer eller smerter i brystvortene
- hvesende pust
- høyt blodtrykk

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

- leverskade
- økte bilirubinmålinger (leverblodprøve)

Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom

Bivirkninger sett hos barn og ungdom er tilsvarende de som er sett hos voksne. Økte leverenzymmer i blodet ses imidlertid hyppigere hos yngre barn.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via [det nasjonale meldesystemet](#) som beskrevet i [Appendix V](#). Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kalydeco

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, blisterpakningen og flaskeetiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kalydeco

Virkestoff er ivakaftor.

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg ivakaftor.

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg ivakaftor.

Andre innholdsstoffer er:

- Tablettkjerne: mikrokrySTALLinsk cellulose, laktosemonohydrat, hypromelloseacetatsuksinat, krysskarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat (E 487), silika, kolloidal vannfri og magnesiumstearat.
- Tablettfilm-drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol (PEG 3350), talkum, indigokarmin aluminiumslakk (E 132) og karnaubavoks.
- Trykkfarge: skjellakk, svart jernoksid (E 172), propylenglykol (E 1520) og ammoniakkoppløsning, konsentrert.

Se nederst i avsnitt 2 – Kalydeco inneholder laktose og natrium.

Hvordan Kalydeco ser ut og innholdet i pakningen

Kalydeco 75 mg tabletter, filmdrasjerte er lyseblå, kapselformede, 12,7 mm x 6,8 mm og har “V 75” i svart trykk på den ene siden og er blanke på den andre.

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige:

- blisterkortpakning inneholdende 28 tabletter, filmdrasjerte

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte er lyseblå, kapselformede, 16,5 mm x 8,4 mm og har “V 150” i svart trykk på den ene siden og er blanke på den andre.

Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige:

- blisterkortpakning inneholdende 28 tabletter, filmdrasjerte
- blisterpakning inneholdende 56 tabletter, filmdrasjerte
- flaske inneholdende 56 tabletter, filmdrasjerte

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland
Tlf.: +353 (0)1 761 7299

Tilvirker

Almac Pharma Services (Ireland) Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co. Louth
A91 P9KD
Irland

Almac Pharma Services Limited
Seagoe Industrial Estate
Craigavon
Northern Ireland
BT63 5UA
Storbritannia

Millmount Healthcare Limited
Block-7, City North Business Campus
Stamullen
Co. Meath
K32 YD60
Irland

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:

België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarorszag, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom (Northern Ireland)

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Tél/Tel/Тел/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:
+353 (0) 1 761 7299

España

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.
Tel: + 34 91 7892800

Ελλάδα

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία
Τηλ: +30 (211) 2120535

Italia

Vertex Pharmaceuticals
(Italy) S.r.l.
Tel: +39 0697794000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): <https://www.ema.europa.eu> og på nettstedet til www.felleskatalogen.no. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose

Kalydeco 25 mg granulat i dosepose

Kalydeco 50 mg granulat i dosepose

Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose

ivakaftor (ivacaftor)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før barnet ditt begynner å bruke dette legemidlet.

Det inneholder informasjon som er viktig for barnet ditt.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør barnets lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til barnet ditt. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner ditt barns.
- Kontakt barnets lege eller apotek dersom barnet ditt opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Kalydeco er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før barnet ditt bruker Kalydeco
3. Hvordan ditt barn bruker Kalydeco
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Kalydeco
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Kalydeco er og hva det brukes mot

Kalydeco inneholder virkestoffet ivakaftor. Ivakaftor virker på nivået til cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR), et protein som danner en kanal i celleoverflaten hvor partikler som klorid kan forflytte seg inn og ut av cellen. På grunn av mutasjoner i *CFTR*-genet (se nedenfor), er kloridforflytningen redusert hos de med cystisk fibrose (CF). Ivakaftor bidrar til at visse unormale CFTR-proteiner åpnes oftere slik at kloridforflytning inn og ut av cellen bedres.

Kalydeco granulat skal brukes:

- som monoterapi til behandling av spedbarn og barn fra 1 måneds alder, som veier fra 3 kg til mindre enn 25 kg, med cystisk fibrose (CF) som har en *R117H* CFTR-mutasjon eller en av følgende mutasjoner i *CFTR*-genet: *G551D*, *G1244E*, *G1349D*, *G178R*, *G551S*, *S1251N*, *S1255P*, *S549N* eller *S549R*.
- i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor granulat hos pasienter i alderen 2 til 6 år som har CF, med minst én *F508del*-mutasjon i *CFTR*-genet. Ved forskrivning av Kalydeco sammen med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, les pakningsvedlegget for sistnevnte. Det inneholder viktig informasjon om hvordan disse to legemidlene skal tas.

2. Hva du må vite før barnet ditt bruker Kalydeco

Ikke gi barnet ditt Kalydeco

- dersom barnet ditt er allergisk overfor ivakaftor eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med barnets lege før barnet bruker Kalydeco.

- Snakk med barnets lege dersom barnet ditt har leverproblemer eller har hatt det før. Barnets lege vil kanskje måtte justere barnets dose.
- Økte leverenzymer i blodet er sett hos noen personer som har fått Kalydeco (alene eller i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor). Informer barnets lege omgående dersom barnet ditt får noen av disse symptomene, som kan være tegn på leverproblemer:
 - smerter eller ubehag i øvre og høyre del av magen (abdomen)
 - gulning av huden eller det hvite i øynene
 - tap av appetitt
 - kvalme eller oppkast
 - mørk urin
- Barnets lege kommer til å ta noen blodprøver for å sjekke barnets lever før og under behandling, spesielt det første året og særlig dersom blodprøver viste høye leverenzymer tidligere.
- Depresjon (inkludert selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd) har blitt rapportert hos pasienter som brukte Kalydeco. Symptomene oppsto vanligvis i løpet av de tre første behandlingsmånedene, hovedsakelig ved bruk i kombinasjon med tezakaftor/ivakaftor eller ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor. Snakk med lege omgående dersom du (eller noen som tar dette legemidlet) får noen av følgende symptomer: tristhet eller humørforandringer, angst, følelsesmessig ubehag eller tanker om selvskading eller selvmord, som kan være tegn på depresjon.
- Si fra til legen din hvis du har fått beskjed om at barnet ditt har nyreproblemer eller har hatt det før.
- Kalydeco anbefales ikke til pasienter som har gjennomgått en organtransplantasjon.
- Forstyrrelser i øyets linse (grå stær) er sett hos enkelte barn og ungdom under behandling (alene eller i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor). Barnets lege kan foreta noen øyeundersøkelser før og under behandling med ivakaftor.
- Kalydeco bør kun brukes dersom barnet ditt har én av mutasjonene i *CFTR*-genet nevnt i avsnitt 1 (Hva Kalydeco er og hva det brukes mot).

Barn

Gi ikke dette legemidlet til barn under 1 måned da det er ukjent om ivakaftor er sikkert og effektivt hos disse barna.

Gi ikke dette legemidlet i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor til barn under 2 år, da det er ukjent om det er sikkert og effektivt for dem.

Andre legemidler og Kalydeco

Snakk med barnets lege eller apotek dersom barnet ditt bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Noen legemidler kan påvirke hvordan Kalydeco virker, eller gjøre bivirkninger mer sannsynlige. Snakk særlig med barnets lege dersom barnet ditt bruker noen av legemidlene på listen nedenfor. Barnets lege kan bestemme å justere barnets dose eller om det er behov for ekstra oppfølging.

- **Legemidler mot sopp** (brukes til behandling av soppinfeksjoner). Disse inkluderer flukonazol, itraconazol, ketokonazol, posakonazol og vorikonazol.

- **Antibiotika** (brukes til behandling av bakterielle infeksjoner). Disse inkluderer klaritromycin, erytromycin, rifabutin, rifampicin og telitromycin.
- **Antiepileptika** (brukes til behandling av epileptiske anfall eller kramper). Disse inkluderer karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
- **Naturlegemidler**. Disse inkluderer johannesurt (*Hypericum perforatum*).
- **Immunosuppressiva** (brukes etter organtransplantasjon). Disse inkluderer ciklosporin, everolimus, sirolimus og takrolimus.
- **Hjerteglykosider** (brukes til behandling av visse hjertesykdommer). Disse inkluderer digoksin.
- **Antikoagulantia** (brukes til å forebygge at blodpropp dannes). Disse inkluderer warfarin.
- **Legemidler mot diabetes**. Disse inkluderer glimepirid og glipizid.
- **Blodtrykkslegemidler**. Disse inkluderer verapamil.

Inntak av Kalydeco sammen med mat og drikke

Unngå å gi barnet ditt mat eller drikke som inneholder grapefrukt ved behandling da dette kan øke bivirkningene av Kalydeco ved å øke mengden av ivakaftor i barnets kropp.

Kjøring og bruk av maskiner

Kalydeco kan gjøre barnet svimmel. Det anbefales at barnet ditt ikke sykler eller gjør noe annet som krever dets fulle oppmerksomhet dersom barnet er svimmel.

Kalydeco inneholder laktose og natrium

Dersom barnets lege har fortalt deg at barnet ditt har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte barnets lege før barnet ditt tar dette legemidlet.

Kalydeco inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som "natriumfritt".

3. Hvordan ditt barn bruker Kalydeco

Gi alltid barnet ditt dette legemidlet nøyaktig slik barnets lege har fortalt deg. Kontakt barnets lege hvis du er usikker.

Barnets lege vil bestemme riktig dose for barnet ditt. Barnet må fortsette å bruke alle andre legemidler med mindre legen anbefaler å slutte å bruke noen av dem.

Doseringsanbefalinger for Kalydeco er gitt i tabell 1.

Tabell 1: Doseringsanbefalinger

Alder/vekt	Morgendose	Kveldsdose
Kalydeco som monoterapi		
1 måned til under 2 måneder, ≥ 3 kg	Én dosepose på Kalydeco 13,4 mg granulat	Ingen kveldsdose
2 måneder til under 4 måneder, ≥ 3 kg	Én dosepose på Kalydeco 13,4 mg granulat	Én dosepose på Kalydeco 13,4 mg granulat
4 måneder til under 6 måneder, ≥ 5 kg	Én dosepose på Kalydeco 25 mg granulat	Én dosepose på Kalydeco 25 mg granulat
6 måneder og eldre, ≥ 5 kg til < 7 kg	Én dosepose Kalydeco på 25 mg granulat	Én dosepose Kalydeco på 25 mg granulat
6 måneder og eldre, ≥ 7 kg til < 14 kg	Én dosepose Kalydeco på 50 mg granulat	Én dosepose Kalydeco på 50 mg granulat
6 måneder og eldre, ≥ 14 kg til < 25 kg	Én dosepose Kalydeco på 75 mg granulat	Én dosepose Kalydeco på 75 mg granulat

Alder/vekt	Morgendose	Kveldsdose
Kalydeco som monoterapi		
6 måneder og eldre, ≥ 25 kg	Se pakningsvedlegg for Kalydeco tabletter	
Kalydeco i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor		
2 år til under 6 år, 10 kg til < 14 kg	En dosepose ivakaftor 60 mg/tezakaftor 40 mg/eleksakaftor 80 mg granulat	En dosepose på Kalydeco 59,5 mg granulat
2 år til under 6 år, ≥ 14 kg	En dosepose ivakaftor 75 mg/tezakaftor 50 mg/eleksakaftor 100 mg granulat	En dosepose på Kalydeco 75 mg granulat

Du skal gi barnet ditt morgen- og kveldsdosen med granulat med omtrent 12 timers mellomrom.

Hvis barnet ditt har leverproblemer, kan det bli nødvendig for legen å redusere dosen med Kalydeco fordi barnets lever ikke vil fjerne legemidlet like fort som hos barn med normal leverfunksjon.

- **Moderate leverproblemer hos barn fra 6 måneders alder:** dosen kan bli redusert til halvparten av dosen angitt i tabellen ovenfor, det vil si én dosepose daglig.
- **Alvorlige leverproblemer hos barn fra 6 måneders alder:** bruk er ikke anbefalt, men barnets lege vil beslutte om det er hensiktsmessig for barnet ditt å bruke dette legemidlet. I så fall må dosen (angitt i tabellen ovenfor) reduseres til én dosepose annenhver dag.
- **Leverproblemer hos barn i alderen 1 måned til 6 måneder:** bruk er ikke anbefalt.

Kalydeco skal inntas via munnen.

Hver dosepose er kun til engangsbruk.

Slik gir du Kalydeco til barnet ditt:

- Hold doseposen med granulat med klippestreken opp.
- Rist doseposen forsiktig til innholdet legger seg.
- Riv eller klipp opp doseposen langs klippestreken.
- Bland hele innholdet i en dosepose med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske. Maten eller væsken bør holde romtemperatur eller lavere. Noen eksempler på alderstilpasset myk mat eller væske er frukt- eller grønnsakspuré, yoghurt, eplesaus, vann, melk, morsmelk, morsmelkerstatning og juice.
- Gi produktet til barnet ditt umiddelbart etter at det er blandet. Dersom dette ikke er mulig, gir du det innen én time etter blanding. Sørg for at blandingen inntas i sin helhet og umiddelbart.
- Et fettholdig måltid eller mellommåltid bør gis til barnet ditt like før eller like etter dosering (noen eksempler gis nedenfor).

Måltider og mellommåltider som inneholder fett, omfatter de som tilberedes med smør eller oljer eller som inneholder egg. Annen fettholdig mat er:

- ost, helmelk, meieriprodukter basert på helmelk, yoghurt, morsmelk, morsmelkerstatning, sjokolade
- kjøtt, fet fisk
- avocado, hummus, soyabaserte produkter (tofu)
- nøtter, fettholdige energibarar eller -drikker

Dersom barnet ditt tar for mye av Kalydeco

Barnet ditt kan få bivirkninger, inkludert de som er nevnt i avsnitt 4 nedenfor. Snakk i så fall med barnets lege eller apotek. Ta med deg barnets legemiddel og dette pakningsvedlegget hvis mulig.

Dersom du har glemt å gi barnet ditt Kalydeco

Gi den glemte dosen dersom det har gått mindre enn 6 timer fra tidspunktet du glemte å gi barnet dosen. Vent ellers til neste planlagte dose slik du vanligvis ville gjort. Du skal ikke gi barnet ditt dobbel dose som erstatning for en glemte dose.

Dersom du avbryter barnets behandling med Kalydeco

Gi Kalydeco til barnet ditt så lenge som barnets lege anbefaler. Ikke avbryt behandlingen med mindre barnets lege anbefaler at du gjør det. Spør barnets lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

Magesmerter (abdominalsmarter) og økte leverenzymer i blodet.

Mulige tegn på leverproblemer

Økte leverenzymer i blodet er vanlig hos pasienter med CF og har også blitt rapportert hos pasienter som tar Kalydeco alene eller i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor.

Hos pasienter som tar Kalydeco i kombinasjon med ivakaftor/tezakaftor/eleksakaftor, har leverskade og forverring av leverfunksjonen blitt rapportert hos personer med alvorlig leversykdom. Forverring av leverfunksjonen kan være alvorlig og kreve transplantasjon.

Det kan være tegn på leverproblemer:

- smerte eller ubehag i øvre høyre del av magen (abdomen)
- gulning av huden eller det hvite i øynene
- redusert appetitt
- kvalme eller oppkast
- mørk urin

Depresjon

Symptomer på dette omfatter tristhet eller humørforandringer, angst, følelsesmessig ubehag.

Informér barnets lege omgående dersom han/hun får noen av disse symptomene.

Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

- øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse), inkludert sår hals og tett nese
- hodepine
- svimmelhet
- diaré
- magesmerter
- endringer i bakterietyper i slim
- økte leverenzymer (tegn på leverbelastning)
- utslett

Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

- rennende nese
- øresmerter, ubehag i øret
- øresus
- rødhet i øret
- sykdom i det indre øret (svimmelhet eller følelse av å svive rundt)
- bihuleplager (tette bihuler)

- rødhet i svelget
- kuler i brystet
- kvalme
- influensa
- lavt blodsukker (hypoglykemi)
- unormal pusting (kortpustethet eller pustevansker)
- luft i magen (flatulens)
- kviser (akne)
- kløende hud
- økt kreatinkinase (tegn på muskelnedbrytning) sett i blodprøver

Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

- tette ører
- brystbetennelse
- brystforstørrelse hos menn
- forandringer eller smerter i brystvortene
- hvesende pust
- høyt blodtrykk

Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

- leverskade
- økte bilirubinmålinger (leverblodprøve)

Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom

Bivirkninger sett hos barn og ungdom er tilsvarende de som er sett hos voksne. Økte leverenzymmer i blodet ses imidlertid hyppigere hos yngre barn.

Melding av bivirkninger

Kontakt barnets lege eller apotek dersom barnet ditt opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via [det nasjonale meldesystemet](#) som beskrevet i [Appendix V](#). Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Kalydeco

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, lommen og doseposen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Det er vist at blandingen er stabil i én time.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Kalydeco

Virkestoff er ivakaftor.

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose:

Hver dosepose inneholder 13,4 mg ivakaftor.

Kalydeco 25 mg granulat i dosepose:

Hver dosepose inneholder 25 mg ivakaftor.

Kalydeco 50 mg granulat i dosepose:

Hver dosepose inneholder 50 mg ivakaftor.

Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose:

Hver dosepose inneholder 59,5 mg ivakaftor.

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose:

Hver dosepose inneholder 75 mg ivakaftor.

Andre innholdsstoffer er: silika, kolloidal vannfri, krysskarmellosenatrium, hypromelloseacetatsuksinat, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, mannitol, sukralose og natrumlaurylsulfat (E 487).

Se nederst i avsnitt 2 - Kalydeco inneholder laktose og natrium.

Hvordan Kalydeco ser ut og innholdet i pakningen

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose er et hvitt til offwhite granulat

Kalydeco 25 mg granulat i dosepose er et hvitt til offwhite granulat

Kalydeco 50 mg granulat i dosepose er et hvitt til offwhite granulat

Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose er et hvitt til offwhite granulat

Kalydeco 75 mg granulat i dosepose er et hvitt til offwhite granulat

Granulatet leveres i doseposer.

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose, Kalydeco 25 mg granulat i dosepose, Kalydeco 50 mg granulat i dosepose og Kalydeco 75 mg granulat i dosepose:

Pakningsstørrelse på 56 doseposer (inneholder 4 enkeltlommer med 14 doseposer per lomme)

Kalydeco 13,4 mg granulat i dosepose, Kalydeco 59,5 mg granulat i dosepose og Kalydeco 75 mg granulat i dosepose:

Pakningsstørrelse på 28 doseposer (inneholder 4 enkeltlommer med 7 doseposer per lomme)

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,
Dublin 9, D09 T665,
Irland
Tlf.: +353 (0)1 761 7299

Tilvirker

Almac Pharma Services (Ireland) Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co. Louth
A91 P9KD
Irland

Almac Pharma Services Limited
Seagoe Industrial Estate
Craigavon
Northern Ireland
BT63 5UA
Storbritannia

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:

België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarorszag, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom (Northern Ireland)

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Tél/Tel/Тел/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:
+353 (0) 1 761 7299

Ελλάδα

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρία
Τηλ: +30 (211) 2120535

España

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.
Tel: + 34 91 7892800

Italia

Vertex Pharmaceuticals
(Italy) S.r.l.
Tel: +39 0697794000

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): <https://www.ema.europa.eu/> og på nettstedet til www.felleskatalogen.no. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

