

## **1. LEGEMIDLETS NAVN**

Dabigatran etexilate Sandoz 110 mg harde kapsler

## **2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING**

Hver harde kapsel inneholder 110 mg dabigatraneteksilat (som mesilat).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

## **3. LEGEMIDDELFORM**

Kapsel, hard

Kapsel i størrelse '1' med hvit, ugjennomsiktig topp påtrykt 'MD' og hvit, ugjennomsiktig bunn påtrykt '110' i sort blekk, som inneholder en blanding av hvite til lysegule pellets og lysegult granulat.

Dimensjoner: ca. 19,8 mm x 6,9 mm.

## **4. KLINISKE OPPLYSNINGER**

### **4.1 Indikasjoner**

Primær forebyggelse av venøse tromboemboliske hendelser (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.

Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder  $\geq 75$  år, hjertesvikt (NYHA klasse  $\geq$  II), diabetes mellitus, hypertensjon.

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne pasienter.

Behandling av VTE og forebyggelse av residiverende VTE hos pediatriske pasienter fra fødsel opptil 18 år.

Se pkt. 4.2 for alderstilpassede doseringsformer.

### **4.2 Dosering og administrasjonsmåte**

#### Dosering

Dabigatran etexilate Sandoz kapsler kan brukes til voksne og pediatriske pasienter i alderen 8 år eller eldre, som er i stand til å svelge kapslene hele.

Dabigatraneteksilat drasjert granulat kan brukes til barn under 12 år så snart barnet er i stand til å svelge myk mat. Dabigatraneteksilat pulver og væske til mikstur, oppløsning skal kun gis til barn under 1 år.

Dabigatran etexilate Sandoz er kun tilgjengelig som harde kapsler. For pediatriske pasienter under 8 år henvises det til andre legemidler.

Når det byttes mellom formuleringer, kan det hende at dosen må endres.

Dosen som er angitt i den aktuelle doseringstabellen for en formulering, skal foreskrives basert på barnets vekt og alder.

### **Primær forebyggelse av VTE ved ortopedisk kirurgi**

Anbefalte doser av dabigatraneteksilat og behandlingsvarighet for primær forebyggelse av venøs tromboembolisme ved ortopedisk kirurgi er vist i tabell 1.

**Tabell 1: Doseringsanbefalinger og behandlingsvarighet for primær forebyggelse av VTE ved ortopedisk kirurgi**

|                                                                                     | Behandlingsstart på operasjonsdagen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep | Vedlikeholdsdose med oppstart på første dag etter kirurgisk inngrep   | Varighet for vedlikeholdsdose                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pasienter som har gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi                             | én enkelt kapsel med 110 mg dabigatraneteksilat                                 | 220 mg dabigatraneteksilat én gang daglig tatt som 2 kapsler à 110 mg | 10 dager                                                             |
| Pasienter som har gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi                           |                                                                                 |                                                                       | 28-35 dager                                                          |
| <u><b>Dosereduksjon anbefales</b></u>                                               |                                                                                 |                                                                       |                                                                      |
| Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance (CrCL) 30-50 ml/min) | én enkelt kapsel med 75 mg dabigatraneteksilat                                  | 150 mg dabigatraneteksilat én gang daglig tatt som 2 kapsler à 75 mg  | 10 dager (kneprotesekirurgi) eller 28-35 dager (hofteprotesekirurgi) |
| Pasienter som får samtidig behandling med verapamil*, amiodaron, kinidin            |                                                                                 |                                                                       |                                                                      |
| Pasienter som er 75 år eller eldre                                                  |                                                                                 |                                                                       |                                                                      |

\*For pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon som samtidig behandles med verapamil, se avsnittet «Spesielle populasjoner»

For begge typer kirurgi bør start av behandlingen utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startet samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler én gang daglig.

### **Undersøkelse av nyrefunksjon før og under behandling med dabigatraneteksilat**

Hos alle pasienter og spesielt hos eldre (> 75 år) da nedsatt nyrefunksjon kan forekomme hyppig i denne aldersgruppen:

- Før behandling med dabigatraneteksilat startes, må nyrefunksjonen undersøkes ved å beregne kreatininclearance (CrCL) for å utelukke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).
- Nyrefunksjonen må også undersøkes ved mistanke om nedsatt nyrefunksjon under behandlingen (f.eks. hypovolemi, dehydrering og ved samtidig bruk av enkelte legemidler).

Metoden som skal brukes til å estimere nyrefunksjon (CrCL i ml/min) er Cockcroft-Gault-metoden.

### Glemt dose

Det anbefales å fortsette med de gjenværende daglige dosene av dabigatraneteksilat på samme tidspunkt neste dag. Ved glemt dose skal det ikke tas dobbel dose.

### Seponering av dabigatraneteksilat

Seponering av dabigatraneteksilatbehandling må ikke skje uten medisinsk rådgivning. Pasienter må oppfordres til å kontakte behandlende lege dersom de utvikler gastrointestinale symptomer som dyspepsi (se pkt. 4.8).

### Bytte

#### *Fra dabigatraneteksilatbehandling til parenteralt antikoagulantium:*

Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til et parenteralt antikoagulantium (se pkt. 4.5).

#### *Fra parenteralt antikoagulantium til dabigatraneteksilat:*

Det parenterale antikoagulantiumet bør seponeres og dabigatraneteksilat bør startes 0-2 timer før neste dose av alternativ behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

### Spesielle populasjoner

#### *Nedsatt nyrefunksjon*

Dabigatraneteksilat er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3).

Hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL 30-50 ml/min), er dosereduksjon anbefalt (se tabell 1 ovenfor og pkt. 4.4 og 5.1).

#### *Samtidig bruk av dabigatraneteksilat og svake til moderate P-glykoprotein (P-gp)-hemmere, dvs. amiodaron, kinidin eller verapamil*

Doseringen bør reduseres som vist i tabell 1 (se også pkt. 4.4 og 4.5). I dette tilfellet skal dabigatraneteksilat og disse legemidlene tas på samme tidspunkt.

Hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon som samtidig behandles med verapamil, bør det vurderes å redusere dabigatraneteksilatdosen til 75 mg daglig (se pkt. 4.4 og 4.5).

### *Eldre*

For eldre pasienter > 75 år er dosereduksjon anbefalt (se tabell 1 ovenfor og pkt. 4.4 og 5.1).

### *Kroppsvekt*

Det er svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter med kroppsvekt < 50 kg eller > 110 kg. På bakgrunn av tilgjengelige kliniske og kinetiske data er dosejustering ikke nødvendig (se pkt. 5.2), men nøye klinisk overvåkning anbefales (se pkt. 4.4).

### *Kjønn*

Ingen dosejustering er nødvendig (se pkt. 5.2).

### *Pediatrisk populasjon*

Det er ikke relevant å bruke dabigatraneteksilat i den pediatriske populasjonen ved indikasjonen primær forebyggelse av venøse tromboemboliske hendelser hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.

### **Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer (SPAF)**

### **Behandling av DVT og LE og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne (DVT/LE)**

Anbefalte doser av dabigatraneteksilat ved indikasjonene SPAF, DVT og LE er vist i tabell 2.

**Tabell 2: Doseringsanbefalinger for SPAF, DVT og LE**

|                                                                                                                                                 | <b>Doseringsanbefalinger</b>                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer (SPAF) | 300 mg dabigatraneteksilat tatt som én kapsel à 150 mg to ganger daglig                                                                      |
| Behandling av DVT og LE og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne (DVT/LE)                                                          | 300 mg dabigatraneteksilat tatt som én kapsel à 150 mg to ganger daglig etter behandling med et parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager |
| <b><u>Dosereduksjon anbefales</u></b>                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Pasienter $\geq$ 80 år                                                                                                                          | daglig dose på 220 mg dabigatraneteksilat tatt som én kapsel à 110 mg to ganger daglig                                                       |
| Pasienter som samtidig får verapamil                                                                                                            |                                                                                                                                              |
| <b><u>Dosereduksjon bør vurderes</u></b>                                                                                                        |                                                                                                                                              |

|                                                                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasienter 75-80 år                                                    | daglig dose med dabigatraneteksilat 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning |
| Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL 30-50 ml/min)        |                                                                                                                                              |
| Pasienter med gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom |                                                                                                                                              |
| Andre pasienter med økt blødningsrisiko                               |                                                                                                                                              |

Ved DVT/LE er anbefalingen om bruk av 220 mg dabigatraneteksilat tatt som én kapsel à 110 mg to ganger daglig basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser og har ikke vært undersøkt i denne kliniske sammenheng. Se nedenfor og pkt. 4.4, 4.5, 5.1 og 5.2.

Ved intoleranse overfor dabigatraneteksilat må pasientene umiddelbart ta kontakt med behandlende lege for å bytte til alternative akseptable behandlingsmetoder for forebyggelse av slag og systemisk embolisme assosiert med atrieflimmer eller for DVT/LE.

#### Undersøkelse av nyrefunksjon før og under behandling med dabigatraneteksilat

Hos alle pasienter og spesielt hos eldre (> 75 år) da nedsatt nyrefunksjon kan forekomme hyppig i denne aldersgruppen:

- Før behandling med dabigatraneteksilat startes, må nyrefunksjonen undersøkes ved å beregne kreatininclearance (CrCL) for å utelukke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).
- Nyrefunksjonen må også undersøkes ved mistanke om nedsatt nyrefunksjon under behandlingen (f.eks. hypovolemi, dehydrering og ved samtidig bruk av enkelte legemidler).

Ytterligere krav hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter over 75 år:

- Under behandlingen med dabigatraneteksilat bør nyrefunksjonen undersøkes minst én gang årlig, eller hyppigere etter behov, i visse kliniske situasjoner der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og ved samtidig bruk av enkelte legemidler).

Metoden som skal brukes til å estimere nyrefunksjon (CrCL i ml/min) er Cockcroft-Gault-metoden.

#### Behandlingsvarighet

Behandlingsvarighet for dabigatraneteksilat ved indikasjonene forebyggelse av slag og systemisk embolisme, DVT og LE er vist i tabell 3.

**Tabell 3: Behandlingsvarighet ved forebyggelse av slag og systemisk embolisme, DVT og LE**

| Indikasjon                                                                 | Behandlingsvarighet                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer | Behandlingen bør fortsette som langtidsbehandling. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVT/LE | Behandlingens varighet bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytten av behandlingen veid opp mot risiko for blødning (se pkt. 4.4).<br>Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig kirurgisk inngrep, traume, immobilisering) og lengre behandlingsvarighet bør baseres på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Glemt dose

En glemt dabigatraneteksilatdose kan tas opptil 6 timer før neste planlagte dose. Fra 6 timer og frem til neste planlagte dose skal den glemte dosen utelates.

Ved glemt dose skal det ikke tas dobbel dose.

### Seponering av dabigatraneteksilat

Seponering av dabigatraneteksilatbehandling må ikke skje uten medisinsk rådgivning. Pasienter må oppfordres til å kontakte behandlende lege dersom de utvikler gastrointestinale symptomer som dyspepsi (se pkt. 4.8).

### Bytte

#### *Fra dabigatraneteksilatbehandling til parenteralt antikoagulantium:*

Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til et parenteralt antikoagulantium (se pkt. 4.5).

#### *Fra parenteralt antikoagulantium til dabigatraneteksilat:*

Det parenterale antikoagulantiumet bør seponeres og dabigatraneteksilat bør startes 0-2 timer før neste dose av alternativ behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

#### *Fra dabigatraneteksilat til vitamin K-antagonist (VKA):*

Tidspunktet for start av VKA basert på CrCL bør tilpasses på følgende måte:

- CrCL  $\geq$  50 ml/min, VKA bør startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat
- CrCL  $\geq$  30- < 50 ml/min, VKA bør startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat

Siden dabigatraneteksilat kan påvirke internasjonal normalisert ratio (INR), vil INR bedre reflektere effekt av VKA først etter at dabigatraneteksilat har vært seponert i minst 2 dager. Inntil da bør INR tolkes med forsiktighet.

#### *Fra VKA til dabigatraneteksilat:*

VKA bør stoppes. Dabigatraneteksilat kan gis når INR er < 2,0.

### Konvertering av atrieflimmer (forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer)

Pasienter kan fortsette behandling med dabigatraneteksilat i forbindelse med konvertering av atrieflimmer.

### Kateterablasjon for atrieflimmer (forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer)

Det er ingen tilgjengelige data for 110 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) med stenting (forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer)

Pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som får utført PCI med stenting, kan behandles med dabigatraneteksilat i kombinasjon med platehemmere etter at hemostase er oppnådd (se pkt. 5.1).

Spesielle populasjoner

*Eldre*

Se tabell 2 ovenfor for doseendringer i denne populasjonen.

*Pasienter med blødningsrisiko*

Pasienter med økt blødningsrisiko (se pkt. 4.4, 4.5, 5.1 og 5.2) bør få nøye klinisk oppfølging (for tegn på blødning eller anemi), og dosejusteringer kan gjøres individuelt etter legens skjønn og ut ifra en avveining av fordeler og ulemper hos den enkelte (se tabell 2 ovenfor). En koagulasjonstest (se pkt. 4.4) kan være til hjelp for identifisering av pasienter med økt blødningsrisiko grunnet for høy dabigatraneksponering, og for denne pasientgruppen anbefales en redusert dose på 220 mg tatt som én kapsel à 110 mg to ganger daglig. Ved klinisk relevant blødning bør behandlingen avbrytes.

Dosereduksjon bør overveies hos pasienter med gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom grunnet økt risiko for større gastrointestinale blødninger (se tabell 2 ovenfor og pkt. 4.4).

*Nedsatt nyrefunksjon*

Dabigatraneteksilat er kontraindisert hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCL < 30 ml/min) (se pkt. 4.3).

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon (CrCL 50- ≤ 80 ml/min). For pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL 30-50 ml/min) er anbefalt dosering med dabigatraneteksilat også 300 mg tatt som én kapsel à 150 mg to ganger daglig. For pasienter med høy blødningsrisiko bør det imidlertid overveies å redusere dabigatraneteksilatdosen til 220 mg tatt som én kapsel à 110 mg to ganger daglig (se pkt. 4.4 og 5.2). Nøye klinisk overvåkning anbefales hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

*Samtidig bruk av dabigatraneteksilat og svake til moderate P-glykoprotein (P-gp)-hemmere, dvs. amiodaron, kinidin eller verapamil*

Dosejusteringer er ikke nødvendig ved samtidig bruk av amiodaron eller kinidin (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2).

Dosereduksjon anbefales for pasienter som får samtidig behandling med verapamil (se tabell 2 ovenfor og pkt. 4.4 og 4.5). I dette tilfellet skal dabigatraneteksilat og verapamil tas på samme tidspunkt.

*Kroppsvekt*

Ingen dosejustering er nødvendig (se pkt. 5.2), men nøye klinisk overvåkning anbefales hos pasienter med kroppsvekt < 50 kg (se pkt. 4.4).

### Kjønn

Ingen dosejustering er nødvendig (se pkt. 5.2).

### Pediatrisk populasjon

Det er ikke relevant å bruke dabigatraneteksilat i den pediatriske populasjonen ved indikasjonen forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.

### **Behandling av VTE og forebygging av residiverende VTE hos pediatriske pasienter**

Ved behandling av VTE hos pediatriske pasienter skal behandlingen initieres etter behandling med et parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Ved forebygging av residiverende VTE skal behandlingen initieres etter tidligere behandling.

**Dabigatraneteksilat kapsler skal tas to ganger daglig**, én dose om morgenen og én dose om kvelden, til omtrent samme tid hver dag. Doseringsintervallet bør være så nær 12 timer som mulig.

Den anbefalte dosen av dabigatraneteksilat kapsler er basert på pasientens vekt og alder, som vist i tabell 4. Dosen skal justeres i henhold til vekt og alder i løpet av behandlingen.

Ingen doseringsanbefalinger kan gis for kombinasjoner av vekt og alder som ikke er angitt i doseringstabellen.

**Tabell 4: Enkeltdose og total daglig dose med dabigatraneteksilat i milligram (mg), etter pasientens vekt oppgitt i kilo (kg) og alder oppgitt i år**

| Kombinasjoner av vekt og alder |            | Enkeltdose<br>i mg | Total daglig dose<br>i mg |
|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Vekt i kg                      | Alder i år |                    |                           |
| 11 til <13                     | 8 til <9   | 75                 | 150                       |
| 13 til <16                     | 8 til <11  | 110                | 220                       |
| 16 til <21                     | 8 til <14  | 110                | 220                       |
| 21 til <26                     | 8 til <16  | 150                | 300                       |
| 26 til <31                     | 8 til <18  | 150                | 300                       |
| 31 til <41                     | 8 til <18  | 185                | 370                       |
| 41 til <51                     | 8 til <18  | 220                | 440                       |
| 51 til <61                     | 8 til <18  | 260                | 520                       |
| 61 til <71                     | 8 til <18  | 300                | 600                       |
| 71 til <81                     | 8 til <18  | 300                | 600                       |
| >81                            | 10 til <18 | 300                | 600                       |

Enkeltdoser som krever kombinasjoner av mer enn én kapsel:

300 mg: to 150 mg kapsler eller  
fire 75 mg kapsler

260 mg: én 110 mg pluss én 150 mg kapsel eller  
én 110 mg pluss to 75 mg kapsler

220 mg: to 110 mg kapsler

185 mg: én 75 mg pluss én 110 mg kapsel



150 mg:       én 150 mg kapsel eller  
                  to 75 mg kapsler

#### Undersøkelse av nyrefunksjon før og under behandling

Før initiering av behandlingen bør den estimerte glomerulære filtrasjonsraten (eGFR) beregnes ved hjelp av Schwartz-formelen (metoden som brukes ved kreatininvurdering, skal sjekkes med et laboratorium).

Dabigatraneteksilat er kontraindisert hos pediatriske pasienter med  $eGFR < 50 \text{ ml/min/1,73 m}^2$  (se pkt. 4.3).

Pasienter med  $eGFR \geq 50 \text{ ml/min/1,73 m}^2$  bør behandles med dosen angitt i tabell 4.

Under behandlingen bør nyrefunksjonen vurderes i visse kliniske situasjoner der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og ved samtidig bruk av enkelte legemidler osv.).

#### Behandlingsvarighet

Behandlingens varighet bør bestemmes individuelt basert på en nytte-/risikovurdering.

#### Glemt dose

En glemt dabigatraneteksilatdose kan tas opptil 6 timer før neste planlagte dose. Fra 6 timer og frem til neste planlagte dose skal den glemte dosen utelates. Det må aldri tas dobbel dose som erstatning for glemte enkeltdoser.

#### Seponering av dabigatraneteksilat

Seponering av dabigatraneteksilatbehandling må ikke skje uten medisinsk rådgivning. Pasienter eller deres omsorgspersoner må oppfordres til å kontakte behandlende lege dersom pasienten utvikler gastrointestinale symptomer som dyspepsi (se pkt. 4.8).

#### Bytte

##### *Fra dabigatraneteksilatbehandling til parenteralt antikoagulantium:*

Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til et parenteralt antikoagulantium (se pkt. 4.5).

##### *Fra parenteralt antikoagulantium til dabigatraneteksilat:*

Det parenterale antikoagulantiumet bør seponeres og dabigatraneteksilat bør startes 0-2 timer før neste dose av alternativ behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin (UFH)) (se pkt. 4.5).

##### *Fra dabigatraneteksilat til vitamin K-antagonist (VKA):*

Pasienter bør starte med VKA 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat.

Siden dabigatraneteksilat kan påvirke internasjonal normalisert ratio (INR), vil INR bedre reflektere effekt av VKA først etter at dabigatraneteksilat har vært seponert i minst 2 dager. Inntil da bør INR tolkes med forsiktighet.

##### *Fra VKA til dabigatraneteksilat:*

VKA bør stoppes. Dabigatraneteksilat kan gis når INR er  $< 2,0$ .

## Administrasjonsmåte

Dette legemidlet er til oral bruk.

Kapslene kan tas med eller uten mat. Kapslene skal svelges hele sammen med et glass vann for å lette levering til magen.

Pasientene bør informeres om ikke å åpne kapslene da dette kan gi økt blødningsrisiko (se pkt. 5.2 og 6.6).

Det finnes andre alderstilpassede doseringsformer for behandling av pediatriske pasienter under 8 år eller pasienter som har problemer med å svelge eller ikke vet hvordan de skal svelge kapslene, f.eks.:

- Dabigatraneteksilat drasjert granulat som kan brukes til barn under 12 år så snart barnet er i stand til å svelge myk mat.
- Dabigatraneteksilat pulver og væske til mikstur, oppløsning som kun skal gis til barn under 1 år.

### **4.3 Kontraindikasjoner**

- Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1
- Alvorlig nedsatt nyrefunksjon ( $\text{CrCL} < 30 \text{ ml/min}$ ) hos voksne pasienter
- $\text{eGFR} < 50 \text{ ml/min/1,73 m}^2$  hos pediatriske pasienter
- Aktiv, klinisk signifikant blødning
- Skade eller tilstand som vurderes å utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere eksisterende eller nylig gastrointestinalsår, forekomst av maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig hjerne- eller spinalskade, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofageale varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter
- Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin osv.), heparinderivater (fondaparinux osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apiksaban osv.) unntatt ved spesielle omstendigheter. Dette omfatter bytte av antikoagulasjonsbehandling (se pkt. 4.2) når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie åpent eller når UFH gis under kateterablasjon for atrieflimmer (se pkt. 4.5).
- Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å ha innvirkning på overlevelse
- Samtidig behandling med følgende sterke P-gp-hemmere: systemisk ketokonazol, ciklosporin, itraconazol, dronedaron og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir (se pkt. 4.5)
- Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjonsbehandling (se pkt. 5.1).

### **4.4 Advarsler og forsiktighetsregler**

#### Blødningsrisiko

Dabigatraneteksilat bør brukes med forsiktighet ved tilstander som har økt risiko for blødning eller ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen ved å hemme plateaggregasjonen. Ved behandling kan blødning oppstå hvor som helst i kroppen. Ved uforklarlige fall i hemoglobin og/eller hematokrit eller blodtrykk bør det foretas undersøkelser for å avdekke et eventuelt blødningssted.

Ved situasjoner med livstruende eller ukontrollert blødning, når rask reversering av dabigatrans antikoagulasjonseffekt er påkrevd, er det spesifikke reverserende midlet idarusizumab tilgjengelig for voksne

pasienter. Effekt og sikkerhet av idarusizumab har ikke blitt fastslått hos pediatriske pasienter. Hemodialyse kan fjerne dabigatran. Andre mulige alternativer for voksne pasienter er ferskt fullblod eller fersk frossen plasma, koagulasjonsfaktorkonsentrater (aktiverte eller ikke-aktiverte), rekombinant koagulasjonsfaktor VIIa eller blodplatekonsentrater (se også pkt. 4.9).

I kliniske studier var dabigatraneteksilat assosiert med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger. En økt risiko ble sett hos eldre ( $\geq 75$  år) for doseringsregimet med 150 mg to ganger daglig. Ytterligere risikofaktorer (se også tabell 5) omfatter samtidig behandling med plateaggregasjonshekkere som klopidoarel og acetylsalisylsyre (ASA) eller ikke-steroider antiinflammatoriske midler (NSAID), samt tilstedeværelse av øsofagitt, gastritt eller gastroøsofageal refluksykdom.

### Risikofaktorer

Tabell 5 gir en oversikt over faktorer som kan gi økt blødningsrisiko.

**Tabell 5: Faktorer som kan gi økt blødningsrisiko**

|                                                       | Risikofaktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farmakodynamiske og -kinetiske faktorer               | Alder $\geq 75$ år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faktorer som øker plasmakonsentrasjonen av dabigatran | <p><u>I stor grad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moderat nedsatt nyrefunksjon hos voksne pasienter (30-50 ml/min CrCL)</li> <li>• sterke P-gp-hekkere (se pkt. 4.3 og 4.5)</li> <li>• samtidig behandling med svake til moderate P-gp-hekkere (f.eks. amiodaron, verapamil, kinidin og tikagrelor, se pkt. 4.5)</li> </ul> <p><u>I mindre grad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav kroppsvekt (&lt; 50 kg) hos voksne pasienter</li> </ul> |
| Farmakodynamiske interaksjoner (se pkt. 4.5)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASA og andre plateaggregasjonshekkere, som f.eks. klopidoarel</li> <li>• NSAID-er</li> <li>• SSRI-er eller SNRI-er</li> <li>• andre legemidler som kan svekke hemostasen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sykdommer/prosedyrer med spesiell blødningsrisiko     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser</li> <li>• trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter</li> <li>• nylig biopsi eller større traumer</li> <li>• bakteriell endokarditt</li> <li>• øsofagitt, gastritt eller gastroøsofageal refluksykdom</li> </ul>                                                                                                                                                          |

Begrensede data er tilgjengelig for voksne pasienter < 50 kg (se pkt. 5.2).

Samtidig bruk av dabigatraneteksilat og P-gp-hemmer har ikke blitt undersøkt hos pediatrike pasienter, men kan øke blødningsrisikoen (se pkt. 4.5).

#### Forholdsregler og håndtering av blødningsrisikoen

For håndtering av blødningskomplikasjoner, se også pkt. 4.9.

#### *Nytte-/risikovurdering*

Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAID-er, platehemmere, SSRI-er og SNRI-er, se pkt. 4.5), som kan øke risikoen for større blødninger signifikant, krever nøye nytte-/risikovurdering. Dabigatraneteksilat skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen.

Begrensede data er tilgjengelig for pediatrike pasienter med risikofaktorer, inkludert pasienter med aktiv meningitt, encefalitt og intrakraniell abscess (se pkt. 5.1). Hos disse pasientene skal dabigatraneteksilat kun gis hvis de forventede fordelene oppveier blødningsrisikoen.

#### *Nøye klinisk overvåkning*

Nøye observasjon for å se etter tegn til blødning eller anemi anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved flere risikofaktorer (se tabell 5 ovenfor). Det bør utvises spesiell forsiktighet når dabigatraneteksilat administreres samtidig med verapamil, amiodaron, kinidin eller klaritromycin (P-gp-hemmere) og spesielt ved forekomst av blødning, særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon (se pkt. 4.5).

Nøye observasjon for å se etter tegn til blødning anbefales hos pasienter som samtidig behandles med NSAID-er (se pkt. 4.5).

#### *Seponering av dabigatraneteksilat*

Pasienter som utvikler akutt nyresvikt, må seponere dabigatraneteksilat (se også pkt. 4.3).

Hvis det oppstår alvorlige blødninger, må behandlingen seponeres, årsaken til blødningen undersøkes og bruk av det spesifikke reverserende midlet idarusizumab kan vurderes hos voksne pasienter. Effekt og sikkerhet av idarusizumab har ikke blitt fastslått hos pediatrike pasienter. Hemodialyse kan fjerne dabigatran.

#### *Bruk av protonpumpehemmere*

Administrering av en protonpumpehemmer (PPI) kan vurderes for å forebygge gastrointestinal blødning. Ved behandling av pediatrike pasienter må lokale anbefalinger for protonpumpehemmere følges.

#### *Laboratorieparametre for koagulasjon*

Selv om det vanligvis ikke er nødvendig med rutinemessig monitorering av antikoagulasjon ved bruk av dette legemidlet, kan imidlertid måling av antikoagulasjonseffekten av dabigatran være nyttig for å avdekke for høy eksponering av dabigatran i nærvær av ytterligere risikofaktorer.

Fortynnet trombotest (dTT), «ecarin clotting time» (ECT) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) kan gi nyttig informasjon, men resultatene bør tolkes med forsiktighet på grunn av variabilitet mellom testene (se

pkt. 5.1). Internasjonal normalisert ratio (INR) er upålitelig hos pasienter behandlet med dabigatraneteksilat, og falske positive forhøyede INR-verdier er blitt rapportert. Måling av INR bør derfor ikke utføres.

Tabell 6 viser terskelverdier av koagulasjonstester målt rett før neste dose hos voksne pasienter, som kan være assosiert med økt blødningsrisiko. Tilsvarende terskelverdier hos pediatriske pasienter er ikke kjent (se pkt. 5.1).

**Tabell 6: Terskelverdier av koagulasjonstester målt rett før neste dose hos voksne pasienter, som kan være assosiert med økt blødningsrisiko**

| Test (rett før neste dose)        | Indikasjon                                        |                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   | Primær forebyggelse av VTE ved ortopedisk kirurgi | Forebyggelse av slag og systemisk embolisme, DVT og LE |
| dTT [ng/ml]                       | > 67                                              | > 200                                                  |
| ECT [x ganger øvre normalgrense]  | Ingen data                                        | > 3                                                    |
| aPTT [x ganger øvre normalgrense] | > 1,3                                             | > 2                                                    |
| INR                               | Bør ikke utføres                                  | Bør ikke utføres                                       |

#### Bruk av fibrinolytiske legemidler til behandling av akutt iskemisk slag (hjerneinfarkt)

Bruk av fibrinolytiske legemidler til behandling av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre normalgrense (ULN) i henhold til lokale referanseverdier.

#### Kirurgi og intervensjoner

Pasienter som behandles med dabigatraneteksilat, og som gjennomgår kirurgisk inngrep eller invasive prosedyrer, er utsatt for økt blødningsrisiko. Derfor kan det være behov for midlertidig seponering av dabigatraneteksilat ved kirurgiske inngrep.

Pasienter kan fortsette behandling med dabigatraneteksilat i forbindelse med konvertering av atrieflimmer. Det er ingen tilgjengelige data for 110 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig hos pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer (se pkt. 4.2).

Forsiktighet bør utvises når behandling blir midlertidig seponert i forbindelse med intervensjoner og overvåking av antikoagulasjonsbehandling er berettiget. Clearance av dabigatran kan ta lenger tid hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 5.2) og må tas i betraktning før eventuelle prosedyrer. I slike tilfeller kan en koagulasjonstest (se pkt. 4.4 og 5.1) være nyttig for å avgjøre om hemostasen fortsatt er svekket.

#### Akutt kirurgi eller akutte prosedyrer

Dabigatraneteksilat skal seponeres midlertidig. Når rask reversering av antikoagulasjonseffekten er påkrevd, er det spesifikke reverserende midlet (idarusizumab) for dabigatran tilgjengelig for voksne pasienter. Effekt og sikkerhet av idarusizumab har ikke blitt fastslått hos pediatriske pasienter. Hemodialyse kan fjerne dabigatran.

Reversering av dabigatranbehandling utsetter pasientene for den trombotiske risikoen ved den underliggende sykdommen. Behandling med dabigatraneteksilat kan gjenopptas 24 timer etter administrering av idarusizumab dersom pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase er etablert.

### Subakutt kirurgisk inngrep / intervensjon

Dabigatraneteksilat skal seponeres midlertidig. Dersom det er mulig, bør et kirurgisk inngrep / en intervensjon utsettes til minst 12 timer etter siste dose. Hvis inngrepet ikke kan utsettes, kan risikoen for blødning være økt. Denne blødningsrisikoen bør avveies mot behovet for akutt intervensjon.

### Elektiv kirurgi

Dersom det er mulig, bør dabigatraneteksilat seponeres minst 24 timer før invasive eller kirurgiske prosedyrer. Hos pasienter med høyere blødningsrisiko, eller ved større inngrep der det kan være påkrevd med fullstendig hemostase, bør det vurderes å seponere dabigatraneteksilat 2-4 dager før inngrepet.

Tabell 7 sammenfatter seponeringstidspunkter før invasive eller kirurgiske prosedyrer for voksne pasienter.

**Tabell 7: Seponeringstidspunkter før invasive eller kirurgiske prosedyrer for voksne pasienter**

| Nyrefunksjon<br>(CrCL i ml/min) | Estimert<br>halveringstid<br>(timer) | Dabigatraneteksilat bør seponeres før elektiv kirurgi |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                 |                                      | Høy blødningsrisiko eller<br>større inngrep           | Standard risiko            |
| ≥ 80                            | ~13                                  | 2 dager før                                           | 24 timer før               |
| ≥ 50- < 80                      | ~15                                  | 2-3 dager før                                         | 1-2 dager før              |
| ≥ 30- < 50                      | ~18                                  | 4 dager før                                           | 2-3 dager før (> 48 timer) |

Seponeringstidspunkter før invasive eller kirurgiske prosedyrer for pediatriske pasienter er sammenfattet i tabell 8.

**Tabell 8: Seponeringstidspunkter før invasive eller kirurgiske prosedyrer for pediatriske pasienter**

| Nyrefunksjon<br>(eGFR i ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) | Seponer dabigatran før elektiv kirurgi                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| > 80                                                 | 24 timer før                                             |
| 50-80                                                | 2 dager før                                              |
| < 50                                                 | Disse pasientene har ikke blitt undersøkt (se pkt. 4.3). |

### Spinalanestesi / epidural anestesi / lumbalpunksjon

Prosedyrer som spinalanestesi kan kreve fullstendig hemostatisk funksjon.

Risikoen for spinale eller epidurale hematomer kan være økt ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. Etter at kateteret er fjernet, bør det gå minst to timer før første dose av dabigatraneteksilat administreres. Hos disse pasientene kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer på spinale eller epidurale hematomer.

### Postoperativ fase

Dabigatraneteksilatbehandling bør gjenopptas/startes så snart som mulig etter den invasive prosedyren eller kirurgiske intervensjonen, gitt at den kliniske situasjonen tillater det og at adekvat hemostase er etablert.

Pasienter med risiko for blødning eller overeksponering, særlig pasienter med redusert nyrefunksjon (se også tabell 5), bør behandles med forsiktighet (se pkt. 4.4 og 5.1).

#### Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser

Da det foreligger begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet av dabigatraneteksilat hos disse pasientene, bør de behandles med forsiktighet.

#### Hoftebruddskirurgi

Det finnes ikke data fra bruk av dabigatraneteksilat hos pasienter som gjennomgår hoftebruddskirurgi. Behandling kan derfor ikke anbefales.

#### Nedsatt leverfunksjon

Pasienter med forhøyede leverenzymer > 2 ganger øvre normalverdi ble ekskludert fra hovedstudiene. Klinisk erfaring fra denne undergruppen av pasienter er ikke tilgjengelig. Bruk av dabigatraneteksilat er derfor ikke anbefalt til denne pasientgruppen. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å ha innvirkning på overlevelse, er kontraindisert (se pkt. 4.3).

#### Interaksjon med legemidler som inducerer P-gp

Samtidig bruk av P-gp-induktorer er forventet å redusere plasmakonsentrasjonene av dabigatran og bør unngås (se pkt. 4.5 og 5.2).

#### Pasienter med antifosfolipidsyndrom

Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkludert dabigatraneteksilat, er ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder særlig pasienter som er trippel-positive (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-antistoffer og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling med DOAK-er kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist.

#### Hjerteinfarkt

I fase III-studien RE-LY (forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer, se pkt. 5.1) var årlig forekomst av hjerteinfarkt 0,82, 0,81 og 0,64 % for henholdsvis dabigatraneteksilat 110 mg to ganger daglig, dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig og warfarin – en økning i relativ risiko for dabigatran på 29 % og 27 %, sammenlignet med warfarin. Følgende undergrupper hadde høyest absolutt risiko for hjerteinfarkt og lik relativ risiko uavhengig av behandlingsarm: pasienter med tidligere hjerteinfarkt, pasienter  $\geq 65$  år med enten diabetes eller koronarsykdom, pasienter med venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon < 40 %, og pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Høyere risiko for hjerteinfarkt ble dessuten observert hos pasienter som samtidig brukte ASA pluss klopido-rel eller klopido-rel alene.

I de tre aktivt kontrollerte DVT/LE fase III-studiene ble det rapportert om en høyere forekomst av hjerteinfarkt

hos pasienter som fikk dabigatraneteksilat, enn hos de som fikk warfarin: 0,4 % vs. 0,2 % i korttidsstudiene RE-COVER og RE-COVER II; og 0,8 % vs. 0,1 % i langtidsstudien RE-MEDY. Økningen var statistisk signifikant i sistnevnte studie ( $p = 0,022$ ).

I RE-SONATE-studien, som sammenlignet dabigatraneteksilat med placebo, var forekomsten av hjerteinfarkt 0,1 % hos pasienter som fikk dabigatraneteksilat og 0,2 % hos pasienter som fikk placebo.

#### Pasienter med aktiv kreftsykdom (DVT/LE, VTE hos pediatriske pasienter)

Effekt og sikkerhet hos DVT/LE-pasienter med aktiv kreftsykdom har ikke blitt fastslått. Det finnes begrensede data vedrørende effekt og sikkerhet hos pediatriske pasienter med aktiv kreftsykdom.

#### Pediatrisk populasjon

For noen helt bestemte pediatriske pasienter, f.eks. pasienter med tynntarmssykdom der absorpsjonen kan være berørt, bør bruk av et parenteralt antikoagulantium vurderes.

#### Informasjon om hjelpestoffer

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per harde kapsel, og er så godt som «natriumfritt».

### **4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon**

#### Transportinteraksjoner

Dabigatraneteksilat er et substrat av efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig administrering med P-gp-hemmere (se tabell 9) forventes å gi økte plasmakonsentrasjoner av dabigatran.

Hvis ikke annet er spesifikt beskrevet, er nøye klinisk overvåkning (som ser etter tegn til blødning eller anemi) påkrevd når dabigatran administreres samtidig med sterke P-gp-hemmere. Dosereduksjoner kan være påkrevd ved kombinasjon med enkelte P-gp-hemmere (se pkt. 4.2, 4.3, 4.4 og 5.1).

**Tabell 9: Transportinteraksjoner**

| <u>P-gp-hemmere</u>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samtidig bruk er kontraindisert (se pkt. 4.3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ketokonazol                                   | Ketokonazol økte total $AUC_{0-\infty}$ og $C_{max}$ for dabigatran med henholdsvis 2,38 ganger og 2,35 ganger etter en oral enkeltdose på 400 mg, og med henholdsvis 2,53 ganger og 2,49 ganger etter multipl oral dosering av 400 mg ketokonazol én gang daglig.                                              |
| Dronedaron                                    | Da dabigatraneteksilat og dronedaron ble gitt på samme tidspunkt, økte total $AUC_{0-\infty}$ og $C_{max}$ for dabigatran med henholdsvis ca. 2,4 ganger og 2,3 ganger etter multipl dosering av 400 mg dronedaron to ganger daglig, og henholdsvis ca. 2,1 ganger og 1,9 ganger etter en enkeltdose på 400 mg. |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Itrakonazol, ciklosporin                                              | Basert på <i>in vitro</i> -resultater kan en lignende effekt som med ketokonazol forventes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Glekaprevir/pibrentasvir                                              | Samtidig bruk av dabigatraneteksilat og den faste dosekombinasjonen av P-gp-hemmerne glekaprevir/pibrentasvir er vist å øke eksponeringen for dabigatran og kan øke blødningsrisikoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Samtidig bruk er ikke anbefalt</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Takrolimus                                                            | Takrolimus har <i>in vitro</i> vist seg å ha et tilsvarende nivå av hemmende effekt på P-gp som det man ser med itrakonazol og ciklosporin. Dabigatraneteksilat er ikke blitt klinisk undersøkt sammen med takrolimus. Begrensede kliniske data med et annet P-gp-substrat (everolimus) antyder imidlertid at hemming av P-gp med takrolimus er svakere enn det som er observert med sterke P-gp-hemmere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk (se pkt. 4.2 og 4.4)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verapamil                                                             | Da dabigatraneteksilat (150 mg) ble gitt sammen med oralt verapamil, økte $C_{max}$ og AUC for dabigatran, men størrelsen på endringen varierer avhengig av når administreringen skjer samt hva slags formulering av verapamil som gis (se pkt. 4.2 og 4.4). Den største økningen i dabigatraneksponering ble observert med første dose av en verapamilformulering med rask frisetting gitt en time før inntak av dabigatraneteksilat (økning i $C_{max}$ med ca. 2,8 ganger og AUC med ca. 2,5 ganger). Denne effekten avtok progressivt med administrering av en depotformulering (økning i $C_{max}$ med ca. 1,9 ganger og AUC med ca. 1,7 ganger) eller multiple doser av verapamil (økning i $C_{max}$ med ca. 1,6 ganger og AUC med ca. 1,5 ganger). Ingen betydningsfull interaksjon ble observert da verapamil ble gitt 2 timer etter dabigatraneteksilat (økning i $C_{max}$ med ca. 1,1 ganger og AUC med ca. 1,2 ganger). Dette forklares med fullstendig absorpsjon av dabigatran etter 2 timer. |
| Amiodaron                                                             | Da dabigatraneteksilat ble gitt sammen med én enkelt oral dose på 600 mg amiodaron, forble absorpsjonsgraden og -hastigheten av amiodaron og dets aktive metabolitt DEA i alt vesentlig uforandret. AUC og $C_{max}$ for dabigatran økte med henholdsvis ca. 1,6 ganger og 1,5 ganger. På bakgrunn av den lange halveringstiden til amiodaron kan muligheten for en interaksjon vedvare i flere uker etter at amiodaron er seponert (se pkt. 4.2 og 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kinidin                                                               | Kinidin 200 mg ble gitt hver andre time opp til en total dose på 1000 mg. Dabigatraneteksilat ble gitt to ganger daglig i tre påfølgende dager, den tredje dagen med eller uten kinidin. $AUC_{\tau,ss}$ og $C_{max,ss}$ for dabigatran økte i gjennomsnitt med henholdsvis 1,53 ganger og 1,56 ganger ved samtidig behandling med kinidin (se pkt. 4.2 og 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klaritromycin                                                         | Da klaritromycin (500 mg to ganger daglig) ble gitt sammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | med dabigatraneteksilat til friske frivillige, ble det observert en økning i AUC med ca. 1,19 ganger $C_{max}$ med ca. 1,15 ganger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tikagrelor                                                                                  | <p>Da en enkeltdose på 75 mg dabigatraneteksilat ble gitt samtidig med en støtdose på 180 mg tikagrelor, økte AUC og <math>C_{max}</math> for dabigatran med henholdsvis 1,73 ganger og 1,95 ganger. Ved gjentatte doser med tikagrelor 90 mg to ganger daglig økte dabigatraneksponeringen henholdsvis 1,56 ganger og 1,46 ganger for <math>C_{max}</math> og AUC.</p> <p>Samtidig administrering av en støtdose på 180 mg tikagrelor og 110 mg dabigatraneteksilat (ved steady-state) økte <math>AUC_{\tau,ss}</math> og <math>C_{max,ss}</math> for dabigatran med henholdsvis 1,49 ganger og 1,65 ganger, sammenlignet med dabigatraneteksilat gitt alene.</p> <p>Da en støtdose på 180 mg tikagrelor ble gitt 2 timer etter 110 mg dabigatraneteksilat (ved steady-state), ble økningen i <math>AUC_{\tau,ss}</math> og <math>C_{max,ss}</math> for dabigatran redusert til henholdsvis 1,27 ganger og 1,23 ganger, sammenlignet med dabigatraneteksilat gitt alene. Et slikt forskjøvet inntak er den anbefalte administrasjonsmåten for start av tikagrelor med en støtdose.</p> <p>Samtidig administrering av 90 mg tikagrelor to ganger daglig (vedlikeholdsdose) og 110 mg dabigatraneteksilat økte justert <math>AUC_{\tau,ss}</math> og <math>C_{max,ss}</math> for dabigatran henholdsvis 1,26 ganger og 1,29 ganger, sammenlignet med dabigatraneteksilat gitt alene.</p> |
| Posakonazol                                                                                 | Posakonazol hemmer også P-gp til en viss grad, men er ikke blitt klinisk undersøkt. Det bør utvises forsiktighet når dabigatraneteksilat administreres samtidig med posakonazol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>P-gp-induktorer</u>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samtidig bruk bør unngås                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f.eks. rifampicin, johannesurt ( <i>Hypericum perforatum</i> ), karbamazepin eller fenytoin | <p>Samtidig administrering er forventet å føre til reduserte dabigatrankonsentrasjoner.</p> <p>Predosering av induktoren rifampicin 600 mg én gang daglig i 7 dager reduserte total toppkonsentrasjon og total eksponering for dabigatran med henholdsvis 65,5 % og 67 %. Den induserende effekten avtok og resulterte i dabigatraneksponering nær referanseområdet innen dag 7 etter avsluttet rifampicinbehandling. Ingen økning i biotilgjengelighet ble observert etter ytterligere 7 dager.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Proteasehemmere slik som ritonavir</u>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samtidig bruk er ikke anbefalt                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f.eks. ritonavir og kombinasjoner av ritonavir med andre proteasehemmere                    | Disse påvirker P-gp (enten som hemmer eller induktor). Disse er ikke blitt undersøkt og anbefales derfor ikke til samtidig behandling med dabigatraneteksilat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>P-gp-substrater</u>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Digoksin                                                                                    | I en studie med 24 friske personer, hvor dabigatraneteksilat ble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | gitt samtidig med digoksin, ble ingen endringer for digoksin og ingen klinisk relevante endringer i dabigatraneksponering observert. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere

Det foreligger ingen eller kun begrenset erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved samtidig bruk med dabigatraneteksilat: antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (LMWH) og heparinderivater (fondaparinux, desirudin), trombolytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia (se pkt. 4.3) og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran og sulfinpyrazon (se pkt. 4.4).

Data fra fase III-studien RE-LY (se pkt. 5.1) viste at samtidig bruk av andre orale og parenterale antikoagulantia økte hyppigheten av større blødninger med omtrent 2,5 ganger både med dabigatraneteksilat og warfarin. Hovedsakelig var dette relatert til tilfeller der man byttet fra ett antikoagulantium til et annet (se pkt. 4.3). Det ble også vist at samtidig bruk av platehemmere, ASA eller klopido­grel omtrent doblet hyppigheten av større blødninger både med dabigatraneteksilat og warfarin (se pkt. 4.4).

UFH kan administreres i doser som er nødvendige for å opprettholde et åpent sentralt venekateter eller arteriekateter, eller under kateterablasjon for atrieflimmer (se pkt. 4.3).

**Tabell 10: Interaksjoner med antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSAID-er     | NSAID-er gitt som korttids smertebehandling har vist seg å ikke være assosiert med økt blødningsrisiko i kombinasjon med dabigatraneteksilat. Ved kronisk bruk i RE-LY-studien økte NSAID-er blødningsrisikoen med ca. 50 % både for dabigatraneteksilat og warfarin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klopido­grel | Hos unge friske mannlige frivillige resulterte samtidig administrasjon av dabigatraneteksilat og klopido­grel ikke i noen ytterligere forlengelse av kapillær blødningstid, sammenlignet med klopido­grel monoterapi. $AUC_{\tau,ss}$ og $C_{max,ss}$ for dabigatran og koagulasjonsmålinger for effekt av dabigatran, eller plateaggregasjonshemming som mål for effekt av klopido­grel forble hovedsakelig uforandret ved sammenligning av kombinasjonsbehandling og de respektive monoterapiene. Med en støtdose klopido­grel på henholdsvis 300 mg eller 600 mg økte $AUC_{\tau,ss}$ og $C_{max,ss}$ for dabigatran ca. 30-40 % (se pkt. 4.4) .                                                                                                                                                            |
| ASA          | Samtidig administrering av ASA og 150 mg dabigatraneteksilat gitt to ganger daglig kan gi økt blødningsrisiko fra 12 % til 18 % og 24 % med henholdsvis 81 mg og 325 mg ASA (se pkt. 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LMWH         | Samtidig bruk av lavmolekylære hepariner som enoksaparin og dabigatraneteksilat har ikke blitt spesifikt undersøkt. Etter bytte fra 3-dagers subkutan behandling med enoksaparin 40 mg én gang daglig, var dabigatraneksponeringen 24 timer etter siste enoksaparin­dose litt lavere enn etter administrering av dabigatraneteksilat alene (enkeltdose på 220 mg). Høyere anti-FXa/FIIa-aktivitet ble observert etter administrering av dabigatraneteksilat med forbehandling med enoksaparin, sammenlignet med aktiviteten etter behandling med dabigatraneteksilat alene. Man anser dette for å være en overførings­effekt av enoksaparinbehandling, og det anses ikke som klinisk relevant. Andre dabigatran-relaterte antikoagulasjonstester ble ikke signifikant endret av forbehandling med enoksaparin. |

## Andre interaksjoner

**Tabell 11: Andre interaksjoner**

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er) eller selektive serotonin-norepinefrinreopptakshemmere (SNRI-er)</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SSRI-er, SNRI-er                                                                                                      | SSRI-er og SNRI-er økte blødningsrisikoen i RE-LY i alle behandlingsgruppene.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Substanser som påvirker gastrisk pH</u>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pantoprazol                                                                                                           | Ved samtidig administrering av dabigatraneteksilat og pantoprazol ble det observert en reduksjon i AUC for dabigatran på ca. 30 %. Pantoprazol og andre protonpumpehemmere (PPI) ble administrert sammen med dabigatraneteksilat i kliniske studier, og samtidig PPI-behandling syntes ikke å redusere effekten av dabigatraneteksilat. |
| Ranitidin                                                                                                             | Ranitidin gitt sammen med dabigatraneteksilat hadde ingen klinisk relevant effekt på absorpsjonsgraden av dabigatran.                                                                                                                                                                                                                   |

## Interaksjoner forbundet med dabigatraneteksilat og dabigatrans metabolske profil

Dabigatraneteksilat og dabigatran metaboliseres ikke via cytokrom P450-systemet og har ingen effekt *in vitro* på humane cytokrom P450-enzymmer. Relaterte legemiddelinteraksjoner forventes derfor ikke med dabigatran.

## Pediatrisk populasjon

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

## **4.6 Fertilitet, graviditet og amming**

### Kvinner i fertil alder

Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling med Dabigatran etexilate Sandoz.

### Graviditet

Det er begrenset mengde data på bruk av dabigatraneteksilat hos gravide kvinner.

Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3). Den potensielle risikoen for mennesker er ukjent.

Dabigatran etexilate Sandoz bør ikke brukes under graviditet, med mindre det er helt nødvendig.

### Amming

Det foreligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran hos spedbarn som ammes.

Amming bør opphøre ved behandling med Dabigatran etexilate Sandoz.

### Fertilitet

Det finnes ingen tilgjengelige data for mennesker.

I dyrestudier ble det observert en effekt på fertilitet hos hunner i form av redusert antall implantasjoner og økt preimplantasjonstap ved 70 mg/kg (representerer 5 ganger høyere plasmaeksponeringsnivå sammenlignet med pasienter). Ingen andre effekter på fertilitet hos hunner ble observert. Det var ingen påvirkning på fertilitet hos hanner. Ved toksiske doser hos mordyrene (representerer 5-10 ganger høyere plasmaeksponeringsnivå sammenlignet med pasienter) ble det hos rotte og kanin observert redusert vekt og levedyktighet hos fostrene samt økt føtal variasjon. I studien før og etter fødsel ble en økning i føtal mortalitet observert ved doser som var toksiske for mordyrene (en dose som tilsvarer et plasmaeksponeringsnivå som er 4 ganger høyere enn det som observeres hos pasienter).

#### **4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner**

Dabigatran etexilate Sandoz har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

#### **4.8 Bivirkninger**

##### Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Dabigatraneteksilat har blitt evaluert i kliniske studier med totalt ca. 64 000 pasienter. Av disse ble omtrent 35 000 pasienter behandlet med dabigatraneteksilat.

Totalt ca. 9 % av pasientene behandlet for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (korttidsbehandling i opptil 42 dager), 22 % av pasientene med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk embolisme (langtidsbehandling i opptil 3 år), 14 % av pasientene behandlet for DVT/LE og 15 % av pasientene behandlet for forebyggelse av DVT/LE opplevde bivirkninger.

De vanligst rapporterte bivirkningene er blødninger som forekommer hos omtrent 14 % av pasientene som har fått korttidsbehandling for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,6 % av pasientene med atrieflimmer langtidsbehandlet for forebyggelse av slag og systemisk embolisme og hos 14,4 % av voksne pasienter behandlet for DVT/LE. Videre forekom blødning hos 19,4 % av pasientene i DVT/L-profylaksestudien RE- MEDY (voksne pasienter) og hos 10,5 % av pasientene i DVT/LE-profylaksestudien RE-SONATE (voksne pasienter). Pasientpopulasjonene behandlet i de tre indikasjonene er ikke sammenlignbare, og blødningshendelsene er fordelt over flere organklassesystemer. En oppsummering over større blødninger og enhver blødning er derfor angitt per indikasjon i tabell 13-17 nedenfor.

Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og kan, uavhengig av lokasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier.

##### Liste over bivirkninger i tabellform

Tabell 12 viser bivirkninger identifisert fra studier og data etter markedsføring ved indikasjonene forebyggelse av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi, forebyggelse av tromboembolisk slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE-behandling og DVT/LE-profylakse. De er klassifisert etter organklassesystem og frekvens i henhold til følgende konvensjon: svært vanlige ( $\geq 1/10$ ), vanlige ( $\geq 1/100$  til  $< 1/10$ ), mindre vanlige ( $\geq 1/1000$  til  $< 1/100$ ), sjeldne ( $\geq 1/10\ 000$  til  $< 1/1000$ ), svært sjeldne ( $< 1/10\ 000$ ), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).

#### **Tabell 12: Bivirkninger**

|                                                               | Frekvens                                                        |                                                                            |                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Organklasser / foretrukket betegnelse                         | Forebyggelse av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi | Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer | DVT/LE-behandling og DVT/LE-profylakse |
| <b>Sykdommer i blod og lymfatiske organer</b>                 |                                                                 |                                                                            |                                        |
| Anemi                                                         | Mindre vanlige                                                  | Vanlige                                                                    | Mindre vanlige                         |
| Redusert hemoglobin                                           | Vanlige                                                         | Mindre vanlige                                                             | Ikke kjent                             |
| Trombocytopeni                                                | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Sjeldne                                |
| Redusert hematokrit                                           | Mindre vanlige                                                  | Sjeldne                                                                    | Ikke kjent                             |
| Nøytropeni                                                    | Ikke kjent                                                      | Ikke kjent                                                                 | Ikke kjent                             |
| Agranulocytose                                                | Ikke kjent                                                      | Ikke kjent                                                                 | Ikke kjent                             |
| <b>Forstyrrelser i immunsystemet</b>                          |                                                                 |                                                                            |                                        |
| Legemiddeloverfølsomhet                                       | Mindre vanlige                                                  | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Utslett                                                       | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Pruritus                                                      | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Anafylaktisk reaksjon                                         | Sjeldne                                                         | Sjeldne                                                                    | Sjeldne                                |
| Angioødem                                                     | Sjeldne                                                         | Sjeldne                                                                    | Sjeldne                                |
| Urtikaria                                                     | Sjeldne                                                         | Sjeldne                                                                    | Sjeldne                                |
| Bronkospasme                                                  | Ikke kjent                                                      | Ikke kjent                                                                 | Ikke kjent                             |
| <b>Nevrologiske sykdommer</b>                                 |                                                                 |                                                                            |                                        |
| Intrakraniell blødning                                        | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Sjeldne                                |
| Karsykdommer                                                  |                                                                 |                                                                            |                                        |
| Hematom                                                       | Mindre vanlige                                                  | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Blødning                                                      | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Blødning fra sår                                              | Mindre vanlige                                                  | -                                                                          |                                        |
| <b>Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum</b> |                                                                 |                                                                            |                                        |
| Epistakse                                                     | Mindre vanlige                                                  | Vanlige                                                                    | Vanlige                                |
| Hemoptyse                                                     | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| <b>Gastrointestinale sykdommer</b>                            |                                                                 |                                                                            |                                        |
| Gastrointestinal blødning                                     | Mindre vanlige                                                  | Vanlige                                                                    | Vanlige                                |
| Abdominal smerte                                              | Sjeldne                                                         | Vanlige                                                                    | Mindre vanlige                         |
| Diaré                                                         | Mindre vanlige                                                  | Vanlige                                                                    | Mindre vanlige                         |
| Dyspepsi                                                      | Sjeldne                                                         | Vanlige                                                                    | Vanlige                                |
| Kvalme                                                        | Mindre vanlige                                                  | Vanlige                                                                    | Mindre vanlige                         |
| Rektal blødning                                               | Mindre vanlige                                                  | Mindre vanlige                                                             | Vanlige                                |
| Hemoroideblødning                                             | Mindre vanlige                                                  | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Gastrointestinalsår, inkludert øsofagealt sår                 | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Gastroøsofagitt                                               | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Gastroøsofageal reflukssykdom                                 | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Oppkast                                                       | Mindre vanlige                                                  | Mindre vanlige                                                             | Mindre vanlige                         |
| Dysfagi                                                       | Sjeldne                                                         | Mindre vanlige                                                             | Sjeldne                                |
| <b>Sykdommer i lever og galleveier</b>                        |                                                                 |                                                                            |                                        |

|                                                                          |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Unormal leverfunksjon / unormale leverfunksjonstester                    | Vanlige        | Mindre vanlige | Mindre vanlige |
| Forhøyet ALAT                                                            | Mindre vanlige | Mindre vanlige | Mindre vanlige |
| Forhøyet ASAT                                                            | Mindre vanlige | Mindre vanlige | Mindre vanlige |
| Økte leverenzymmer                                                       | Mindre vanlige | Sjeldne        | Mindre vanlige |
| Hyperbilirubinemi                                                        | Mindre vanlige | Sjeldne        | Ikke kjent     |
| <b>Hud- og underhudssykdommer</b>                                        |                |                |                |
| Hudblødning                                                              | Mindre vanlige | Vanlige        | Vanlige        |
| Alopesi                                                                  | Ikke kjent     | Ikke kjent     | Ikke kjent     |
| <b>Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett</b>                         |                |                |                |
| Hemartrose                                                               | Mindre vanlige | Sjeldne        | Mindre vanlige |
| <b>Sykdommer i nyre og urinveier</b>                                     |                |                |                |
| Urogenital blødning, inkludert hematuri                                  | Mindre vanlige | Vanlige        | Vanlige        |
| <b>Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet</b>         |                |                |                |
| Blødning på injeksjonsstedet                                             | Sjeldne        | Sjeldne        | Sjeldne        |
| Blødning på kateterstedet                                                | Sjeldne        | Sjeldne        | Sjeldne        |
| Blodig væsking                                                           | Sjeldne        | -              |                |
| <b>Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer</b> |                |                |                |
| Traumatisk blødning                                                      | Mindre vanlige | Sjeldne        | Mindre vanlige |
| Blødning ved snittstedet                                                 | Sjeldne        | Sjeldne        | Sjeldne        |
| Postoperativt hematom                                                    | Mindre vanlige | -              | -              |
| Postoperativ blødning                                                    | Mindre vanlige | -              |                |
| Postoperativ anemi                                                       | Sjeldne        | -              | -              |
| Postoperativ væsking                                                     | Mindre vanlige | -              | -              |
| Sårsekresjon                                                             | Mindre vanlige | -              | -              |
| <b>Kirurgiske og medisinske prosedyrer</b>                               |                |                |                |
| Sårdrenering                                                             | Sjeldne        | -              | -              |
| Postoperativ drenering                                                   | Sjeldne        | -              | -              |

#### Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

##### Blødningsreaksjoner

På grunn av den farmakologiske virkemåten kan bruk av dabigatraneteksilat være assosiert med økt risiko for skjult eller åpenbar blødning fra et hvilket som helst vev eller organ. Tegn, symptomer og alvorlighetsgrad (inkludert fatalt utfall) vil variere ut fra lokasjon og graden eller omfanget av blødningen og/eller anemien. I de kliniske studiene ble blødning i slimhinner (f.eks. gastrointestinal, urogenital) sett oftere ved langvarig behandling med dabigatraneteksilat, sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg til egnet klinisk overvåkning er det derfor nyttig med laboratorietesting av hemoglobin/hematokrit for å avdekke skjult blødning. Risikoen for blødninger kan være større i enkelte pasientgrupper, f.eks. pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon og/eller pasienter som får samtidig behandling som påvirker hemostasen eller sterke P-gp-hemmere (se pkt. 4.4 «Blødningsrisiko»). Blødningskomplikasjoner kan komme til uttrykk som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk.

Kjente blødningskomplikasjoner, slik som kompartmentsyndrom og akutt nyresvikt på grunn av hypoperfusjon og antikoagulantrelatert nefropati hos pasienter med predisponerende risikofaktorer, er blitt rapportert ved bruk av dabigatraneteksilat. Derfor må muligheten for blødning vurderes ved evaluering av tilstanden hos enhver antikoagulert pasient. For voksne pasienter er et spesifikt reverserende middel for dabigatran, idarusizumab, tilgjengelig i tilfelle ukontrollerbar blødning oppstår (se pkt. 4.9).

#### *Primær forebyggelse av VTE ved ortopedisk kirurgi*

Tabell 13 viser antall (%) pasienter som fikk bivirkningen blødning i løpet av behandlingsperioden for VTE-profylakse i de to pivotale kliniske studiene, etter dose.

**Tabell 13: Antall (%) pasienter som fikk bivirkningen blødning**

|                 | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>én gang daglig<br>N (%) | Dabigatraneteksilat<br>220 mg<br>én gang daglig<br>N (%) | Enoksaparin<br>N (%) |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Behandlet       | 1866 (100,0)                                             | 1825 (100,0)                                             | 1848 (100,0)         |
| Større blødning | 24 (1,3)                                                 | 33 (1,8)                                                 | 27 (1,5)             |
| Enhver blødning | 258 (13,8)                                               | 251 (13,8)                                               | 247 (13,4)           |

#### *Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer*

Tabell 14 viser blødningshendelser angitt som større blødning og enhver blødning i den pivotale studien som undersøker forebyggelse av tromboembolisk slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer.

**Tabell 14: Blødningshendelser i en studie som undersøker forebyggelse av tromboembolisk slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer**

|                           | Dabigatraneteksilat<br>110 mg<br>to ganger daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Randomiserte pasienter    | 6015                                              | 6076                                              | 6022           |
| Større blødning           | 347 (2,92 %)                                      | 409 (3,40 %)                                      | 426 (3,61 %)   |
| Intrakraniell blødning    | 27 (0,23 %)                                       | 39 (0,32 %)                                       | 91 (0,77 %)    |
| Gastrointestinal blødning | 134 (1,13 %)                                      | 192 (1,60 %)                                      | 128 (1,09 %)   |
| Fatal blødning            | 26 (0,22 %)                                       | 30 (0,25 %)                                       | 42 (0,36 %)    |
| Mindre blødning           | 1566 (13,16 %)                                    | 1787 (14,85 %)                                    | 1931 (16,37 %) |
| Enhver blødning           | 1759 (14,78 %)                                    | 1997 (16,60 %)                                    | 2169 (18,39 %) |

Pasienter som ble randomisert til dabigatraneteksilat 110 mg to ganger daglig eller 150 mg to ganger daglig, hadde signifikant lavere risiko for livstruende og intrakranielle blødninger sammenlignet med warfarin [ $p < 0,05$ ]. Det totale antall blødninger var også statistisk signifikant lavere hos pasienter som fikk disse to dosene av dabigatraneteksilat. Pasienter randomisert til dabigatraneteksilat 110 mg to ganger daglig, hadde signifikant lavere risiko for større blødninger sammenlignet med warfarin (hazard ratio 0,81 [ $p = 0,0027$ ]). Pasienter randomisert til dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig, hadde signifikant høyere risiko for større gastrointestinale blødninger sammenlignet med warfarin (hazard ratio 1,48 [ $p = 0,0005$ ]), som primært ble



observert hos pasienter  $\geq 75$  år.

Den kliniske nytteverdien av dabigatran for forebyggelse av slag og systemisk embolisme og redusert risiko for intrakraniell blødning sammenlignet med warfarin er opprettholdt på tvers av individuelle undergrupper, som f.eks. nedsatt nyrefunksjon, alder, samtidig behandling med legemidler som plateaggregasjonshekkere og P-gp-hekkere. Noen pasientundergrupper har økt risiko for større blødninger ved antikoagulasjonsbehandling, men den økte blødningsrisikoen ved bruk av dabigatran skyldes gastrointestinal blødning som vanligvis observeres innen de første 3-6 månedene etter oppstart av dabigatraneteksilatbehandling.

*Behandling av DVT og LE og forebyggelse av residerende DVT og LE hos voksne (DVT/LE-behandling)*

Tabell 15 viser blødningshendelser i de samlede pivotale studiene RE-COVER og RE-COVER II som undersøkte behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE). I de samlede studiene var forekomsten av de primære sikkerhetsendepunktene – større blødning, større eller klinisk relevant blødning og enhver blødning – i dabigatraneteksilatgruppen signifikant lavere enn i warfaringruppen ved en nominell alfaverdi på 5 %.

**Tabell 15: Blødningshendelser i studiene RE-COVER og RE-COVER II som undersøkte behandling av DVT og LE**

|                                                                   | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin     | Hazard ratio vs.<br>warfarin<br>(95 % konfidens-<br>intervall) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Pasienter inkludert i<br>sikkerhetsanalysen                       | 2456                                              | 2462         |                                                                |
| Større blødningshendelser                                         | 24 (1,0 %)                                        | 40 (1,6 %)   | 0,60 (0,36; 0,99)                                              |
| Intrakraniell<br>blødning                                         | 2 (0,1 %)                                         | 4 (0,2 %)    | 0,50 (0,09; 2,74)                                              |
| Større gastrointestinal<br>blødning                               | 10 (0,4 %)                                        | 12 (0,5 %)   | 0,83 (0,36; 1,93)                                              |
| Livstruende<br>blødning                                           | 4 (0,2 %)                                         | 6 (0,2 %)    | 0,66 (0,19; 2,36)                                              |
| Større<br>blødningshendelser /<br>klinisk relevante<br>blødninger | 109 (4,4 %)                                       | 189 (7,7 %)  | 0,56 (0,45; 0,71)                                              |
| Enhver blødning                                                   | 354 (14,4 %)                                      | 503 (20,4 %) | 0,67 (0,59; 0,77)                                              |
| Enhver gastrointestinal<br>blødning                               | 70 (2,9 %)                                        | 55 (2,2 %)   | 1,27 (0,90; 1,82)                                              |

Blødningshendelser fra begge behandlingene er regnet fra første inntak av dabigatraneteksilat eller warfarin etter seponering av parenteral terapi (kun oral behandlingsperiode). Dette inkluderer alle blødningshendelser som forekom under behandling med dabigatraneteksilat. Alle blødningshendelser som forekom under warfarinbehandling er inkludert, bortsett fra de som forekom i overlappingsperioden mellom warfarin og parenteral behandling.

Tabell 16 viser blødningshendelser i den pivotale studien RE-MEDY som undersøkte forebyggelse av DVT og

LE. Noen blødningshendelser (større blødningshendelser / klinisk relevante blødningshendelser; enhver blødning) var signifikant lavere ved en nominell alfaverdi på 5 % hos pasienter som fikk dabigatraneteksilat, sammenlignet med de som fikk warfarin.

**Tabell 16: Blødningshendelser i studien RE-MEDY som undersøkte forebyggelse av DVT og LE**

|                                                             | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin        | Hazard ratio vs.<br>warfarin<br>(95 %<br>konfidensintervall) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Behandlede pasienter                                        | 1430                                              | 1426            |                                                              |
| Større blødningshendelser                                   | 13 (0,9 %)                                        | 25 (1,8 %)      | 0,54 (0,25; 1,16)                                            |
| Intrakraniell<br>blødning                                   | 2 (0,1 %)                                         | 4 (0,3 %)       | Kan ikke beregnes*                                           |
| Større<br>gastrointestinal<br>blødning                      | 4 (0,3 %)                                         | 8 (0,5 %)       | Kan ikke beregnes*                                           |
| Livstruende<br>blødning                                     | 1 (0,1 %)                                         | 3 (0,2 %))      | Kan ikke beregnes*                                           |
| Større blødningshendelser /<br>klinisk relevante blødninger | 80 (5,6 %)                                        | 145<br>(10,2 %) | 0,55 (0,41; 0,72)                                            |
| Enhver blødning                                             | 278 (19,4 %)                                      | 373<br>(26,2 %) | 0,71 (0,61; 0,83)                                            |
| Enhver gastrointestinal<br>blødning                         | 45 (3,1 %)                                        | 32 (2,2 %)      | 1,39 (0,87; 2,20)                                            |

\*Hazard Ratio kan ikke beregnes siden det ikke er noen hendelse i noen av kohortene/behandlingene.

Tabell 17 viser blødningshendelser i den pivotale studien RE-SONATE som undersøkte forebyggelse av DVT og LE. Forekomsten av kombinasjonen større blødningshendelser / klinisk relevante blødningshendelser og forekomsten av enhver blødning var signifikant lavere ved en nominell alfaverdi på 5 % hos pasienter som fikk placebo, sammenlignet med de som fikk dabigatraneteksilat.

**Tabell 17: Blødningshendelser i studien RE-SONATE som undersøkte forebyggelse av DVT og LE**

|                                     | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Placebo | Hazard ratio vs. placebo<br>(95 % konfidensintervall) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Behandlede pasienter                | 684                                               | 659     |                                                       |
| Større blødningshendelser           | 2 (0,3 %)                                         | 0       | Kan ikke beregnes*                                    |
| Intrakraniell blødning              | 0                                                 | 0       | Kan ikke beregnes*                                    |
| Større gastrointestinal<br>blødning | 2 (0,3 %)                                         | 0       | Kan ikke beregnes*                                    |
| Livstruende blødning                | 0                                                 | 0       | Kan ikke beregnes*                                    |

|                                                          |             |            |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Større blødningshendelser / klinisk relevante blødninger | 36 (5,3 %)  | 13 (2,0 %) | 2,69 (1,43; 5,07)  |
| Enhver blødning                                          | 72 (10,5 %) | 40 (6,1 %) | 1,77 (1,20; 2,61)  |
| Enhver gastrointestinal blødning                         | 5 (0,7 %)   | 2 (0,3 %)  | 2,38 (0,46; 12,27) |

\*Hazard Ratio kan ikke beregnes siden det ikke er noen hendelse i noen behandling.

### Agranulocytose og nøytropeni

Etter godkjenning har det blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av agranulocytose og nøytropeni ved bruk av dabigatraneteksilat. Siden bivirkningene som er rapportert i forbindelse med bivirkningsovervåkning etter markedsføring er fra en populasjon av usikker størrelse, er det ikke mulig å fastslå frekvensen av disse på en pålitelig måte. Rapporteringsraten ble estimert som 7 hendelser per 1 million pasientår for agranulocytose og som 5 hendelser per 1 million pasientår for nøytropeni.

### Pediatrik populasjon

Sikkerheten av dabigatraneteksilat ved behandling av VTE og forebyggelse av residiverende VTE hos pediatriske pasienter ble studert i to fase III-studier (DIVERSITY og 1160.108). Totalt 328 pediatriske pasienter ble behandlet med dabigatraneteksilat. Pasientene fikk alders- og vektilpassede doser av en alderstilpasset formulering av dabigatraneteksilat.

Generelt sett forventes sikkerhetsprofilen hos barn å være den samme som hos voksne.

Totalt 26 % av pediatriske pasienter som ble behandlet med dabigatraneteksilat for VTE og for forebyggelse av residiverende VTE, opplevde bivirkninger.

### Liste over bivirkninger i tabellform

Tabell 18 viser bivirkningene identifisert fra studiene på behandling av VTE og forebyggelse av residiverende VTE hos pediatriske pasienter. De er klassifisert etter organklasser og frekvens i henhold til følgende konvensjon: svært vanlige ( $\geq 1/10$ ), vanlige ( $\geq 1/100$  til  $< 1/10$ ), mindre vanlige ( $\geq 1/1000$  til  $< 1/100$ ), sjeldne ( $\geq 1/10\,000$  til  $< 1/1000$ ), svært sjeldne ( $< 1/10\,000$ ), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).

**Tabell 18: Bivirkninger**

|                                               | Frekvens                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Organklasser / foretrukket betegnelse         | Behandling av VTE og forebyggelse av residiverende VTE hos pediatriske pasienter |
| <b>Sykdommer i blod og lymfatiske organer</b> |                                                                                  |
| Anemi                                         | Vanlige                                                                          |
| Redusert hemoglobin                           | Mindre vanlige                                                                   |
| Trombocytopeni                                | Vanlige                                                                          |
| Redusert hematokrit                           | Mindre vanlige                                                                   |
| Nøytropeni                                    | Mindre vanlige                                                                   |
| Agranulocytose                                | Ikke kjent                                                                       |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Forstyrrelser i immunsystemet</b>                          |                |
| Legemiddeloverfølsomhet                                       | Mindre vanlige |
| Utslett                                                       | Vanlige        |
| Pruritus                                                      | Mindre vanlige |
| Anafylaktisk reaksjon                                         | Ikke kjent     |
| Angioødem                                                     | Ikke kjent     |
| Urtikaria                                                     | Vanlige        |
| Bronkospasme                                                  | Ikke kjent     |
| <b>Nevrologiske sykdommer</b>                                 |                |
| Intrakraniell blødning                                        | Mindre vanlige |
| <b>Karsykdommer</b>                                           |                |
| Hematom                                                       | Vanlige        |
| Blødning                                                      | Ikke kjent     |
| <b>Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum</b> |                |
| Epistakse                                                     | Vanlige        |
| Hemoptyse                                                     | Mindre vanlige |
| <b>Gastrointestinale sykdommer</b>                            |                |
| Gastrointestinal blødning                                     | Mindre vanlige |
| Abdominal smerte                                              | Mindre vanlige |
| Diaré                                                         | Vanlige        |
| Dyspepsi                                                      | Vanlige        |
| Kvalme                                                        | Vanlige        |
| Rektal blødning                                               | Mindre vanlige |
| Hemoroideblødning                                             | Ikke kjent     |
| Gastrointestinalsår, inkludert øsofagealt sår                 | Ikke kjent     |
| Gastroøsofagitt                                               | Mindre vanlige |
| Gastroøsofageal reflukssykdom                                 | Vanlige        |
| Oppkast                                                       | Vanlige        |
| Dysfagi                                                       | Mindre vanlige |
| <b>Sykdommer i lever og galleveier</b>                        |                |
| Unormal leverfunksjon / unormale leverfunksjonstester         | Ikke kjent     |
| Forhøyet ALAT                                                 | Mindre vanlige |
| Forhøyet ASAT                                                 | Mindre vanlige |
| Økte leverenzymmer                                            | Vanlige        |
| Hyperbilirubinemi                                             | Mindre vanlige |
| <b>Hud- og underhudssykdommer</b>                             |                |
| Hudblødning                                                   | Mindre vanlige |
| Alopesi                                                       | Vanlige        |
| <b>Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett</b>              |                |
| Hemartrose                                                    | Ikke kjent     |
| <b>Sykdommer i nyre og urinveier</b>                          |                |
| Urogenital blødning, inkludert hematuri                       | Mindre vanlige |

| <b>Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet</b>         |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Blødning på injeksjonsstedet                                             | Ikke kjent     |
| Blødning på kateterstedet                                                | Ikke kjent     |
| <b>Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer</b> |                |
| Traumatisk blødning                                                      | Mindre vanlige |
| Blødning ved snittstedet                                                 | Ikke kjent     |

### Blødningsreaksjoner

I de to fase III-studiene for indikasjonen behandling av VTE og forebygging av residiverende VTE hos pediatriske pasienter opplevde totalt 7 pasienter (2,1 %) en større blødningshendelse, 5 pasienter (1,5 %) en klinisk relevant ikke-alvorlig blødningshendelse og 75 pasienter (22,9 %) en mindre blødningshendelse. Frekvensen av blødningshendelser var generelt høyere i den eldste aldersgruppen (12 til < 18 år: 28,6 %) enn i de yngre aldersgruppene (fra fødsel til < 2 år: 23,3 %; fra 2 til < 12 år: 16,2 %). Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og kan, uavhengig av lokasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale.

### Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: [www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema).

## **4.9 Overdosering**

Høyere doser av dabigatraneteksilat enn det som er anbefalt, utsetter pasienten for økt risiko for blødning.

Ved mistanke om overdosering kan koagulasjonstester være nyttige for å vurdere blødningsrisikoen (se pkt. 4.4 og 5.1). Kalibrert kvantitativ dTT-test eller gjentatte dTT-målinger gjør det mulig å forutsi når visse dabigatran-nivåer vil bli nådd (se pkt. 5.1), også ved tilleggsprosedyrer som dialyse.

Overdreven antikoagulasjon kan kreve at dabigatraneteksilatbehandlingen avbrytes. Siden dabigatran hovedsakelig skilles ut gjennom nyrene må adekvat diurese opprettholdes. Siden proteinbindingen er lav, kan dabigatran fjernes ved dialyse. Det finnes begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren fra kliniske studier (se pkt. 5.2).

### Håndtering av blødningskomplikasjoner

Ved blødningskomplikasjoner må dabigatraneteksilatbehandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Avhengig av den kliniske situasjonen skal passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og blodvolumerstatning, utføres etter forskriverens skjønn.

I situasjoner der det er nødvendig med rask reversering av den antikoagulerende effekten av dabigatran er det spesifikke reverserende midlet (idarosizumab) som motvirker den farmakodynamiske effekten av dabigatran, tilgjengelig for voksne pasienter. Effekt og sikkerhet av idarosizumab har ikke blitt fastslått hos pediatriske pasienter (se pkt. 4.4).

Koagulasjonsfaktorkonsentrater (aktiverte eller ikke-aktiverte) eller rekombinant faktor VIIa kan overveies. Det finnes eksperimentelle bevis som støtter disse legemidlenes funksjon i å reversere den antikoagulerende effekten av dabigatran, men data vedrørende klinisk nytte og vedrørende mulig risiko for rebound-effekt av tromboembolisme er svært begrenset. Koagulasjonstester kan være upålitelige etter administrering av de foreslåtte koagulasjonsfaktorkonsentratene. Resultatene bør tolkes med forsiktighet ved bruk av disse testene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også overveies. All symptomatisk behandling bør gis ut fra klinisk vurdering.

Avhengig av lokal tilgjengelighet bør det overveies om en spesialist innen koagulasjon bør konsulteres ved større blødninger.

## **5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER**

### **5.1 Farmakodynamiske egenskaper**

Farmakoterapeutisk gruppe: antitrombotiske midler, direkte trombinhemmere, ATC-kode: B01AE07

#### Virkningsmekanisme

Dabigatraneteksilat er et småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet. Etter oral administrering absorberes dabigatraneteksilat raskt og omdannes til dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og i leveren. Dabigatran er en potent, kompetitiv, reversibel direkte trombinhemmer og står for hovedaktiviteten i plasma.

Siden trombin (serinprotease) muliggjør omdannelsen av fibrinogen til fibrin i koagulasjonskaskaden, vil en hemming av trombin forebygge utviklingen av tromber. Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon.

#### Farmakodynamiske effekter

*In vivo* og *ex vivo* dyrestudier har vist antitrombotisk effekt og antikoagulasjonsaktivitet for dabigatran etter intravenøs administrering og for dabigatraneteksilat etter oral administrering i flere trombosemodeller hos dyr.

Det er en klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjonen av dabigatran og graden av antikoagulasjonseffekt på bakgrunn av fase II-studier. Dabigatran forlenger trombintiden (TT), ECT, og aPTT.

Kalibrert kvantitativ fortynnet trombotest (dTT) gir et estimat av plasmakonsentrasjonen av dabigatran som kan sammenlignes med forventet plasmakonsentrasjon av dabigatran. Når den kalibrerte dTT-analysen gir en plasmakonsentrasjon av dabigatran på eller under kvantifiseringsgrensen, bør det vurderes å foreta en ytterligere koagulasjonsanalyse som TT, ECT eller aPTT.

ECT kan gi en direkte måling av aktiviteten til direkte trombinhemmere.

aPTT-testen er lett tilgjengelig og gir en tilnærmet indikasjon på antikoagulasjonsintensiteten som oppnås med dabigatran. aPTT-testen har imidlertid begrenset sensitivitet og er ikke egnet for nøyaktig kvantifisering av antikoagulerende effekt, spesielt ved høye plasmakonsentrasjoner av dabigatran. Selv om høye aPTT-verdier bør tolkes med forsiktighet, indikerer en høy aPTT-verdi at pasienten er antikoagulert.

Generelt kan man anta at målingene av antikoagulasjonsaktivitet kan reflektere dabigatran-nivåer og gi en veiledning for vurdering av blødningsrisiko. Mer enn 90. persentilen av dabigatran bunnkonsentrasjon eller en koagulasjonsundersøkelse som aPTT målt ved bunnkonsentrasjon (se pkt. 4.4, tabell 6 for aPTT-terskelverdier) regnes som assosiert med økt blødningsrisiko.

#### Primær forebyggelse av VTE ved ortopedisk kirurgi

Maksimal plasmakonsentrasjon (geometrisk gjennomsnitt) av dabigatran ved steady-state (etter dag 3), målt omtrent 2 timer etter administrering av 220 mg dabigatraneteksilat, var 70,8 ng/ml, med intervall 35,2-162 ng/ml (25.-75. persentil). Bunnkonsentrasjon av dabigatran (geometrisk gjennomsnitt), målt ved slutten av doseringsintervallet (dvs. 24 timer etter en dabigatrandose på 220 mg), var i gjennomsnitt 22,0 ng/ml, med intervall på 13,0-35,7 ng/ml (25.-75. persentil).

I en egen studie hvor man kun undersøkte pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance, CrCL 30-50 ml/min) behandlet med dabigatraneteksilat 150 mg én gang daglig, var bunnkonsentrasjonen av dabigatran (geometrisk gjennomsnitt), målt ved slutten av doseringsintervallet, i gjennomsnitt 47,5 ng/ml, med intervall på 29,6-72,2 ng/ml (25.-75. persentil).

Hos pasienter behandlet med 220 mg dabigatraneteksilat én gang daglig for forebyggelse av venøse tromboemboliske hendelser etter hofte- eller kneprotesekirurgi

- var 90. persentilen av plasmakonsentrasjoner av dabigatran 67 ng/ml, målt ved bunn (20-28 timer etter foregående dose) (se pkt. 4.4 og 4.9)
- var 90. persentilen av aPTT 51 sekunder ved bunnkonsentrasjon (20-28 timer etter foregående dose), som tilsvarer 1,3 ganger øvre normalgrense

ECT ble ikke målt hos pasienter behandlet med 220 mg dabigatraneteksilat én gang daglig for forebyggelse av venøse tromboemboliske hendelser etter hofte- eller kneprotesekirurgi.

#### Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer

Maksimal plasmakonsentrasjon (geometrisk gjennomsnitt) av dabigatran ved steady-state, målt omtrent 2 timer etter administrering av 150 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig, var 175 ng/ml, med intervall 117-275 ng/ml (25.-75. persentil). Bunnkonsentrasjon av dabigatran (geometrisk gjennomsnitt), målt ved bunnivå om morgenen, ved slutten av doseringsintervallet (dvs. 12 timer etter kveldsdosen med dabigatran på 150 mg), var i gjennomsnitt 91,0 ng/ml, med intervall 61,0-143 ng/ml (25.-75. persentil).

For pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer behandlet med 150 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig for forebyggelse av slag og systemisk embolisme:

- 90. persentilen av plasmakonsentrasjoner av dabigatran målt ved bunn (10-16 timer etter foregående dose) var omtrent 200 ng/ml.
- ECT ved bunnkonsentrasjon (10-16 timer etter foregående dose), tilnærmet økt 3 ganger øvre normalgrense, refererer til observert 90. persentil av ECT-forlengelse på 103 sekunder.
- aPTT-ratio større enn 2 ganger øvre normalgrense (aPTT-forlengelse på omtrent 80 sekunder), ved bunnkonsentrasjon (10-16 timer etter foregående dose) reflekterer 90. persentil av observasjonene.

#### Behandling av DVT og LE og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne (DVT/LE)

Hos pasienter behandlet for DVT og LE med 150 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig, var bunnkonsentrasjon av dabigatran (geometrisk gjennomsnitt), målt innen 10-16 timer etter inntak, ved slutten av doseringsintervallet (dvs. 12 timer etter kveldsdosen med 150 mg dabigatran), 59,7 ng/ml, med intervall 38,6-94,5 ng/ml (25.-75. persentil). For behandling av DVT og LE med dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig:

- 90. persentilen av plasmakonsentrasjoner av dabigatran målt ved bunn (10-16 timer etter foregående dose) var omtrent 146 ng/ml.
- ECT ved bunnkonsentrasjon (10-16 timer etter foregående dose), tilnærmet økt 2,3 ganger sammenlignet med baseline, refererer til observert 90. persentil av ECT-forlengelse på 74 sekunder.
- 90. persentilen av aPTT ved bunnkonsentrasjon (10-16 timer etter foregående dose) var 62 sekunder, som tilsvarer 1,8 ganger sammenlignet med baseline.

Hos pasienter som behandles for forebyggelse av residiverende DVT og LE med 150 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig, er ingen farmakokinetiske data tilgjengelig.

### Klinisk effekt og sikkerhet

#### *Etnisk opprinnelse*

Ingen klinisk relevante etniske forskjeller ble observert blant kaukasiske, afro-amerikanske, latinamerikanske, japanske eller kinesiske pasienter.

#### Kliniske studier av forebyggelse av VTE etter større leddprotesekirurgi

I 2 store, randomiserte, dobbeltblinde, dosebekreftende kliniske parallellgruppestudier fikk pasienter som gjennomgikk større elektive ortopediske inngrep (én studie med kneprotesekirurgi og én studie med hofteprotesekirurgi) 75 mg eller 110 mg dabigatraneteksilat innen 1-4 timer etter inngrepet og deretter 150 mg eller 220 mg én gang daglig, ved etablert hemostase, eller enoksaparin 40 mg dagen før inngrepet og deretter daglig.

I RE-MODEL-studien (kneprotese) varte behandlingen i 6-10 dager, og i RE-NOVATE-studien (hofteprotese) varte behandlingen i 28-35 dager. Totalt ble henholdsvis 2076 (kne) og 3494 (hofte) pasienter behandlet.

Samlet forekomst av VTE (inkludert LE, proksimal og distal DVT, både symptomatisk og asymptomatisk, påvist ved rutinevenografi) og mortalitet av alle årsaker utgjorde det primære endepunktet i begge studiene. Samlet forekomst av større VTE (inkludert LE og proksimal DVT, både symptomatisk og asymptomatisk, påvist ved rutinevenografi) og VTE-relatert mortalitet var det sekundære endepunktet og anses å ha bedre klinisk relevans.

Begge studiene viste at den antitrombotiske effekten av 220 mg og 150 mg dabigatraneteksilat var statistisk ikke-underlegen i forhold til effekten av enoksaparin med hensyn til total VTE mortalitet av alle årsaker. Punktestimatet for forekomst av større VTE og VTE-relatert mortalitet for dosen på 150 mg var litt dårligere enn ved bruk av enoksaparin (tabell 19). Det ble observert bedre resultater med dosen på 220 mg, hvor punktestimatet for større VTE var litt bedre enn ved bruk av enoksaparin (tabell 19).

De kliniske studiene er utført i en pasientpopulasjon med en gjennomsnittsalder > 65 år.

Det var ingen forskjeller mellom menn og kvinner i de kliniske fase 3-studiene av sikkerhet og effekt.



I pasientpopulasjonen i RE-MODEL og RE-NOVATE (5539 behandlede pasienter) hadde 51 % samtidig hypertensjon, 9 % samtidig diabetes, 9 % samtidig koronarsykdom og 20 % hadde venøs insuffisiens i anamnesen. Ingen av disse sykdommene ble vist å påvirke effekten av dabigatran på forebyggelse av VTE eller blødningsfrekvens.

Data for endepunktene større VTE og VTE-relatert mortalitet var homogene med hensyn til det primære endepunktet og er vist i tabell 19.

Data for endepunktene total VTE og mortalitet av alle årsaker er vist i tabell 20.

Data for endepunktet påviste større blødninger er vist i tabell 21.

**Tabell 19: Analyse av større VTE og VTE-relatert mortalitet i behandlingsperioden i RE-MODEL- og RE-NOVATE-studiene knyttet til ortopediske kirurgiske inngrep**

| Studie                       | Dabigatraneteksilat<br>220 mg<br>én gang daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>én gang daglig | Enoksaparin<br>40 mg |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| RE-NOVATE (hofte)            |                                                 |                                                 |                      |
| N                            | 909                                             | 888                                             | 917                  |
| Forekomst (%)                | 28 (3,1)                                        | 38 (4,3)                                        | 36 (3,9)             |
| Risikoratio over enoksaparin | 0,78                                            | 1,09                                            |                      |
| 95 % KI                      | 0,48; 1,27                                      | 0,70; 1,70                                      |                      |
| RE-MODEL (kne)               |                                                 |                                                 |                      |
| N                            | 506                                             | 527                                             | 511                  |
| Forekomst (%)                | 13 (2,6)                                        | 20 (3,8)                                        | 18 (3,5)             |
| Risikoratio over enoksaparin | 0,73                                            | 1,08                                            |                      |
| 95 % KI                      | 0,36; 1,47                                      | 0,58; 2,01                                      |                      |

**Tabell 20: Analyse av total VTE og mortalitet av alle årsaker i behandlingsperioden i RE-NOVATE- og RE-MODEL-studiene knyttet til ortopediske kirurgiske inngrep**

| Studie                       | Dabigatraneteksilat<br>220 mg<br>én gang daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>én gang daglig | Enoksaparin<br>40 mg |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| RE-NOVATE (hofte)            |                                                 |                                                 |                      |
| N                            | 880                                             | 874                                             | 897                  |
| Forekomst (%)                | 53 (6,0)                                        | 75 (8,6)                                        | 60 (6,7)             |
| Risikoratio over enoksaparin | 0,9                                             | 1,28                                            |                      |
| 95 % KI                      | (0,63; 1,29)                                    | (0,93; 1,78)                                    |                      |
| RE-MODEL (kne)               |                                                 |                                                 |                      |
| N                            | 503                                             | 526                                             | 512                  |
| Forekomst (%)                | 183 (36,4)                                      | 213 (40,5)                                      | 193 (37,7)           |
| Risikoratio over enoksaparin | 0,97                                            | 1,07                                            |                      |
| 95 % KI                      | (0,82; 1,13)                                    | (0,92; 1,25)                                    |                      |

**Tabell 21: Større blødningshendelser (MBE) ved hver behandling i RE-MODEL- og RE-NOVATE-studiene**

| Studie                 | Dabigatraneteksilat<br>220 mg<br>én gang daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>én gang daglig | Enoksaparin<br>40 mg |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| RE-NOVATE (hofte)      |                                                 |                                                 |                      |
| Behandlede pasienter N | 1146                                            | 1163                                            | 1154                 |
| Antall MBE N (%)       | 23 (2,0)                                        | 15 (1,3)                                        | 18 (1,6)             |
| RE-MODEL (kne)         |                                                 |                                                 |                      |
| Behandlede pasienter N | 679                                             | 703                                             | 694                  |
| Antall MBE N (%)       | 10 (1,5)                                        | 9 (1,3)                                         | 9 (1,3)              |

Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer

Den kliniske evidensen for effekten av dabigatraneteksilat kommer fra RE-LY-studien (Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapy), som var en multisenter, multinasjonal, randomisert, parallellgruppestudie som sammenlignet to blinde doser dabigatraneteksilat (110 mg og 150 mg to ganger daglig) med åpen warfarinbehandling hos pasienter med atrieflimmer og moderat til høy risiko for slag og systemisk embolisme. Hovedhensikten med studien var å fastslå om dabigatraneteksilat var ikke-underlegen i forhold til warfarin for reduksjon av de kombinerte endepunktene slag og systemisk embolisme. En analyse av statistisk overlegenhet ble også gjennomført.

I RE-LY-studien ble det randomisert totalt 18 113 pasienter med en gjennomsnittsalder på 71,5 år og en gjennomsnittlig CHADS2-skår på 2,1. Pasientpopulasjonen besto av 64 % menn – 70 % kaukasiere og 16 % asiater. For pasienter som ble randomisert til warfarin, var gjennomsnittlig prosent av tid i terapeutisk område (TTR) (INR 2-3) 64,4 % (median TTR 67 %).

RE-LY-studien viste at 110 mg dabigatraneteksilat gitt to ganger daglig er ikke-underlegen i forhold til warfarin når det gjelder forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer og redusert risiko for intrakraniell blødning, total blødning og større blødninger. En dose på 150 mg dabigatraneteksilat gitt to ganger daglig viste en statistisk signifikant reduksjon i risiko for iskemisk og hemoragisk slag, vaskulær død, intrakraniell blødning, og total blødning sammenlignet med warfarin. Antall større blødninger ved denne dosen var sammenlignbar med warfarin.

Antall hjerteinfarkt var noe økt med dabigatraneteksilat 110 mg to ganger daglig og 150 mg to ganger daglig sammenlignet med warfarin (hazard ratio henholdsvis 1,29; p = 0,0929 og hazard ratio 1,27; p = 0,1240). Med en forbedret overvåking av INR vil de observerte fordelene ved dabigatraneteksilat avta i forhold til warfarin.

Tabell 22-24 viser nøkkelresultater i hele populasjonen.

**Tabell 22: Analyse av første tilfelle av slag eller systemisk embolisme (primært endepunkt) i løpet av studieperioden i RE-LY-studien**

|                        | Dabigatraneteksilat<br>110 mg<br>to ganger daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Randomiserte pasienter | 6015                                              | 6076                                              | 6022     |

|                                     |                   |                   |            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Slag og/eller systemisk embolisme   |                   |                   |            |
| Forekomst (%)                       | 183 (1,54)        | 135 (1,12)        | 203 (1,72) |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 0,89 (0,73; 1,09) | 0,65 (0,52; 0,81) |            |
| p-verdi overlegenhet                | p = 0,2721        | p = 0,0001        |            |

% refererer til årlig hendelsesrate

**Tabell 23: Analyse av første tilfelle av iskemisk eller hemoragisk slag i løpet av studieperioden i RE-LY-studien**

|                                     | Dabigatraneteksilat<br>110 mg<br>to ganger daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Randomiserte pasienter              | 6015                                              | 6076                                              | 6022       |
| Slag                                |                                                   |                                                   |            |
| Forekomst (%)                       | 171 (1,44)                                        | 123 (1,02)                                        | 187 (1,59) |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 0,91 (0,74; 1,12)                                 | 0,64 (0,51; 0,81)                                 |            |
| p-verdi                             | 0,3553                                            | 0,0001                                            |            |
| Systemisk embolisme                 |                                                   |                                                   |            |
| Forekomst (%)                       | 15 (0,13)                                         | 13 (0,11)                                         | 21 (0,18)  |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 0,71 (0,37; 1,38)                                 | 0,61 (0,30; 1,21)                                 |            |
| p-verdi                             | 0,3099                                            | 0,1582                                            |            |
| Iskemisk slag                       |                                                   |                                                   |            |
| Forekomst (%)                       | 152 (1,28)                                        | 104 (0,86)                                        | 134 (1,14) |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 1,13 (0,89; 1,42)                                 | 0,76 (0,59; 0,98)                                 |            |
| p-verdi                             | 0,3138                                            | 0,0351                                            |            |
| Hemoragisk slag                     |                                                   |                                                   |            |
| Forekomst (%)                       | 14 (0,12)                                         | 12 (0,10)                                         | 45 (0,38)  |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 0,31 (0,17; 0,56)                                 | 0,26 (0,14; 0,49)                                 |            |
| p-verdi                             | 0,0001                                            | < 0,0001                                          |            |

% refererer til årlig hendelsesrate

**Tabell 24: Analyse av total og kardiovaskulær overlevelse i løpet av studieperioden i RE-LY-studien**

|                        | Dabigatraneteksilat<br>110 mg<br>to ganger daglig | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Randomiserte pasienter | 6015                                              | 6076                                              | 6022     |
| Totalmortalitet        |                                                   |                                                   |          |

|                                     |                   |                   |            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Forekomst (%)                       | 446 (3,75)        | 438 (3,64)        | 487 (4,13) |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 0,91 (0,80; 1,03) | 0,88 (0,77; 1,00) |            |
| p-verdi                             | 0,1308            | 0,0517            |            |
| Vaskulær mortalitet                 |                   |                   |            |
| Forekomst (%)                       | 289 (2,43)        | 274 (2,28)        | 317 (2,69) |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % KI) | 0,90 (0,77; 1,06) | 0,85 (0,72; 0,99) |            |
| p-verdi                             | 0,2081            | 0,0430            |            |

% refererer til årlig hendelsesrate

Tabell 25-26 angir resultater av primært effekt- og sikkerhetsendepunkt i relevante underpopulasjoner:

For det primære endepunktet slag og systemisk embolisme ble det ikke identifisert noen forskjell i risikoratio i noen av undergruppene (dvs. alder, vekt, kjønn, nyrefunksjon, etnisitet osv.) sammenlignet med warfarin.

**Tabell 25: Hazard ratio og 95 % KI for slag / systemisk embolisme etter undergruppe**

| Endepunkt     | Dabigatraneteksilat<br>110 mg to ganger daglig vs.<br>warfarin | Dabigatraneteksilat<br>150 mg to ganger daglig vs.<br>warfarin |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alder (år)    |                                                                |                                                                |
| < 65          | 1,10 (0,64; 1,87)                                              | 0,51 (0,26; 0,98)                                              |
| 65 til < 75   | 0,86 (0,62; 1,19)                                              | 0,67 (0,47; 0,95)                                              |
| ≥ 75          | 0,88 (0,66; 1,17)                                              | 0,68 (0,50; 0,92)                                              |
| ≥ 80          | 0,68 (0,44; 1,05)                                              | 0,67 (0,44; 1,02)                                              |
| CrCL (ml/min) |                                                                |                                                                |
| ≤ 30 og < 50  | 0,89 (0,61; 1,31)                                              | 0,48 (0,31; 0,76)                                              |
| ≤ 50 og < 80  | 0,91 (0,68; 1,20)                                              | 0,65 (0,47; 0,88)                                              |
| ≥ 80          | 0,81 (0,51; 1,28)                                              | 0,69 (0,43; 1,12)                                              |

For det primære sikkerhetsendepunktet større blødning var det en interaksjon mellom behandlingseffekt og alder. Den relative blødningsrisikoen med dabigatran sammenlignet med warfarin økte med alderen. Relativ risiko var høyest hos pasienter ≥ 75 år. MBE-forholdet ble omtrent fordoblet både med dabigatraneteksilat og warfarin ved samtidig bruk av platehemmere, ASA eller klopido-rel. Det var ingen signifikant interaksjon mellom behandlingseffekt og undergruppene nyrefunksjon og CHADS2-skår.

**Tabell 26: Hazard ratio og 95 % KI for større blødning etter undergruppe**

| Endepunkt    | Dabigatraneteksilat<br>110 mg to ganger daglig vs.<br>warfarin | Dabigatraneteksilat<br>150 mg to ganger daglig vs.<br>warfarin |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alder (år)   |                                                                |                                                                |
| < 65         | 0,32 (0,18; 0,57)                                              | 0,35 (0,20; 0,61)                                              |
| ≤ 65 og < 75 | 0,71 (0,56; 0,89)                                              | 0,82 (0,66; 1,03)                                              |
| ≥ 75         | 1,01 (0,84; 1,23)                                              | 1,19 (0,99; 1,43)                                              |
| ≥ 80         | 1,14 (0,86; 1,51)                                              | 1,35 (1,03; 1,76)                                              |

| CrCL (ml/min)        |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| ≤ 30 og < 50         | 1,02 (0,79; 1,32) | 0,94 (0,73; 1,22) |
| ≤ 50 og < 80         | 0,75 (0,61; 0,92) | 0,90 (0,74; 1,09) |
| ≥ 80                 | 0,59 (0,43; 0,82) | 0,87 (0,65; 1,17) |
| Bruk av ASA          | 0,84 (0,69; 1,03) | 0,97 (0,79; 1,18) |
| Bruk av klopidoogrel | 0,89 (0,55; 1,45) | 0,92 (0,57; 1,48) |

*RELY-ABLE (Long term multi-center extension of dabigatran treatment in patients with atrial fibrillation who completed the RE-LY trial)*

Oppfølgingsstudien til RE-LY (RELY-ABLE) ga ytterligere sikkerhetsinformasjon for en kohort pasienter som fortsatte med samme dose dabigatraneteksilat som i RE-LY-studien. Pasienter var kvalifisert for RELY-ABLE-studien hvis de ikke hadde seponert studielegemidlet permanent ved siste kontroll i RE-LY-studien. Inkluderte pasienter fortsatte på samme dobbeltblinde dabigatraneteksilatdose som var tilfeldig allokert i RE-LY, i inntil 43 måneders oppfølging etter RE-LY (total gjennomsnittlig oppfølging RE-LY + RELY-ABLE, 4,5 år). 5897 pasienter ble inkludert. Det representerer 49 % av pasientene som opprinnelig ble randomisert til å få dabigatraneteksilat i RE-LY og 86 % av pasientene som var kvalifisert for RELY-ABLE.

I løpet av de 2,5 ekstra behandlingsårene i RELY-ABLE, med maksimal eksponering i over 6 år (total eksponering i RELY + RELY-ABLE), ble langtidssikkerhetsprofilen for dabigatraneteksilat bekreftet for begge studiedosene; 110 mg to ganger daglig og 150 mg to ganger daglig. Ingen nye sikkerhetsfunns ble observert. Forekomsten av hendelser, inkludert større og andre blødningshendelser, var i overensstemmelse med det som ble sett i RE-LY.

#### *Data fra ikke-intervensjonsstudier*

I en ikke-intervensjonsstudie (GLORIA-AF) ble det prospektivt samlet inn (i studiens andre fase) data vedrørende sikkerhet og effekt hos nydiagnostiserte pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer behandlet i vanlig praksis. Studien inkluderte 4859 pasienter på dabigatraneteksilat (55 % behandlet med 150 mg to ganger daglig, 43 % behandlet med 110 mg to ganger daglig, 2 % behandlet med 75 mg to ganger daglig). Pasientene ble fulgt opp i 2 år. Gjennomsnittlig CHADS<sub>2</sub>- og HAS-BLED-verdier var henholdsvis 1,9 og 1,2. Gjennomsnittlig oppfølgingstid på behandling var 18,3 måneder. Større blødninger forekom hos 0,97 per 100 pasientår. Livstruende blødning ble rapportert hos 0,46 per 100 pasientår, intrakraniell blødning hos 0,17 per 100 pasientår og gastrointestinal blødning hos 0,60 per 100 pasientår. Slag forekom hos 0,65 per 100 pasientår.

I en ikke-intervensjonsstudie [Graham DJ et al., Circulation. 2015;131:157-164] med mer enn 134 000 eldre pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer i USA (som bidro med over 37 500 pasientår med oppfølgingstid på behandling) ble dessuten dabigatraneteksilat (84 % av pasientene behandlet med 150 mg to ganger daglig, 16 % av pasientene behandlet med 75 mg to ganger daglig) assosiert med en redusert risiko for iskemisk slag (hazard ratio 0,80, 95 % konfidensintervall [KI] 0,67-0,96), intrakraniell blødning (hazard ratio 0,34, KI 0,26-0,46), mortalitet (hazard ratio 0,86, KI 0,77-0,96) og økt risiko for gastrointestinal blødning (hazard ratio 1,28, KI 1,14-1,44) sammenlignet med warfarin. Det ble ikke funnet noen forskjell med hensyn til større blødninger (hazard ratio 0,97, KI 0,88-1,07).

Disse observasjonene ved behandling i vanlig praksis er i samsvar med den etablerte sikkerhets- og effektprofilen for dabigatraneteksilat i RE-LY-studien ved denne indikasjonen.

*Pasienter som har fått utført perkutan koronar intervensjon (PCI) med stenting*

Det ble utført en prospektiv, randomisert, åpen studie med blindet endepunkt (PROBE) (fase IIIb) for å evaluere dobbelbehandling med dabigatraneteksilat (110 mg eller 150 mg to ganger daglig) pluss klopido­grel eller tikagrelor (P2Y<sub>12</sub>-antagonist) vs. trippelbehandling med warfarin (justert til en INR på 2,0-3,0) pluss klopido­grel eller tikagrelor og acetylsalisylsyre hos 2725 pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer som fikk utført PCI med stenting (RE-DUAL PCI). Pasienter ble randomisert til dobbelbehandling med dabigatraneteksilat 110 mg to ganger daglig, dobbelbehandling med dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig eller trippelbehandling med warfarin. Eldre pasienter utenfor USA ( $\geq 80$  år for alle land,  $\geq 70$  år for Japan) ble randomisert til gruppen som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat 110 mg eller gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin. Det primære endepunktet var et kombinert endepunkt av større blødninger basert på ISTH-definisjon eller klinisk relevante ikke-alvorlige blødninger.

Forekomsten av det primære endepunktet var 15,4 % (151 pasienter) i gruppen som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat 110 mg sammenlignet med 26,9 % (264 pasienter) i gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (HR 0,52; 95 % KI 0,42, 0,63;  $P < 0,0001$  for ikke-underlegenhet og  $P < 0,0001$  for overlegenhet) og 20,2 % (154 pasienter) i gruppen som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat 150 mg sammenlignet med 25,7 % (196 pasienter) i den tilsvarende gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (HR 0,72; 95 % KI 0,58, 0,88;  $P < 0,0001$  for ikke-underlegenhet og  $P = 0,002$  for overlegenhet). Som en del av den beskrivende analysen, var alvorlige TIMI-blødningshendelser (trombolysed ved hjerteinfarkt) lavere i begge gruppene som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat enn i gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin: 14 hendelser (1,4 %) i gruppen som fikk dobbelbehandling med 110 mg dabigatraneteksilat sammenlignet med 37 hendelser (3,8 %) i gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (HR 0,37; 95 % KI 0,20, 0,68;  $P = 0,002$ ) og 16 hendelser (2,1 %) i gruppen som fikk dobbelbehandling med 150 mg dabigatraneteksilat sammenlignet med 30 hendelser (3,9 %) i den tilsvarende gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (HR 0,51; 95 % KI 0,28, 0,93;  $P = 0,03$ ). Begge gruppene som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat, hadde lavere forekomst av intrakraniell blødning enn den tilsvarende gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin: 3 hendelser (0,3 %) i gruppen som fikk dobbelbehandling med 110 mg dabigatraneteksilat sammenlignet med 10 hendelser (1,0 %) i gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (HR 0,30; 95 % KI 0,08, 1,07;  $P = 0,06$ ) og 1 hendelse (0,1 %) i gruppen som fikk dobbelbehandling med 150 mg dabigatraneteksilat sammenlignet med 8 hendelser (1,0 %) i den tilsvarende gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (HR 0,12; 95 % KI 0,02, 0,98;  $P = 0,047$ ). Forekomsten av de sammensatte effektendepunktene død, tromboembolisme (hjerteinfarkt, slag eller systemisk embolisme) eller ikke planlagt revaskularisering i de to gruppene som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat, var ikke-underlegen i forhold til gruppen som fikk trippelbehandling med warfarin (henholdsvis 13,7 % versus 13,4 %; HR 1,04; 95 % KI: 0,84, 1,29;  $P = 0,0047$  for ikke-underlegenhet). Det var ingen statistiske forskjeller i enkeltkomponentene i effektendepunktene mellom noen av gruppene som fikk dobbelbehandling med dabigatraneteksilat og trippelbehandling med warfarin.

Denne studien viste at dobbelbehandling med dabigatraneteksilat og en P2Y<sub>12</sub>-antagonist reduserte risikoen for blødning signifikant sammenlignet med trippelbehandling med warfarin, med ikke-underlegenhet for sammensatte tromboemboliske hendelser hos pasienter med atrieflimmer som har fått utført PCI med stenting.

#### Behandling av DVT og LE hos voksne (DVT/LE-behandling)

Effekt og sikkerhet ble undersøkt i to multisenter, randomiserte, dobbelblinde, parallellgruppe replikatstudier – RE-COVER og RE-COVER II. Disse studiene sammenlignet dabigatraneteksilat (150 mg to ganger daglig) og warfarin (mål-INR 2,0-3,0) hos pasienter med akutt DVT og/eller LE. Hovedhensikten med studiene var å fastslå om dabigatraneteksilat var ikke-underlegen i forhold til warfarin med hensyn til redusert forekomst av det primære endepunktet som var en kombinasjon av residiverende DVT og/eller LE og relaterte dødsfall i løpet av en 6-måneders behandlingsperiode.

I de samlede RE-COVER- og RE-COVER II-studiene ble totalt 5153 pasienter randomisert og 5107 behandlet.

Behandlingsvarigheten med fast dose dabigatran var 174,0 dager uten koagulasjonsovervåkning. For pasienter randomisert til warfarin var median tid i terapeutisk område (INR 2,0 til 3,0) 60,6 %.

Studiene viste at behandling med dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig ikke var dårligere enn behandling med warfarin (ikke-underlegenhetsmargin for RE-COVER og RE-COVER II: 3,6 for risikodifferanse og 2,75 for hazard ratio).

**Tabell 27: Analyse av primære og sekundære effektendepunkter (VTE er sammensatt av DVT og/eller LE) frem til slutten av observasjonsperioden etter behandling for studiene RE-COVER og RE-COVER II samlet**

|                                                               | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Behandlede pasienter                                          | 2553                                              | 2554        |
| Residiverende symptomatisk VTE<br>og VTE-relatert død         | 68 (2,7 %)                                        | 62 (2,4 %)  |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 %<br>konfidensintervall)        | 1,09<br>(0,77; 1,54)                              |             |
| Sekundære effektendepunkter                                   |                                                   |             |
| Residiverende symptomatisk VTE<br>og dødsfall av enhver årsak | 109 (4,3 %)                                       | 104 (4,1 %) |
| 95 % konfidensintervall                                       | 3,52; 5,13                                        | 3,34; 4,91  |
| Symptomatisk DVT                                              | 45 (1,8 %)                                        | 39 (1,5 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                       | 1,29; 2,35                                        | 1,09; 2,08  |
| Symptomatisk LE                                               | 27 (1,1 %)                                        | 26 (1,0 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                       | 0,70; 1,54                                        | 0,67; 1,49  |
| VTE-relaterte dødsfall                                        | 4 (0,2 %)                                         | 3 (0,1 %)   |
| 95 % konfidensintervall                                       | 0,04; 0,40                                        | 0,02; 0,34  |
| Dødsfall av enhver årsak                                      | 51 (2,0 %)                                        | 52 (2,0 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                       | 1,49; 2,62                                        | 1,52; 2,66  |

Forebygging av residiverende DVT og LE hos voksne (DVT/LE-profylakse)

To randomiserte, dobbelblinde parallellgruppestudier ble utført med pasienter tidligere behandlet med antikoagulasjonsterapi. RE-MEDY, en warfarinkontrollert studie, inkluderte pasienter som allerede var behandlet

i 3 til 12 måneder og som hadde behov for ytterligere antikoagulasjonsbehandling, og RE-SONATE, en placebokontrollert studie, inkluderte pasienter allerede behandlet i 6 til 18 måneder med vitamin K-antagonister.

Hensikten med RE-MEDY-studien var å sammenligne sikkerhet og effekt av oralt dabigatraneteksilat (150 mg to ganger daglig) med warfarin (mål-INR 2,0-3,0) til langtidsbehandling og forebygging av residiverende, symptomatisk DVT og/eller LE. Totalt 2866 pasienter ble randomisert og 2856 pasienter ble behandlet. Behandlingsvarigheten med dabigatraneteksilat varierte fra 6 til 36 måneder (median 534,0 dager). For pasienter randomisert til warfarin var median tid i terapeutisk område (INR 2,0 til 3,0) 64,9 %.

RE-MEDY viste at behandling med dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig ikke var dårligere enn warfarin (margin for ikke-underlegenhet: 2,85 for hazard ratio og 2,8 for risikodifferanse).

**Tabell 28: Analyse av primære og sekundære effektendepunkter (VTE er sammensatt av DVT og/eller LE) frem til slutten av observasjonsperioden etter behandling for RE-MEDY-studien**

|                                                            | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Warfarin   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Behandlede pasienter                                       | 1430                                              | 1426       |
| Residiverende symptomatisk VTE og VTE-relaterte dødsfall   | 26 (1,8 %)                                        | 18 (1,3 %) |
| Hazard ratio vs. warfarin (95 % konfidensintervall)        | 1,44<br>(0,78; 2,64)                              |            |
| Margin for ikke-underlegenhet                              | 2,85                                              |            |
| Pasienter med hendelse ved 18 måneder                      | 22                                                | 17         |
| Kumulativ risiko ved 18 måneder (%)                        | 1,7                                               | 1,4        |
| Risikodifferanse vs. warfarin (%)                          | 0,4                                               |            |
| 95 % konfidensintervall                                    |                                                   |            |
| Margin for ikke-underlegenhet                              | 2,8                                               |            |
| Sekundære effektendepunkter                                |                                                   |            |
| Residiverende symptomatisk VTE og dødsfall av enhver årsak | 42 (2,9 %)                                        | 36 (2,5 %) |
| 95 % konfidensintervall                                    | 2,12, 3,95                                        | 1,77, 3,48 |
| Symptomatisk DVT                                           | 17 (1,2 %)                                        | 13 (0,9 %) |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,69; 1,90                                        | 0,49; 1,55 |
| Symptomatisk LE                                            | 10 (0,7 %)                                        | 5 (0,4 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,34; 1,28                                        | 0,11; 0,82 |
| VTE-relaterte dødsfall                                     | 1 (0,1 %)                                         | 1 (0,1 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,00; 0,39                                        | 0,00; 0,39 |
| Dødsfall av enhver årsak                                   | 17 (1,2 %)                                        | 19 (1,3 %) |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,69; 1,90                                        | 0,80; 2,07 |

Hensikten med RE-SONATE-studien var å vurdere dabigatraneteksilats overlegenhet i forhold til placebo for forebygging av residiverende, symptomatisk DVT og/eller LE hos pasienter som allerede hadde fullført 6 til



18 måneders behandling med VKA. Planlagt behandling var 6 måneder med dabigatraneteksilat 150 mg to ganger daglig uten behov for overvåkning.

RE-SONATE viste at behandling med dabigatraneteksilat var bedre enn placebo til forebyggelse av residiverende, symptomatiske DVT/LE-hendelser, inkludert uforklarlige dødsfall, med en risikoreduksjon fra 5,6 % til 0,4 % (relativ risikoreduksjon 92 % basert på hazard ratio) i behandlingsperioden ( $p < 0,0001$ ). Alle sekundære analyser og sensitivitetsanalyser av det primære endepunktet og alle de sekundære endepunktene viste at dabigatraneteksilat var bedre enn placebo.

Studien inkluderte en 12-måneders observasjonsperiode etter avsluttet behandling. Etter seponering av studielegemidlet vedvarte effekten til slutten av oppfølgingsperioden, noe som indikerer at den initiale behandlingseffekten av dabigatraneteksilat ble opprettholdt. Ingen rebound-effekt ble observert. Ved slutten av oppfølgingsperioden var VTE-hendelser hos pasienter behandlet med dabigatraneteksilat 6,9 % vs. 10,7 % i placebogruppen (hazard ratio 0,61 (95 % KI 0,42, 0,88),  $p = 0,0082$ ).

**Tabell 29: Analyse av primære og sekundære effektendepunkter (VTE er sammensatt av DVT og/eller LE) frem til slutten av observasjonsperioden etter behandling for RE-SONATE-studien**

|                                                            | Dabigatraneteksilat<br>150 mg<br>to ganger daglig | Placebo    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Behandlede pasienter                                       | 681                                               | 662        |
| Residiverende symptomatisk VTE og relaterte dødsfall       | 3 (0,4 %)                                         | 37 (5,6 %) |
| Hazard ratio vs. placebo<br>(95 % konfidensintervall)      | 0,08<br>(0,02; 0,25)                              |            |
| p-verdi for overlegenhet                                   | < 0,0001                                          |            |
| Sekundære<br>effektendepunkter                             |                                                   |            |
| Residiverende symptomatisk VTE og dødsfall av enhver årsak | 3 (0,4 %)                                         | 37 (5,6 %) |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,09; 1,28                                        | 3,97; 7,62 |
| Symptomatisk DVT                                           | 2 (0,3 %)                                         | 23 (3,5 %) |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,04; 1,06                                        | 2,21; 5,17 |
| Symptomatisk LE                                            | 1 (0,1 %)                                         | 14 (2,1 %) |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,00; 0,82                                        | 1,16; 3,52 |
| VTE-relaterte dødsfall                                     | 0 (0)                                             | 0 (0)      |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,00; 0,54                                        | 0,00; 0,56 |
| Uforklarlige dødsfall                                      | 0 (0)                                             | 2 (0,3 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,00; 0,54                                        | 0,04; 1,09 |
| Dødsfall av enhver årsak                                   | 0 (0)                                             | 2 (0,3 %)  |
| 95 % konfidensintervall                                    | 0,00; 0,54                                        | 0,04; 1,09 |

Kliniske studier for forebyggelse av tromboembolisme hos pasienter med kunstige hjerteklaffer

En fase II-studie undersøkte dabigatraneteksilat og warfarin hos totalt 252 pasienter som nylig hadde fått operert inn kunstig hjerteklaff (dvs. i løpet av det gjeldende sykehusoppholdet), og hos pasienter som hadde fått satt inn kunstig hjerteklaff for mer enn 3 måneder siden. Flere tromboemboliske hendelser (hovedsakelig slag og symptomatiske/asymptomatiske tromboser i den kunstige klaffen) og flere blødningstilfeller ble observert med dabigatraneteksilat enn med warfarin. Større blødninger manifesterte seg i overveiende grad som hemoperikardium postoperativt, spesielt hos pasienter som startet tidlig med dabigatraneteksilatbehandling (dvs. fra dag 3) etter operasjon av kunstig hjerteklaff (se pkt. 4.3).

### Pediatrik populasjon

#### Kliniske studier av forebyggelse av VTE etter større leddprotesekirurgi

##### Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og én eller flere risikofaktorer

Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med referansepreparatet som inneholder dabigatraneteksilat i alle undergrupper av den pediatrike populasjonen ved indikasjonen primær forebyggelse av VTE hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi og indikasjonen forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (se pkt. 4.2 for informasjon om pediatrik bruk).

#### Behandling av VTE og forebyggelse av residiverende VTE hos pediatrike pasienter

DIVERSITY-studien ble utført for å vise effekt og sikkerhet av behandling med dabigatraneteksilat sammenlignet med standardbehandling ved VTE hos pediatrike pasienter fra fødsel til < 18 år. Studien ble designet som en åpen, randomisert, ikke-underlegen parallellgruppestudie. Pasientene ble randomisert i henhold til en 2:1-plan til enten en alderstilpasset formulering (kapsler, drasjert granulat eller mikstur) med dabigatraneteksilat (doser tilpasset alder og vekt) eller standardbehandling som besto av lavmolekylært heparin (LMWH) eller vitamin K-antagonister (VKA) eller fondaparinux (1 pasient på 12 år). Det primære endepunktet var et sammensatt endepunkt av pasienter med fullstendig trombeopløsning, fravær av residiverende VTE og fravær av mortalitet knyttet til VTE. Eksklusjonskriteriene inkluderte aktiv meningitt, encefalitt og intrakraniell abscess.

Totalt 267 pasienter ble randomisert. Av disse ble 176 pasienter behandlet med dabigatraneteksilat og 90 pasienter i henhold til standardbehandling (1 randomisert pasient ble ikke behandlet). 168 pasienter var 12 til < 18 år, 64 pasienter var 2 til < 12 år og 35 pasienter var yngre enn 2 år.

Av de 267 randomisert pasientene oppfylte 81 pasienter (45,8 %) i gruppen som fikk dabigatraneteksilat og 38 pasienter (42,2 %) i gruppen som fikk standardbehandling kriteriene for det primære sammensatte endepunktet (fullstendig trombeopløsning, fravær av residiverende VTE og fravær av mortalitet knyttet til VTE). Den tilsvarende frekvensforskjellen viste at dabigatraneteksilat er ikke-underlegen i forhold til standardbehandling. Generelt ble det også observert konsistente resultater på tvers av undergrupper: Det var ingen signifikante forskjeller i behandlingseffekt for undergrupper etter alder, kjønn, område og nærvær av visse risikofaktorer. For de 3 forskjellige aldersgruppene var andelen pasienter som oppfylte det primære effektendepunktet i gruppen som fikk dabigatraneteksilat og gruppen som fikk standardbehandling, henholdsvis 13/22 (59,1 %) og 7/13 (53,8 %) for pasienter fra fødsel til < 2 år, 21/43 (48,8 %) og 12/21 (57,1 %) for pasienter i alderen 2 til < 12 år og 47/112 (42,0 %) og 19/56 (33,9 %) for pasienter i alderen 12 til < 18 år.

Verifiserte større blødninger ble rapportert for 4 pasienter (2,3 %) i dabigatraneteksilat-gruppen og 2 pasienter (2,2 %) i gruppen som fikk standardbehandling. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i tiden til første større

blødningshendelse. Trettiåtte pasienter (21,6 %) i dabigatraneteksilat-gruppen og 22 pasienter (24,4 %) i gruppen som fikk standardbehandling, hadde verifiserte blødningshendelser; de fleste kategorisert som mindre. Det kombinerte endepunktet for verifisert større blødningshendelse eller klinisk relevant ikke-alvorlig blødning (under behandling) ble rapportert for 6 (3,4 %) pasienter i dabigatraneteksilat-gruppen og 3 (3,3 %) pasienter i gruppen som fikk standardbehandling.

Det ble utført en åpen, prospektiv kohort, multisenter fase III-sikkerhetsstudie med én arm (1160.108) for å vurdere sikkerheten av dabigatraneteksilat ved forebyggelse av residiverende VTE hos pediatrike pasienter fra fødsel til < 18 år. Pasienter med behov for ytterligere antikoagulasjon på grunn av nærvær av en klinisk risikofaktor etter å ha fullført den innledende behandlingen for bekreftet VTE (i minst 3 måneder) eller etter å ha fullført DIVERSITY-studien, kunne inkluderes i studien. Kvalifiserte pasienter fikk en alders- og vekttilpasset dose med alderstilpasset formulering (kapsler, drasjert granulat eller mikstur) med dabigatraneteksilat til den kliniske risikofaktoren ikke lenger var til stede, eller i maksimalt 12 måneder. De primære endepunktene i studien omfattet residiv av VTE, større og mindre blødningshendelser og mortalitet (totalt og relatert til trombotiske eller tromboemboliske hendelser) ved 6 og 12 måneder. Utfallshendelser ble verifisert av en uavhengig, blindet bedømmelseskommité.

Totalt 214 pasienter ble inkludert i studien. Blant dem var 162 pasienter i aldersgruppe 1 (fra 12 til < 18 år), 43 pasienter i aldersgruppe 2 (fra 2 til < 12 år) og 9 pasienter i aldersgruppe 3 (fra fødsel til < 2 år). I løpet av behandlingsperioden opplevde 3 pasienter (1,4 %) et verifisert VTE-residiv innen de første 12 månedene etter behandlingsstart.

Verifiserte blødningshendelser under behandlingsperioden ble rapportert for 48 pasienter (22,5 %) innen de første 12 månedene. De fleste blødningshendelsene var mindre. Hos 3 pasienter (1,4 %) oppsto det en verifisert større blødningshendelse innen de første 12 månedene. Hos 3 pasienter (1,4 %) oppsto det en verifisert klinisk relevant ikke-alvorlig blødning innen de første 12 månedene. Det forekom ingen dødsfall under behandling. Under behandlingsperioden utviklet 3 pasienter (1,4 %) post-trombotisk syndrom (PTS) eller fikk forverring av PTS innen de første 12 månedene.

## **5.2 Farmakokinetiske egenskaper**

Etter oral administrering omdannes dabigatraneteksilat raskt og fullstendig til dabigatran som er den aktive formen i plasma. Spaltingen av prodrug dabigatraneteksilat ved esterase-katalysert hydrolyse til virkestoffet dabigatran er den dominerende metabolske reaksjonen. Den absolutte biotilgjengeligheten for dabigatran etter oral administrering av dabigatraneteksilat var ca. 6,5 %.

Etter oral administrering av dabigatraneteksilat til friske frivillige karakteriseres den farmakokinetiske profilen til dabigatran i plasma av en rask økning av plasmakonsentrasjoner med oppnådd  $C_{max}$  etter 0,5 til 2 timer etter administrering.

### Absorpsjon

En studie som undersøkte postoperativ absorpsjon av dabigatraneteksilat 1-3 timer etter kirurgisk inngrep, viste relativt langsom absorpsjon sammenlignet med friske frivillige og viser en jevn plasmakonsentrasjon-tidskurve uten høye toppe. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås 6 timer etter administrering i en postoperativ periode på grunn av medvirkende faktorer som anestesi, gastrointestinal parese og kirurgiske effekter uavhengig av den orale legemiddelformuleringen. I en annen studie ble det vist at langsom og forsinket absorpsjon vanligvis bare forekom på operasjonsdagen. De påfølgende dager er absorpsjonen av dabigatran rask og maksimale plasmakonsentrasjoner oppnås 2 timer etter administrasjon av legemidlet.

Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten av dabigatraneteksilat, men forlenger tiden til maksimal plasmakonsentrasjon med 2 timer.

$C_{\max}$  og AUC var doseproporsjonale.

Den orale biotilgjengeligheten kan øke med 75 % etter en enkeltdose og med 37 % ved steady-state, sammenlignet med referansekapselformuleringen når pelletene tas uten kapselskallet av hydroksypropylmetylcellulose (HPMC). HPMC-kapslene skal derfor alltid svelges hele ved klinisk bruk for å unngå utilsiktet økning av biotilgjengeligheten av dabigatraneteksilat (se pkt. 4.2).

### Distribusjon

Det ble observert lav (34-35 %) konsentrasjonsuavhengig binding av dabigatran til humane plasmaproteiner. Distribusjonsvolumet for dabigatran på 60-70 l overskrider volumet av total kroppsvæske og indikerer moderat vevsdistribusjon for dabigatran.

### Biotransformasjon

Metabolisme og utskillelse av dabigatran ble studert etter en enkel intravenøs dose radioaktivt merket dabigatran hos friske menn. Etter en intravenøs dose ble radioaktivitet fra dabigatran hovedsakelig utskilt i urinen (85 %). Utskillelse i feces utgjorde 6 % av administrert dose. Totalt gjenfunnet radioaktivitet var i området 88-94 % av administrert dose 168 timer etter administrering.

Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Det finnes fire posisjonelle isomerer, 1-O-, 2-O-, 3-O-, 4-O-acylglukuronid, som hver utgjør mindre enn 10 % av totalt dabigatran i plasma. Spor av andre metabolitter kunne bare påvises ved hjelp av svært følsomme analysemetoder. Dabigatran elimineres hovedsakelig i uforandret form i urinen, med en hastighet på ca. 100 ml/min som tilsvarer den glomerulære filtrasjonshastigheten.

### Eliminasjon

Plasmakonsentrasjonene av dabigatran viste et biekspontielt fall med gjennomsnittlig terminal halveringstid på 11 timer hos friske eldre personer. Etter multiple doser ble det observert en terminal halveringstid på ca. 12-14 timer. Halveringstiden var uavhengig av dose, og den var forlenget ved nedsatt nyrefunksjon som angitt i tabell 30.

### Spesielle populasjoner

#### *Nedsatt nyrefunksjon*

I fase I-studier er eksponeringen (AUC) for dabigatran etter oral administrering av dabigatraneteksilat omtrent 2,7 ganger høyere hos voksne frivillige med moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL 30-50 ml/min) enn hos personer med normal nyrefunksjon.

Hos et lite antall voksne frivillige med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCL 10-30 ml/min) var eksponeringen (AUC) for dabigatran ca. 6 ganger høyere og halveringstiden ca. 2 ganger lengre enn det som er observert i en populasjon med normal nyrefunksjon (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

### **Tabell 30: Halveringstid av total dabigatran hos friske frivillige og pasienter med nedsatt nyrefunksjon**

| Glomerulær filtrasjonsrate (CrCL)<br>[ml/min] | Geometrisk gjennomsnitt (gCV%; område)<br>halveringstid [timer] |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ≥ 80                                          | 13,4 (25,7 %; 11,0-21,6)                                        |
| ≥ 50- < 80                                    | 15,3 (42,7 %; 11,7- 34,1)                                       |
| ≥ 30- < 50                                    | 18,4 (18,5 %; 13,3- 23,0)                                       |
| < 30                                          | 27,2 (15,3 %; 21,6-35,0)                                        |

I tillegg ble dabigatraneksponering (minimal og maksimal) vurdert i en prospektiv, åpen, randomisert farmakokinetikkstudie hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og alvorlig nedsatt nyrefunksjon (definert som kreatininclearance [CrCL] 15-30 ml/min), som fikk 75 mg dabigatraneteksilat to ganger daglig. Dette regimet resulterte i en geometrisk gjennomsnittlig bunnkonsentrasjon på 155 ng/ml (gCV på 76,9 %) målt umiddelbart før administrering av neste dose og i en geometrisk gjennomsnittlig maksimal konsentrasjon på 202 ng/ml (gCV på 70,6 %) målt to timer etter administrering av siste dose.

Clearance av dabigatran ved hemodialyse ble undersøkt hos 7 voksne pasienter med terminal nyresvikt (ESRD) uten atrieflimmer. Dialyse ble utført med dialysatstrømningshastighet på 700 ml/min i 4 timer og en blodstrøms hastighet på enten 200 ml/min eller 350-390 ml/min. Dette resulterte i eliminasjon av henholdsvis 50 til 60 % av dabigatran i blodet. Mengden substans fjernet ved dialyse er proporsjonal med blodstrøms hastigheten opp til en gjennomstrømning på 300 ml/min. Den antikoagulerende aktiviteten av dabigatran avtar ved avtakende plasmakonsentrasjoner, og farmakokinetisk/farmakodynamisk forhold ble ikke påvirket av prosedyren.

Median CrCL i RE-LY-studien var 68,4 ml/min. Nesten halvparten (45,8 %) av RE-LY-pasientene hadde CrCL > 50- < 80 ml/min. Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL mellom 30 og 50 ml/min) hadde i gjennomsnitt 2,29 og 1,81 ganger høyere dabigatranplasmakonsentrasjon henholdsvis før og etter dosering, sammenlignet med pasienter uten nedsatt nyrefunksjon (CrCL ≥ 80 ml/min).

Median CrCL i RE-COVER-studien var 100,4 ml/min. 21,7 % av pasientene hadde lett nedsatt nyrefunksjon (CrCL > 50- < 80 ml/min) og 4,5 % av pasientene hadde moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCL mellom 30 og 50 ml/min). Pasienter med lett og moderat nedsatt nyrefunksjon hadde ved steady-state i gjennomsnitt henholdsvis 1,8 og 3,6 ganger høyere dabigatranplasmakonsentrasjon før dosering, sammenlignet med pasienter med CrCL > 80 ml/min. Tilsvarende verdier for CrCL ble funnet i RE-COVER II.

Median CrCL i RE-MEDY- og RE-SONATE-studiene var henholdsvis 99,0 ml/min og 99,7 ml/min. 22,9 % og 22,5 % av pasientene hadde CrCL > 50- < 80 ml/min, og 4,1 % og 4,8 % hadde CrCL mellom 30 og 50 ml/min i RE-MEDY- og RE-SONATE-studiene.

#### *Eldre pasienter*

Spesifikke farmakokinetiske fase I-studier med eldre personer viste en økning på 40 til 60 % i AUC og mer enn 25 % i C<sub>max</sub>, sammenlignet med yngre personer.

Alderseffekten på eksponering for dabigatran ble bekreftet i RE-LY-studien med ca. 31 % høyere bunnkonsentrasjon for pasienter ≥ 75 år og ca. 22 % lavere bunnkonsentrasjon for pasienter < 65 år, sammenlignet med pasienter mellom 65 og 75 år (se pkt. 4.2 og 4.4).

#### *Nedsatt leverfunksjon*

Det ble ikke sett noen forandring i eksponeringen for dabigatran hos 12 voksne personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B), sammenlignet med 12 kontrollpersoner (se pkt. 4.2 og 4.4).

### *Kroppsvekt*

Bunnkonsentrasjonen av dabigatran var ca. 20 % lavere hos voksne pasienter med kroppsvekt > 100 kg sammenlignet med 50-100 kg. Flertallet av pasientene (80,8 %) var i kategorien  $\geq 50$  kg og < 100 kg uten at en klar forskjell kunne påvises (se pkt. 4.2 og 4.4). Begrensede kliniske data er tilgjengelig hos voksne pasienter < 50 kg.

### *Kjønn*

I studiene som undersøkte forebyggelse av primær VTE, er eksponeringen for virkestoffet ca. 40-50 % høyere hos kvinnelige pasienter, og det anbefales ingen dosejustering. Kvinnelige pasienter med atrieflimmer hadde i gjennomsnitt 30 % høyere bunn- og post-dose-konsentrasjoner. Dosejustering er ikke nødvendig (se pkt. 4.2).

### *Etnisk opprinnelse*

Ingen klinisk relevante etniske forskjeller ble observert blant kaukasiske, afro-amerikanske, latinamerikanske, japanske eller kinesiske pasienter vedrørende farmakodynamikk og farmakokinetikk.

### *Pediatrisk populasjon*

Oral administrering av dabigatraneteksilat i henhold til den protokolldefinerte doseringsalgoritmen resulterte i eksponering innenfor området observert hos voksne med DVT/LE. Basert på den samlede analysen av farmakokinetiske data i studiene DIVERSITY og 1160.108 var den observerte geometriske gjennomsnittlige minimumseksponeringen henholdsvis 53,9 ng/ml, 63,0 ng/ml og 99,1 ng/ml hos pediatriske VTE-pasienter i alderen 0 til < 2 år, 2 til < 12 år og 12 til < 18 år.

### Farmakokinetiske interaksjoner

*In vitro* interaksjonsstudier viste ingen hemming eller induksjon av de viktigste isoenzymene i cytokrom P450. Dette har blitt bekreftet i *in vivo* studier med friske frivillige som ikke viste noen interaksjoner mellom denne behandlingen og følgende virkestoffer: atorvastatin (CYP3A4), digoksin (P-gp-transportinteraksjon) og diklofenak (CYP2C9).

## **5.3 Prekliniske sikkerhetsdata**

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering og gentoksisitet.

Effekter observert i toksisitetsstudier ved gjentatt dosering skyldes forsterket farmakodynamisk effekt av dabigatran.

En effekt på fertilitet hos hunner ble observert som redusert antall implantasjoner og økt preimplantasjonstap ved 70 mg/kg (5 ganger høyere plasmaeksponeringsnivå sammenlignet med pasienter). Ved toksiske doser for morydyrene (5-10 ganger høyere plasmaeksponeringsnivå sammenlignet med pasienter) ble det hos rotte og kanin observert redusert vekt og levedyktighet hos fostrene samt økt føtal variasjon. I studien før og etter fødsel ble en økning i føtal mortalitet observert ved doser som var toksiske for morydyrene (en dose som tilsvarer et plasmaeksponeringsnivå som er 4 ganger høyere enn det som observeres hos pasienter).

I en juvenil toksisitetsstudie utført med Han Wistar-rotter, ble mortalitet assosiert med blødningshendelser ved tilsvarende eksponeringer som blødning ble sett ved hos voksne dyr. Hos både voksne og unge rotter anses mortalitet å være relatert til den overdrevne farmakologiske aktiviteten til dabigatran i forbindelse med bruk av mekaniske krefter under dosering og håndtering. Data fra den juvenile toksisitetsstudien indikerte verken økt sensitivitet for toksiske effekter eller noen toksisitet spesifikk for unge dyr.

Toksikologistudier hos rotter og mus har ikke påvist risiko for tumordannelse ved dabigatrandoser opptil 200 mg/kg.

Dabigatran, den aktive delen av dabigatraneteksilatmesilat, nedbrytes ikke i miljøet.

## **6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER**

### **6.1 Hjelpesoffer**

#### Kapselinnhold

Vinsyre

Hypromellose (E464)

Talkum

Hydroksypropylcellulose

Krysskarmellosenatrium

Magnesiumstearat

#### Kapselskall

Titandioksid (E171)

Hypromellose (E464)

#### Svart trykkfarge

Skjellakk (E904)

Propylenglykol (E1520)

Kaliumhydroksid (E525)

Jernoksid, svart (E172)

### **6.2 Uforlikeligheter**

Ikke relevant.

### **6.3 Holdbarhet**

#### Blister og boks

3 år

#### Boks

Etter anbrudd: 60 dager

### **6.4 Oppbevaringsbetingelser**

#### Blister og boks

Oppbevares ved høyst 30 °C.

### **6.5 Emballasje (type og innhold)**

Blisterpakning som inneholder 10, 30, 60, 100, 180 og 200 harde kapsler (Opa/Alu/tørkemiddel PE-Alu/PE).

Blisterpakning som inneholder 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 100 x 1, 180 x 1 og 200 x 1 harde kapsler i perforerte endoseblisterpakninger (Opa/Alu/tørkemiddel PE-Alu/PE).

Multipakning som inneholder 3 pakninger à 60 x 1 harde kapsler (180 harde kapsler) i perforerte endoseblisterpakninger (Opa/Alu/tørkemiddel PE-Alu/PE).

Multipakning som inneholder 2 pakninger à 50 x 1 harde kapsler (100 harde kapsler) i perforerte endoseblisterpakninger (Opa/Alu/tørkemiddel PE-Alu/PE).

Polypropylenboks med barnesikret skrukork av polypropylen, som inneholder tørkemiddel og 60 harde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

#### **6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering**

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

### **7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Sandoz A/S  
Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Danmark

### **8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER**

20-13627

### **9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE**

Dato for første markedsføringstillatelse: 8. september 2023

### **10. OPPDATERINGSDATO**

08.09.2023